

EPPOPS

Epops

77 / 2-2009

**CENTRALE
ORNITHOLOGIQUE
LIMOUSINE**

Août **2004**

Août **2006**



La revue
des naturalistes
du Limousin



DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Philippe Hubert

RÉDACTEUR EN CHEF :
Stéphane Morelon

CONCEPTION GRAPHIQUE :
Atelier Graphique
(imprimerie@ateliergraphique.fr)

PHOTO DE COUVERTURE :
Grèbe à cou noir, Videix (87), avril 2006 (Raphaël Bussière)

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
ANDRÉ Mathieu, BOULESTEIX Pascal, BOURDIN Hugo, BUSSIÈRE Raphaël,
CHASSAGNARD Gaston, DOUCELIN Annick et Christian, DUMÈTRE Aurélien,
DUPOUX Étienne, FLEYTOU Ludovic, GAUTHIER Robert, GENDEAU Alain et
Sylvie, HUBERT Philippe, LABIDOIRE Bruno, MARTON Pierre,
MORELON Stéphane, NAUDON David, NORE Thérèse, PALLIER Gilles,
PRADIER Isabelle, ROGER Jérôme, SCHILTZ Olivier, VIRONDEAU Anthony.

EPOPS

la revue des naturalistes du Limousin

Bulletin de la Société pour l'Etude
et la Protection des Oiseaux en Limousin

SIÈGE SOCIAL :
11, rue Jauvion
87000 Limoges.
Tél : 05 55 32 20 23
Fax : 05 55 32 77 46

INTERNET :
www.sepol.asso.fr
sepol@sepol.asso.fr

INFORMATIONS ORNITHOLOGIQUES :
05 55 34 12 48

COTISATIONS ET ABONNEMENTS :
Membres bienfaiteurs : 50 €
Membres actifs : 18 € + 14 € d'abonnement.
Conjoint : 11 €
Scolaires : 5 € + 14 € d'abonnement.
Abonnement seul : 16 €
Prix du numéro : 5 €

AVIS AUX LECTEURS
EPOPS ne publiant que des articles signés,
les auteurs conserveront l'entière responsabilité des opinions qu'ils auront émises.

Revue éditée à 650 exemplaires
Dépôt légal à parution - ISSN 1148-4500
Numéro de Commission Paritaire 72482

CENTRALE ORNITHOLOGIQUE LIMOUSINE

Chronique des observations effectuées

entre le 16 août **2004** et le 15 août **2006**

AVANT-PROPOS

L'habitude veut que les avant-propos soient rédigés par les réalisateurs de la centrale. Souhaitant rompre avec la tradition, ou par souci de ne pas trop se mettre en avant, ils m'ont proposé de l'écrire. J'en profite donc pour remercier Raphaël Bussière et Anthony Virondeau qui, malgré quelques périodes de découragement, ont su garder le cap et relancer les rédacteurs pour au final réaliser un travail remarquable. Je veux également remercier tous les autres bénévoles qui ont participé à sa réalisation :

- les auteurs des monographies qui ont dû décortiquer les fichiers d'observations pour en ressortir l'essentiel,
- les relecteurs qui corrigent les fautes et les tournures des phrases,
- les photographes qui n'ont pas le rôle le plus désagréable mais qui offrent gracieusement leurs clichés,
- tous ceux qui font vivre la base de données de la SEPOL (vérification, saisie, transfert ... des observations)
- et tous les passionnés qui ont transmis leurs données.

A propos de données, 2009 va être très certainement l'année de franchissement du cap du million de données saisies dans la base SEPOL. Ce sera alors l'occasion de fêter « l'événement » et de récompenser l'auteur de cette millionième observation limousine. Bien sûr, ce n'est pas pour battre un record que l'on transmet ses observations ; nous le faisons avant tout pour les oiseaux, pour mieux les connaître, pour mieux les protéger. S'il y a une raison pour laquelle chacun de nous devrait transmettre ses données, c'est bien celle-là. J'en profite pour vous dire qu'il y a différents moyens de transmettre vos observations (compléter des fiches papier ou des fichiers informatiques, faire une saisie par Internet, prêter ses carnets à un secrétaire de saisie...). Si vous souhaitez plus d'informations, allez sur le site Internet de la SEPOL (www.sepol.asso.fr), ou téléphonez nous au 05-55-32-20-23.

Comme l'avait dit Patrick Précigout (rédacteur des centrales 1997-2000 et 2000-2002), ces synthèses sont des « bibles » pour l'ornithologue limousin. Celle-ci en est une nouvelle, mais comme pour les précédentes peut-être que tout le monde ne croira pas tout ce qui est écrit. Ce ne sera pas faute d'avoir vérifié les données, mais une erreur est toujours possible. Alors si vous en voyez une ou si avez un doute sur une observation, faites-le nous savoir. Il n'est jamais trop tard pour rectifier la base de données, d'autant plus que celle-ci servira pour de prochaines publications et notamment l'atlas 2005-2010 qui recoupe une partie de la période de cette centrale.

Encore merci à Raphaël, qui réalise ici sa deuxième centrale, et Anthony.

Philippe HUBERT

SOMMAIRE

■ MÉTHODE	p.5	LISTE ALPHABÉTIQUE DES OBSERVATEURS....	p.20
CHIFFRES ET STATISTIQUES	p.5	LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX	
LISTE DES 10 ESPÈCES OBSERVÉES		ÉTANGS DU LIMOUSIN.....	p.34
LE PLUS FRÉQUEMMENT.....	p.10	CHRONIQUE RÉALISÉE PAR.....	p.35
LISTE DES 41 ESPÈCES ET 5 SOUS-ESPÈCES		LISTE DES AUTEURS	p.35
OBSERVÉES MOINS DE 5 FOIS	p.10	■ ERRATUM	p.152
LISTE DES 228 ESPÈCES ET 6 SOUS-ESPÈCES			
OBSERVÉES EN LIMOUSIN.....	p.12		
<hr/>			
■ LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES	p.37	Méropidés	p.99
Anatidés	p.38	Upupidés.....	p.100
Phasianidés.....	p.44	Picidés.....	p.101
Gaviidés.....	p.45	Alaudidés.....	p.105
Podicipédidés.....	p.46	Hirundinidés.....	p.107
Phalacrocoracidés	p.47	Motacillidés	p.110
Ardéidés	p.48	Bombycillidés	p.114
Ciconiidés.....	p.53	Cinclidés.....	p.114
Accipitridés	p.55	Troglodytidés.....	p.115
Pandionidés	p.64	Prunellidés	p.116
Falconidés	p.64	Turdidés	p.116
Rallidés	p.67	Sylviidés	p.123
Gruidés	p.68	Muscicapidés	p.129
Récurvirostridés.....	p.75	Aegithalidés	p.130
Burhinidés	p.75	Paridés	p.130
Charadriidés	p.76	Sittidés.....	p.133
Scolopacidés.....	p.78	Tichodromadidés.....	p.134
Laridés	p.84	Certhiidés	p.134
Sternidés	p.87	Oriolidés	p.136
Columbidés.....	p.88	Laniidés	p.136
Cuculidés.....	p.94	Corvidés	p.138
Tytonidés	p.94	Sturnidés	p.142
Strigidés	p.95	Passéridés	p.142
Caprimulgidés.....	p.98	Fringillidés.....	p.143
Apodidés	p.98	Emberizidés.....	p.150
Alcedinidés.....	p.99		

Méthode

Cette chronique traite des observations effectuées entre le 16/08/04 et le 15/08/06 soit deux migrations postnuptiales, deux hivernages, deux migrations prénuptiales et deux saisons de nidification.

Lors de chaque occasion d'observation, l'ornithologue remplit une fiche appelée inventaire. Chaque espèce mentionnée dans un inventaire (quel que soit l'effectif concerné) constitue une citation.

Les observations sont de l'entière responsabilité de leurs auteurs.

Cette centrale synthétise :

	Inventaires	Citations
2004/2005	9 607	51 660
2005/2006	11 154	75 465


Chiffres et Statistiques

● Prospection par département



Durant cette période, parmi les 751 communes que compte le Limousin, 686 ont reçu au moins une fois la visite d'un ornithologue. Le tableau ci-dessous illustre l'intensité de la prospection pour chaque département du Limousin.

Départements	Nbre de communes dans dépt.	Nbre de communes prospectées	Nbre d'inventaires	Nbre de citations	Nbre d'espèces
Corrèze (19)	287	255	5 480	32 061	219
Creuse (23)	261	231	3 885	22 696	219
Haute-Vienne (87)	203	200	11 396	72 368	241

● **Carte de répartition du nombre d'inventaires par communes du
16/08/04 au 15/08/06.**



● **Histogrammes du nombre des inventaires et des citations du 16/08/04 au 15/08/06.**




- **Les 10 jours durant lesquels fut effectué le plus grand nombre d'inventaires.**


Date	Nbre d'inventaires	Date	Nbre d'inventaires
01/05/06	163	14/01/06	139
22/04/06	149	27/05/06	138
16/01/05	148	11/06/06	132
15/01/06	145	23/04/06	129
28/04/06	140	10/06/06	128

- **Les 10 journées les plus riches en nombre d'espèces.**

Date	Nbre d'espèces	Date	Nbre d'espèces
21/04/05	104	15/06/05	97
14/04/06	102	08/04/06	97
01/06/05	100	02/04/06	97
23/04/05	99	27/05/06	96
01/05/06	99	27/04/06	94

- **Répartition de la pression d'observation au cours de la semaine avec le nombre d'inventaires et le nombre de citations.**





- Liste des 13 communes où plus de 100 espèces d'oiseaux ont été observées durant la période considérée.

Dépt.	Commune	Nbre d'espèces
23	Lussat	176
19	Neuvic	151
87	Flavignac	135
19	Aubazine	126
87	Limoges	121
87	Azat-le-Ris	121
87	Videix	112

Dépt.	Commune	Nbre d'espèces
23	Evaux-les-Bains	112
87	Oradour-Saint-Genest	109
87	Cieux	108
87	St-Léger-la-Montagne	106
19	Meymac	105
23	Guéret	103

- Répartition du nombre d'espèces observées par commune.

Nbre Espèces	Nbre Communes
1-5	139
6-10	77
11-25	122
26-50	202

Nbre Espèces	Nbre Communes
51-75	98
76-100	32
101-150	14
>= 151	2

**Liste des 10 espèces observées le plus fréquemment
du 16/08/04 au 15/08/06**

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de reproduction
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	9 506	Certain
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	6 087	Certain
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	5 807	Certain
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	5 047	Certain
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3 878	Certain
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3 588	Certain
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	3 246	Certain
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	3 170	Certain
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2 880	Certain
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	2 868	Certain

**Liste des 41 espèces et 5 sous-espèces
observées moins de 5 fois**

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations
Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>	1
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	1
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	1
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	1
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	1
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	1
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	1

Suite p11

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	1
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	1
Tourneepierre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	1
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	1
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	1
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	1
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	1
Bergeronnette printanière d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	1
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	1
Locustelle lusciniöide	<i>Locustella luscinioides</i>	1
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	1
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	2
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	2
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	2
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	2
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	2
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	2
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	2
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	2
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	3
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	3
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	3
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	3
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	3
Bergeronnette de Yarrell	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	3
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	3
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	3
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	4
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	4

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	4
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	4
Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>	4
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	4
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	4
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	5
Bergeronnette printanière flavéole	<i>Motacilla flava flavissima</i>	5

Liste des 228 espèces et 6 sous-espèces observées en Limousin

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	49	Probable
Cygne noir	<i>Cygnus atratus</i>	19	
Oie rieuse	<i>Anser albifrons</i>	2	
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	29	
Oie à tête barrée	<i>Anser indicus</i>	1	
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	8	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	21	
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	15	
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	6	
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	149	
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	101	Probable
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	327	Certain
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	1730	Certain
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	57	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	21	
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	180	Possible
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	4	
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	304	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	1	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	58	Probable
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	3	
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	15	
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	1	
Garrot à œil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	2	
Harle piette	<i>Mergus albellus</i>	2	
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	8	
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	39	
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	90	Certain
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	7	Possible
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	122	Certain
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	289	Certain
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	8	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	4	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	206	Certain
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	948	Certain
Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	14	
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	6	Probable
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1231	Certain
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	1	
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	76	Certain
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	26	Certain
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	56	Certain
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	301	Possible
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1364	Certain
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	78	Certain
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	122	Possible
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	77	Possible
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	428	Certain
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	784	Certain
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	810	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	4	
Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	92	Certain
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	98	Possible
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	392	Certain
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	21	Possible
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	89	Certain
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	500	Certain
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	2375	Certain
Aigle criard	<i>Aquila clanga</i>	21	
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	2	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	84	Certain
Balbusard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	87	
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	710	Certain
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	1	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	21	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	179	Certain
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	423	Certain
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	31	Possible
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	260	Certain
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	517	Certain
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	1366	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	4	
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	9	
Oedicnème criard	<i>Burhinus oediconemus</i>	39	Certain
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	70	Certain
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	8	
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	14	
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	3	
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	531	Certain
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	3	
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	1	
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	4	

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Bécasseau cocorli	<i>Calidris ferruginea</i>	2	
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	14	
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	11	
Bécassine sourde	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	8	
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	111	Probable
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	158	Certain
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	4	
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	2	
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	1	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	21	Possible
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	8	
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	30	
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	33	
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	116	
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	9	
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	220	Possible
Tournepierrre à collier	<i>Arenaria interpres</i>	1	
Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>	4	
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	196	Probable
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	7	
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	3	
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	45	
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	1	
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	1	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	5	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybridus</i>	25	
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	20	
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	1	
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	45	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	224	Certain
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	6087	Certain
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	1754	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	876	Certain
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1573	Certain
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	231	Certain
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	10	Certain
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	201	Certain
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	237	Certain
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	58	Certain
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	8	Possible
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	1	Possible
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	54	Certain
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	754	Certain
Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>	1	Possible
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	315	Certain
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	25	Certain
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	765	Certain
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	48	Certain
Pic cendré	<i>Picus canus</i>	2	Possible
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	1299	Certain
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	391	Certain
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	1684	Certain
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	115	Certain
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	235	Certain
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	1087	Certain
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	2221	Certain
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	68	Certain
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	81	Certain
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	3246	Certain
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	595	Certain
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1019	Certain
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	1269	Probable
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	72	
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	149	Probable

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Berg. printanière d'Italie	<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	1	
Berg. printanière flavéole	<i>Motacilla flava flavissima</i>	5	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	512	Certain
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1587	Certain
Bergeronnette de Yarrell	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	3	
Jaseur boréal	<i>Bombycilla garrulus</i>	4	
Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	450	Certain
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2880	Certain
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	1010	Certain
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	5	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	3170	Certain
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	1113	Certain
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	1	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	1456	Certain
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	581	Certain
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	156	Certain
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>	1212	Certain
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	139	
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	10	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	5807	Certain
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	352	
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	2738	Certain
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	262	
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	1250	Certain
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	2	
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	22	Certain
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	19	Probable
Locustelle lusciniöide	<i>Locustella luscinioides</i>	1	
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	4	
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	21	Probable
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	653	Certain
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	5047	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	257	Certain
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	533	Certain
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	3	Certain
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	362	Certain
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	214	Certain
Pouillot ibérique	<i>Phylloscopus ibericus</i>	2	
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	2749	Certain
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	218	Certain
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	373	Probable
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapillus</i>	557	Certain
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	104	Certain
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	97	Possible
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	740	Certain
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	588	Certain
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	56	Probable
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	299	Certain
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	495	Certain
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	2868	Certain
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	3878	Certain
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	1779	Certain
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	39	Possible
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	138	Certain
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	1394	Certain
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	1040	Certain
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	954	Certain
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	148	Certain
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	60	Certain
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	2218	Certain
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	1309	Certain
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	405	Certain
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	129	Certain
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	3746	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	290	Certain
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	2438	Certain
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	2258	Certain
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	98	Certain
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	12	Probable
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	9506	Certain
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	334	
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	495	Certain
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	909	Certain
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	1468	Certain
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	605	
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	556	Certain
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	11	
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	144	Probable
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	530	Certain
Bouvreuil pivoine trompetteur	<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	18	
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	352	Certain
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	1160	Certain
Bruant zizi	<i>Emberiza cirrus</i>	584	Certain
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	54	Certain
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	1	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	164	Possible
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	96	Certain

**Liste alphabétique des observateurs
avec les abréviations employées dans les différents textes.**

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
AlbD	ALBESSARD Dominique	69	207
ArnL	ARNAUD Louis	14	36
ArnLo	ARNAUS Louis	1	1
ArtQ	ARTIGES Quentin	2	17
PicN	Association Le Pic Noir	2	2
Aub	AUBRYA	2	2
AudA	AUDEVARD Aurélien	4	18
AudJ	AUDRERIE Jacques	1	1
AurF	AURICHE François	58	77
Aut	AUTTIER	1	1
AvoN	AVON Nicolas	1	1
BadF	BADEROT Flavien	3	3
Bal	BALAIRE	3	3
BarJ	BARATAUD Julien	185	845
BarM	BARATAUD Michel	1	1
BarPi	BARBAUD Pierre	31	38
BarJ	BARBET Jessica	7	18
BarR	BARDEL René	1	1
BarMa	BARDINAL Marc	3	9
BarG	BARGUIL Gaëtan	8	117
BarN	BARON Nicolas	2	6
BarF	BARRE Fabrice	1	1
BarP	BARRY Philippe	25	33
BarF	BARTH Franz	3	44
BasM	BASTHIER Maurice	1	1
BasP	BASTHIER Pierre	3	22
BayA	BAYLE Arnaud	7	25
BeaC	BEAUDOIN Colette	11	11

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
BelM	BELSOU Maurice	12	18
BerH	BERNARD Huguette	1	1
BerM	BERNARD Matthieu	1	6
BerF	BERRUBE François	13	24
BerD	BERTRAND David	4	8
BesM	BESLOU Maurice	11	31
BesP	BESSE Patrick	1	1
BieJ	BIENVENU Jean-Michel	41	514
Bil	BILLAT	1	1
BlaS	BLANCHARD Sandrine	1	1
Blal	BLAVIGNAC Isabelle	8	52
BleM	BLESCH Martine	2	2
BoiM	BOISSEAU Marie-Ange	2	2
Boi	BOIVET	1	1
BoIJ	BOLLINGER Jean-Claude	1	2
BonM	BONNEMAISON Mathieu	3	7
Bou	BOUCHET	1	1
Boul	BOUDARD Isabelle	1	1
BouB	BOUILLAGUET Barbara	1	1
BouP	BOULESTEIX Pascal et PAILLER Christelle	448	4414
BouH	BOURDIN Hugo	355	1348
Bour	BOURSICAUD	1	1
BouF	BOURY Fabrice	1	1
BouC	BOUSSOUF Cédric	23	42
BouP	BOUVIER Paule et Marie-Laure	32	32
BouM	BOUVIER Marie-Claire	1	1
BraD	BRAECKMAN Dominique	2	2
BruT	BRUGEROLLE Thibault	1	5
BuiM	BUISSON Marcel	4	4
BurS	BUR Sébastien	12	20

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
BurJ	BURGUET Jacques et Pascale	61	510
BusR	BUSSIERE Raphaël	720	4021
ButL	BUTEL Lucile	4	4
CaiG	CAILLAUD G.	1	2
CaiL	CAILLAUD Laurent	1	1
CanG	CANAT Guy et Nicole	1	1
Car	CARRE	21	23
CarP	CARRIERE Patrick	3	3
Cat	CATALIFAUD	1	1
CavP	CAVALLIN Pascal	570	4174
CelJ	CELERIER Jean-Michel	378	2181
CenN	Centre Nature "LA LOUTRE"	2	2
ChaL	CHABROL Laurent	2	2
ChaC	CHANTALET Cyril	1	1
Chal	CHARISSOU Isabelle	35	39
ChaS	CHARLAT Stéphanie	1	1
ChaSt	CHARPENTIER Stéphane	4	12
ChaG	CHASSAGNARD Gaston	31	95
ChaB	CHASSAING Brigitte	2	2
ChaA	CHASSENEUIL Alain	2	2
ChaM	CHASTAGNER Michel	2	3
ChaJ	CHASTANET Jean-Marie	149	698
Cha	CHATARD	1	1
Chau	CHAUFFIER	1	1
Chauf	CHAUFFREY	5	5
ChaSe	CHAULIER Stéphane	28	33
ChaJm	CHAUMEIL Jean-Marie	46	211
ChaJp	CHAUSSIER Jean-Pierre	1	1
Chi	CHIMIER	1	1
ChoP	CHOLET Patrice	6	7

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
ClaJ	CLAUDAUD Jean-Pierre	1	1
ColD	COLMAN David	69	489
ComF	COMMENVILLE François	1	1
ConL	CONAN Ludovic	1	5
CSP 23	Conseil Supérieur de la Pêche 23	94	96
CSP 87	Conseil Supérieur de la Pêche 87	47	48
CSP 19	Conseil Supérieur de la Pêche 19	1	1
CoqM	COQ Michel et MARTIN Jacqueline	266	1680
CorA	CORIVEAU André et PERRIER Solange	510	3512
CouC	COUARTOU Christian et Sylvie	282	1413
CouG	COUROUSSE Gabriel	4	28
CouR	COUTANT Régis	105	901
CouL	COUTURIER Laetitia	2	2
CreD	CREMOUX Danielle et Jean-Louis	472	3152
CreN	CREN	2	6
CreE	Creuse Environnement	1	1
DanP	DANELON Pierre	1	1
DarG	DARD Georges	3	3
DauR	DAURIAC Roger	98	573
DecM	DE CONINCK Magali	3	3
DecP	DECOUT Pierre	2	2
DelA	DELANGE André	4	4
Del	DELAPRE	1	1
DelR	DELAUNAY Rémy	1	1
DelP	DELLAVALLE Philippe	35	40
DelS	DELORD Sylvie	3	3
DelP	DELSOUC Pierre-François	2	2
DelC	DELUCHE Christophe	7	8
DenB	DENIS Bernard	1	1
DerG	DERIAN Gwenaél	12	24

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
DesF	DESAGE Fabrice	6	14
DesM	DESAGE Marc	5	11
DesJ	DESBORDES Jean-Pierre	1	1
DesJm	DESBORDES Jean-Marie	1	1
DesJe	DESBRUGERES Jean-Marie	21	24
DesM	DESCHAMPS Michèle	1	20
DesN	DESCHAUME Nicole	3	13
DesG	DESHAYES Gurias	32	147
DesR	DESPLACES Robert	43	451
DesRo	DESSAGNE Robert et CHASSAIN Françoise	3	3
Des	DESVILETTE	15	17
DhaG	DHAINANT Grégory	51	211
DitM	DITTA Myriam	14	204
DohR	DOHOGNE R.	1	1
DorM	DORFIAC Matthieu	1	7
DouA	DOUCELIN Annick et Christian	950	7060
DouS	DOURSENAUD Sébastien	14	14
DubP	DUBOC Pascal	107	997
DubG	DUBOIS Gabriel	31	777
DubY	DUBOIS Yves	27	124
DucA	DUCHEMIN André	9	9
DucJ	UCHER Jean-Gilbert	1	1
DumA	DUMETRE Aurélien	145	948
DumM	DUMORTIER Marie-Hélène	2	8
DupE	DUPOUX Etienne	98	1122
DurC	DURAND Christelle	2	2
EcoC	Ecole de Chabagnac	1	1
EyrO	EYRAUD Olivier	98	440
FacP	FACQUET Philippe et Catherine	92	804
FanP	FANGET Pascale	2	2

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
FarF	FARA Frédéric	15	17
FatJ	FATON Jean-Michel	22	86
FauFr	FAUBERT Frédéric	8	8
FauF	FAURE Fernand	1	4
FauA	FAURIE Annette	1	1
FauB	FAURIE Bernard et Catie	83	858
FavA	FAVRAN Anne	1	1
FeuH	FEUGERE Hervé	1	1
Fil	FILHOU	1	1
FleJ	FLEYTOU Jean-Paul et Liliane	62	520
FleL	FLEYTOU Ludovic	78	730
FouA	FOURNIER Anne-Cécile	2	4
FouJ	FOURNIER Jean-Claude	2	2
FreG	FREGIS Gilbert	1	1
FucF	FUCHS François	1	2
PieG	GABAUD Pierrick	1	1
GalC	GALLAND Catherine	3	3
GamM	GAMERS Martin	2	2
GanA	GANDOIS Anne	4	6
GauM	GAUTHIER Michel et LALANNE Arlette	3	3
GauR	GAUTHIER Robert	1172	5510
GauMi	GAUTOULE Michel	1	1
GayJ	GAYAUD Jean-Pierre	26	82
GenA	GENCE Antoine	1	2
GenC	GENDRE Christian et Nicolas	221	4736
GenS	GENEST Sébastien	1	1
GenG	GENESTE Guillaume	85	1977
GerA	GERALD Albert	4	5
GfeE	GFELLER Emmanuel	61	310
GibM	GIBAUD Marc	1	2

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
GiIB	GILBERT Bruno	1	11
GiID	GILBERT David	2	2
Gir	GIRAUD	2	3
GirD	GIRY Daniel	1	1
GorV	GORCE Vincent	3	3
GorP	GORSIC Pierre	2	8
GosJ	GOSSET Jean-Marc	3	4
GouA	GOUDOUNEIX Amandine	5	15
Gou	GOUTOULE	1	1
GraS	GRANIER Sébastien	7	8
GraP	GRAVEY Patrick	3	3
GroG	GROSSET Guy-Noël	6	11
GML	Groupe mammifères du Limousin	1	1
GueC	GUERBAA Christiane	1	1
GueK	GUERBAA Karim et MARNIER Sophie	169	1287
GueS	GUERIN Sylvain	1	2
GuiM	GUILLEMOT Monique	1	1
GuiH	GUILLIEN Henri	1	1
Gui	GUILLON	4	5
GuiL	GUIOT Laurent	1	1
HaeJ	HAEUSSLER Jocelyne	3	3
HagM	HAGERMAN Marie-Claire	9	9
HenE	HENNEQUIN Erwan	4	9
HipS	HIPPOLYTE Stéphane	14	210
HubP	HUBERT Philippe	473	3932
IndN	INDELICATO Nathalie	21	256
Jacl	JACOB Isabelle	1	2
Jac	JACOBUS	1	1
Jacq	JACQUEMIN	1	1
JamJ	JAMMET Jean-Paul	5	33

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
Jau	JAUDINOT	1	1
JenJ	JENIN Julien	2	2
JofP	JOFFRE Patrick	33	74
JoIT	JOLLIFFE Thomas	1	1
JonR	JONCOUX Robert	1	1
JorV	JORLAND Véronique	25	151
JouC	JOUGLEUX Claude	1	1
JuiR	JUILLIARD Romain	20	371
KfeE	KFETTER Emmanuel	2	3
LabB	LABIDOIRE Bruno	244	2068
LabD	LABIDOIRE David	16	29
LabG	LABIDOIRE Guy et CHAMARAT Noëlle	81	532
LabP	LABIDOIRE Patrick	15	15
LabAn	LABROUSSE André	1	2
LabA	LABROUSSE Arnaud	47	420
Lac	LACHATRE	1	1
LacF	LACHAUD François	2	2
LafJ	LAFON Jacqueline	40	70
LafM	LAFON Marinette	13	13
LagJ	LAGARDE J.C	1	1
LagJp	LAGARDE J.P	1	1
LanJe	LANCESSEUR Jean	1	1
LanL	LANDRIN Laurence	1	1
LanJ	LANGENBACH Jean-Claude	614	2564
Lan	LANGLADE	1	1
LapJ	LAPLAGNE Jean et Janine	6	6
LapB	LAPORTE Bernard	2	2
LapM	LAPRUN Mathias	3	3
LarP	LAROUDIE Pascal	2	2
LasC	LASSALLE Christiane	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
LasS	LASSIALE Simone	2	2
LauM	LAURENT Monique	2	2
LebC	LE BERRE Claude	4	4
LebJ	LEBERT Jeannine	3	4
LebJa	LEBLANC Jacques	1	1
LebA	LEBRETON Alexis	9	12
LecJ	LECHEVALLIER Jacques	17	38
LecR	LECRU Raymond	1	1
LegJ	LEGALITE Jean-Yves	1	1
LegF	LEGLISE Floriane	1	1
LenS	LENOIR Stéphane	1	1
LerT	LEROYThierry	3	5
LerJ	LERY Jean-Pierre	205	1111
LibC	LIBAUDE Christian	1	1
LoiV	LOILIER Vincent	1	1
LoiN	LOLIVE Nicolas	26	213
Lop	LOPEZ	8	8
LpoV	LPO Vienne	1	8
MalF	MALIGNE Frank	3	3
MarB	MARGARET de BRUIN	1	1
Mar	MARIAUD	1	1
MarB	MARJA BOS	12	12
MarP	MARQUET Patrick	41	418
MarQ	MARQUET Quentin	29	175
Mart	MARTEAU	1	1
MarP	MARTHON Pierre	678	4468
MarH	MARTINAUD Hervé	1	1
MasB	MASSON Béatrice	1	1
Mau	MAUMI	1	1
MauL	MAUMONT Lucette	3	3

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
MauT	MAURANDEAU Thomas	4	7
MauM	MAURICE Martine	3	3
MayY	MAYAUD Yves	2	2
MazS	MAZAUD Serge et CHARISSOU Isabelle	1	1
MeiR	MEISSAN René	6	6
MerC	MERCIER Christophe	348	882
MiaJ	MIALON Jérémy	2	2
Mic	MICHARD	1	1
MicM	MICHELOT Marc	20	105
Mich	MICHINEAU	1	1
MigF	MIGOT Frédéric	1	1
MolV	MOLINIER Vincent	1	1
MomS	MOMBOISSE Stéphane	24	122
Mon	MONDOLY	3	3
MonE	MONNET Eric	4	4
MonG	MONTAGNON Gérard	1	2
MorB	MOREAU Bastien	7	45
MorS	MORELON Stéphane et Elodie	574	4831
MorN	MORON Nicolas	1	1
MorD	MORZYNSKI Dominique	3	3
MosJ	MOSSE Johan	7	14
MosC	MOSSIERE Catherine	1	1
MouA	MOUNAL Anne-Marie	1	1
MouG	MOURGAUD Gilles	7	7
MouL	MOUSSIEGT Laurent	1	1
MulP	MULLER Pierre	3	3
NauD	NAUDON David	236	2173
NauM	NAUDON Mathieu	2	15
NauP	NAURON Pascal	42	330
NauF	NAUWYNCK Fabienne	1	6

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
NedS	NEDELLEC Sébastien	1	3
NicC	NICAUD Camille et Josette	11	12
NonG	NONIQUE-DESERVIGNES Gérard	26	258
NorT	NORE Thérèse	399	3339
OecM	OECHSNER Magali	1	1
OIJJ	OLLIER Jean-Paul	12	38
Oncf	ONCFS	1863	1886
Onem	ONEMA 19	5	5
Oubl	OUBERT Isabelle	1	1
PaiE	PAILOT Eric	3	6
PalG	PALLIER Gilles	91	860
ParM	PARET Michel	2	14
ParS	PARIS Sylvain	6	6
PfaB	PFAU Betty	2	2
PioJ	PIOLLET Jean-Michel	25	187
PloA	PLOEGER Aldy	3	3
PoiQ	POIRON Quentin	6	18
PorJ	PORS J.P	1	1
PouG	POUGET Gaëlle	9	10
PraF	PRADEAU Fred	7	7
Pral	PRADIER Isabelle	262	1596
PraG	PRAGOUT Gérard	1	2
PreP	PRECIGOUT Patrick	1694	12017
Pre	PREVOST	1	8
ProP	PROVOST Pascal	18	93
QueC	QUENOT Catherine	1	1
QueA	QUEYREL Alexis	1	1
QuiF	QUILLARD Françoise	4	4
RafB	RAFFIN Bruno	1	1
RayP	RAYNARD Philippe	4	4

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
RayA	RAYNAUD André et Solange	122	473
RebA	REBOUX Aurélien	12	21
RenD	RENSON Didier	1	1
ReyG	REYMANN Gisèle	3	3
ReyA	REYNIER Arnaud	19	20
RigP	RIGONDAUD Pierre	2	2
Riv	RIVET	1	1
RobS	ROBERT Sylvain	513	2877
RogJ	ROGER Jérôme	341	2149
RouRo	ROUAUD Romain	20	184
RouR	ROUET Régis	2	5
RouA	ROUMILHAC André	27	29
RouJ	ROUSSET Jacqueline	1	7
RouAn	ROUX Anne	2	2
RoyM	ROY Marie-Céline	4	100
SaiB	SAINTVILLE B.	1	1
SaIA	SALESSE Aurélien	2	15
SanJ	SANCHEZ Jacqueline	1	3
SauJ	SAUTOUR Jean-Christophe et GUISHER Valérie	15	43
SavJ	SAVIGNI Jean-René	4	6
SchO	SCHILTZ Olivier	86	222
SchL	SCHMITZ Laurent	4	51
SegC	SEGELLE Clément	156	611
SegB	SEGUY Bruno	25	32
SelP	SELIQUER Pierre	95	132
Sepol	SEPOL	89	803
Ser	SERIEYS	1	1
SheJ	SHERGOLD Judy	1	1
SirD	SIRIEIX David	3	3
SixA	SIX Arnaud	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
SotJ	SOTTIER Jérôme	186	305
SouP	SOULIER Pierre	59	274
SouPi	SOULIER Pierrick	36	168
SouH	SOURISSEAU Huguette	1	1
SprL	SPRIET Laurent	1	2
StaB	STARCK Bruno	1	1
Sub	SUBRA	1	1
SudJ	SUDRAUD Julien	1	2
TarE	TARAVAUD Eric	149	1820
TetA	TETY Alain	1	1
TeuJ	TEULIERE Jean-Michel	62	155
TheF	THEVENET Franck	4	6
TheM	THEVENET Michel	2	3
ThiJ	THIBAUT Jacques	2	2
ThoC	THOMAS Catherine	1	13
ThoF	THOMAS Frédéric	138	713
TouJ	TOUMAZET Jean-Pierre	2	18
TriG	TRICONE Gérard	2	2
TriJ	TRIDON Julien	1	1
TroS	TROCHUT Sébastien	4	4
TuIY	TULOUP Yves	49	378
UrrE	URROZ Estela	1	1
ValA	VALADE André	4	4
VarJ	VAREILLE Jean-Louis	34	138
VarC	VARIERAS Christian	34	270
VerM	VERSTRAETE Marguerite	1	1
ViaC	VIALLE Christian	1	1
VidC	VIDAL Corinne et CORTEL Denis	1	5
VilA	VILKS Askolds	78	644
VilO	VILLA Olivier	58	375

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
VilD	VILLEMONTAIX Daniel	1	1
VinE	VINCENT Emmanuel	1	1
VinM	VINCENT Michel et Nelly	2	3
VinS	VINCENT Sylvain	110	416
VioJ	VIONNET Jean-Luc	1	5
VirA	VIRONDEAU Anthony	629	5480
VirJ	VIRONDEAU Jean-Pierre	14	14
VoiP	VOISIN Patrick	1	1
YveJ	YVERNAULT Jérôme	7	7
ZinM	ZINSMEISTER Michel	14	21



Stage ornitho de Meymac (SULIM), Corrèze (19), juin 2006 (Isabelle Pradier)

Liste alphabétique des plans d'eau du Limousin cités dans les textes.

(Le nom de la commune est écrit en caractères gras)

- Barrage de l'Aigle (**19, Soursac**)
- Barrage de la Mazelle (**87, Limoges**)
- Etang Baudy (**87, Saint-Yrieix-la-Perche**)
- Etang d'Aigueperse (**87, Saint-Bonnet-de-Briance**)
- Etang de Bournazel (**19, Seilhac**)
- Etang de Boutilly (**87, Azat-le-Ris**)
- Etang de Chabannes (**19, Tarnac**)
- Etang de Charrain (**87, Saint-Junien-les-Combes**)
- Etang de Chavaignac (**87, Peyrilhac**)
- Etang de Cieux (**87, Cieux**)
- Etang de Fayolle (**23, Sannat**)
- Etang de Fromental (**87, Cieux**)
- Etang de Ganetorte (**19, Le Lonzac**)
- Etang de Gouillet (**87, Saint-Sylvestre**)
- Etang de Jonas (**87, Ambazac**)
- Etang de Landes (**23, Lussat**)
- Etang de Lavaud (**87, Videix**)
- Etang de Lavillemichel (**87, Bessines-sur-Gartempe**)
- Etang de Manteix (**87, Bujaleuf**)
- Etang de Marsaguet (**87, Coussac-Bonneval**)
- Etang de Maubrant (**23, Lizières**)
- Etang de Montsour (**19, Lamazière-Basse**)
- Etang de Murat (**87, Saint-Léger-Magnazeix**)
- Etang de Néravaud (**23, Saint-Priest-la-Feuille**)
- Etang de Tête de Bœuf (**23, Lussat**)
- Etang de Toueille (**23, Le Grand-Bourg**)
- Etang de Tornage (**23, Evaux-les-Bains**)
- Etang de Vitrat (**23, Saint-Maurice-la-Souterraine**)
- Etang de l'Âge (**87, Le Dorat**)
- Etang de la Bastide (**23, Lussat**)
- Etang de la Chassagne (**19, Ségonzac**)
- Etang de la Chaume (**23, Azérables**)
- Etang de la Ganetorte (**19, Le Lonzac**)
- Etang de la Mazère (**87, Saint-Martin-le-Mault**)
- Etang de la Maison de Bois (**87, Saint-Prieix-sous-Aixe**)
- Etang de la Pêcherie (**87, Saint-Sylvestre**)
- Etang de la Pouge (**87, Saint-Auvent**)
- Etang de la Ramade (**23, Flayat**)
- Etang de la Reyberie (**23, Budelière**)
- Etang de la Serrerie (**87, Coussac-Bonneval**)
- Etang de la Toueille (**23, Le Grand-Bourg**)
- Etang de la Vierge (**23, Lussat**)
- Etang des Bordes (**87, Saint-Jouvent**)
- Etang des Courtilles (**23, Guéret**)
- Etang des Garennes (**87, Cieux**)
- Etang des Grands Champs (**87, Azat-le-Ris**)
- Etang des Oussines (**19, Saint-Merd-les-Oussines**)
- Etang des Planchettes (**87, Azat-le-Ris**)
- Etang des Portes (**23, Saint-Loup**)
- Etang du Bois de Sainte-Anne (**87, Mézières-sur-Issoire**)
- Etang du Coiroux (**19, Aubazine**)
- Etang du Grand Champ (**87, Azat-le-Ris**)
- Etang du Griffolet (**19, Ussac**)
- Etang du Moulin Neuf (**19, Objat**)
- Etang le Cante (**23, Chénérailles**)
- Etang Neuf (**23, Jarnages**)
- Etang Saint-Fortunat (**87, Flavignac**)
- Grand étang (**87, Azat-le-Ris**)
- Lac de Bort-les-Orgues (**19, Bort-les-Orgues**)
- Lac de Neuviac (**19, Neuviac**)
- Lac de Saint-Pardoux (**87, Saint-Pardoux**)
- Lac de Vassivière (**23, Royère-de-Vassivière**)
- Lac d'Uzurat (**87, Uzurat**)
- Lac du Causse (**19, Lissac-sur-Couze**)

Cette chronique a été réalisée par

- ➔ **BUSSIERE Raphaël, VIRONDEAU Anthony** : Coordination générale de la centrale
- ➔ **GAUTHIER Robert** : Codification des fiches
- ➔ **BOULESTEIX Pascal** : Logiciel de traitement des données «Fenêtre sur la Nature»
- ➔ **ANDRÉ Mathieu, BUSSIERE Raphaël, DUPOUX Etienne, ROGER Jérôme** : Élaboration des graphiques et cartographies
- ➔ **DOUCELIN Annick & Christian, HUBERT Philippe, MORELON Stéphane, NORE Thérèse** : Relecture

Liste des auteurs

➔ Mathieu ANDRÉ :

Récurvirostridés (Echasse blanche, Avocette élégante), **Charadriidés** (Petit Gravelot, Grand Gravelot, Pluvier doré, Pluvier argenté, Vanneau huppé).

➔ Hugo BOURDIN :

Anatidés (Cygne noir, Cygne tuberculé, Oie cendrée, Oie rieuse, Oie à tête barrée, Bernache du Canada, Tadorne casarca, Tadorne de Belon, Canard mandarin, Canard sif-fleur, Canard chipeau, Sarcelle d'hiver, Canard colvert, Canard pilet, Sarcelle d'été, Canard souchet, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule nyroca, Fuligule morillon, Fuligule milouin, Eider à duvet, Macreuse brune, Garrot à œil d'or, Harle piette, Harle huppée, Harle bièvre), **Rallidés** (Râle d'eau, Gallinule poule-d'eau, Foulque macroule).

➔ Raphaël BUSSIÈRE :

Tytonidés (Effraie des clochers), **Apodidés** (Martinet noir, Martinet à ventre blanc), **Corvidés** (Geai des chênes), **Sturnidés** (Étourneau sansonnet).

➔ Gaston CHASSAGNARD :

Laridés (Mouette pygmée, Mouette rieuse, Goéland cendré, Goléand brun, Goéland leu-cophée, Goéland marin), **Strigidés** (Grand-duc d'Europe, Chevêche d'Athéna, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Chouette de Tengmalm), **Picidés** (Torcol fourmilier, Pic cendré, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, Pic épeichette).

➔ Aurélien DUMÈTRE :

Phasianidés (Perdrix rouge, Perdrix grise, Caille des blés, Faisan de Colchide), **Burhinidés** (Oedicnème criard), **Caprimulgidés** (Engoulevent d'Europe), **Sylviidés** (Bouscarle de Cetti, Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, Locustelle luscinioidé, Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte, Hypolaïs polyglotte, Fauvette pitchou, Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot de Bonelli, Pouillot sifleur, Pouillot véloce, Pouillot ibérique, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet à triple bandeau).

➔ Étienne DUPOUX :

Scolopacidés (Bécasseau maubèche, Bécasseau sanderling, Bécasseau minute, Bécasseau cocorli, Bécasseau variable, Combattant varié, Bécassine sourde, Bécassine des marais, Bécasse des bois, Barge à queue noire, Barge rousse, Courlis corlieu, Courlis cendrée, Chevalier arlequin, Chevalier gambette, Chevalier aboyeur, Chevalier culblanc, Chevalier sylvain, Chevalier guignette, Tournepierrre à collier), **Sternidés** (Sterne caugek, Sterne pierregarin, Guifette moustac, Guifette noire, Guifette leucop-tère), **Motacillidés** (Pipit des arbres, Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Bergeronnette printanière, Bergeronnette printanière d'Italie, Bergeronnette printanière flavéole, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Bergeronnette de Yarrell),

Troglodytidés (Troglodyte mignon), **Prunellidés** (Accenteur mouchet, Accenteur alpin), **Fringillidés** (Pinson des arbres, Pinson du Nord, Serin cini, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Tarin des aulnes, Linotte mélodieuse, Sizerin flammé, Bec-croisé des sapins, Bouvreuil pivoine, Bouvreuil pivoine trompetteur, Grosbec casse-noyaux), **Emberizidés** (Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant fou, Bruant ortolan, Bruant des roseaux, Bruant poyer).

➔ **Ludovic FLEYTOU :**

Upupidés (Huppe fasciée), **Corvidés** (Pie bavarde, Choucas des tours, Corneille noire, Grand corbeau).

➔ **Robert GAUTHIER :**

Podicipédidés (Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grèbe jougris, Grèbe à cou noir), **Phalacrocoracidés** (Grand Cormoran), **Muscicapidés** (Gobemouche gris, Gobemouche noir), **Passéridés** (Moineau domestique, Moineau friquet, Moineau soulcie).

➔ **Alain & Sylvie GENDEAU :**

Gruidés (Grue cendrée).

➔ **Bruno LABIDOIRE :**

Columbidés (Pigeon biset urbain, Pigeon colombin, Pigeon ramier, Tourterelle turque, Tourterelle des bois), **Alaudidés** (Alouette lulu, Alouette des champs).

➔ **Pierre MARTHON :**

Ciconiidés (Cigogne noire, Cigogne blanche), **Cuculidés** (Coucou gris), **Méropidés** (Guêpier d'Europe), **Turdidés** (Rougegorge familier, Rossignol philomèle, Gorgebleue à miroir, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Tarier pâle, Traquet motteux, Merle à plastron, Merle noir, Grive litorne, Grive musicienne, Grive mauvis, Grive draine).

➔ **Stéphane MORELON :**

Paridés (Mésange nonnette, Mésange boréale, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière).

➔ **David NAUDON :**

Aegithalidés (Mésange à longue queue), **Sittidés** (Sittelle torchepot), **Tichodromadidés** (Tichodrome échelette), **Certhiidés** (Grimpereaux des bois, Grimpereaux des jardins), **Oriolidés** (Loriot d'Europe).

➔ **Gilles PALLIER :**

Ardéidés (Butor étoilé, Bihoreau gris, Héron garde-bœufs, Aigrette garzette, Grande Aigrette, Héron cendré, Héron pourpré), **Cinclidés** (Cincle plongeur).

➔ **Isabelle PRADIER :**

Laniidés (Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse).

➔ **Olivier SCHILTZ :**

Accipitridés (Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Autour des palombes, Épervier d'Europe, Buse variable, Aigle criard, Aigle royal, Aigle botté), **Pandionidés** (Balbuzard pêcheur), **Falconidés** (Faucon crécerelle, Faucon kobez, Faucon émerillon, Faucon hobereau, Faucon pèlerin).

➔ **Anthony VIRONDEAU :**

Gaviidés (Plongeon catmarin, Plongeon imbrin), **Alcédinidés** (Martin-pêcheur d'Europe), **Hirundinidés** (Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre), **Bombycillidés** (Jaseur boréal), **Corvidés** (Corbeau freux).

Liste des espèces observées



Grèbe à cou noir, Videix (87), avril 2006 (Raphaël Bussière)

Pour cette synthèse, un petit changement s'impose concernant la liste systématique. En effet, des modifications ont été apportées au classement des oiseaux et aux noms scientifiques par le comité taxonomique consultatif européen de l'AERC dont la commission de l'Avifaune Française (CAF) est membre. Cette mise à jour fait office de référence en date du 30 juin 2007. La liste systématique peut être obtenue en pdf sur le site de la LPO (www.lpo.fr/oiseaux/index.shtml).

ANATIDÉS

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

● Rares sont les plans d'eau qui accueillent l'espèce. La majorité des données proviennent de l'étang de Lavaud (87), de l'étang de Landes (23) et du secteur d'Azat-le-Ris (87). Un nombre remarquable de 33 individus est noté le 31/12/05 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP). Même si des parades sont observées le 28/03/05 à l'étang de la Bastide (23-VirA), la reproduction ne sera pas prouvée.

Cygne noir (*Cygnus atratus*)

● Un individu est présent continuellement sur les étangs du bassin de Gouzon (23). Deux autres observations sont répertoriées :

- 1 ind. le 28/12/05 au barrage de la Mazelle (87-Sepol),
- 1 ind. le 11/04/06 à l'étang de Toueille (23-TarE).

L'origine captive des oiseaux ne fait aucun doute.

Oie rieuse (*Anser albifrons*)

● Durant le passage prénuptial 2006, un oiseau est noté à deux reprises (12/03 et 26/03) à l'étang de Lavaud (87-BusR). Il est probable qu'il s'agisse du même oiseau.

Oie cendrée (*Anser anser*)

● Durant l'automne 2004, 5 données font état d'oiseaux en migration postnuptiale du 16/10/04 où 5 individus sont posés dans un champ de maïs à Gorre (87-ChaS) au 28/12/04 où 4 oies migrent à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Le passage postnuptial 2005 n'apportera qu'une seule donnée : 20 individus passent à Flavignac (87-PreP). Bien que quelques observations aient eu lieu au cours du mois de janvier, aucun véritable hivernage n'est décelé.

Le passage prénuptial, concentré durant le mois de février, apporte de nombreuses observations. Ainsi, 30 oies sont posées le 20/02/05 à l'étang de Murat (87-FleL), et 35 ind. le 09/02/06 à l'étang de Bournazel (19-MarP).

Un vol migratoire relativement tardif, le 05/04/05, regroupe 52 individus à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Oie à tête barrée (*Anser indicus*)

● Un individu est présent les 13/03/05 et 14/03/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR et SotJ). Il s'agit sans doute d'un oiseau échappé de captivité.

Bernache du Canada (*Branta canadensis*)

● Il n'est pas aisé de déterminer l'origine des oiseaux observés dans notre région. L'espèce n'est mentionnée qu'à 5 reprises, dont une observation de 20 individus le 06/12/04 à La Geneytouse (87-Cha).

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)

● 19 des 21 citations proviennent de l'étang des Bordes (87). La présence quasi permanente de 3 individus sur ce site ne laisse planer aucun doute quand à l'origine captive des oiseaux.

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

● Observé à 12 reprises, exclusivement durant l'hiver et le printemps sur les plans d'eau de grande superficie. Un groupe de 25 individus est présent le 20/12/04 à l'étang de Landes (23-DupE). Un tadorne se nourrit sur la berge en compagnie d'un groupe de sarcelles d'hiver le 08/01/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR). La mention la plus tardive concerne deux oiseaux vus le 06/05/05 à l'étang de Landes (23-LabA).

Canard mandarin (*Aix galericulata*)

● 6 observations font état de la présence de l'espèce, dont 4 fois à l'étang de Saint Fortunat (87-PreP) qui a accueilli de 1 à 3 individus durant le mois de novembre 2005.

Canard siffleur (*Anas penelope*)

● Revient en Limousin dès la mi-septembre avec l'observation d'un individu le 18/09/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ) et 3 ind. le 16/09/05 sur le même site. Rapidement les effectifs augmentent pour atteindre 150 individus le 12/12/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ). Ce site est le principal lieu d'hivernage de l'espèce en Limousin. Lors du comptage Wetlands du 16/01/05, 39 oiseaux sont comptés dont 23 dans le bassin de Gouzon (23). En 2006, toujours lors du Wetlands, 49 individus sont observés dont 37 à l'étang de Landes (23-PalG).

Dès le mois de février, on observe une augmentation des citations liée à la migration pré-nuptiale :

- 80 ind. le 07/02/05 à l'étang de Landes (23-VinS),
- 25 ind. le 23/03/05 à l'étang de Jonas (87-LanJ),
- 86 ind. le 11/02/06 à l'étang de la Vierge (23-DubP),
- 19 ind. le 17/03/06 à l'étang de Bournazel (19-SouP).

Les dernières observations sont faites en avril : le 24/04/05 à l'étang de Landes (23-DupE) et le 11/04/06 à l'étang de Cieux (87-BouH).

Canard chipecau (*Anas strepera*)

● L'espèce est d'observation régulière en Limousin, bien que les effectifs atteints ne soient jamais importants. 60 % des citations proviennent de l'étang de Landes (23).

Le passage postnuptial ne débute qu'en octobre et se poursuit en novembre :

- 24 ind. le 31/10/04 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 5 ind. le 13/11/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-HubP),
- 1 ind. le 20/10/05 à l'étang des Courtilles (23-RobS),
- 25 ind. le 12/11/05 à l'étang de Landes (23-BarJ).

Durant l'hiver, des oiseaux sont notés régulièrement et principalement sur les étangs du bassin de Gouzon (23) et à l'étang de Murat (87) :

- 29 ind. le 23/12/04 aux étangs du Bassin de Gouzon (23-PalG),
- 2 ind. le 16/01/05 à l'étang de Murat (87-CouR),
- 4 ind. le 15/01/06 à l'étang de Landes (23-PalG),
- 3 ind. le 15/01/06 à l'étang de Murat (87-CouR).

Le passage prénuptial, assez diffus, se concentre en février et mars mais les groupes vus sont en faible effectif :

- 6 ind. le 20/02/05 à l'étang de la Bastide (23-DupE),
- 1 ind. le 17/03/05 sur l'étang de Néravaud (23-MerC),
- 3 ind. le 26/03/05 à l'étang du Coiroux (19-MarP).

En 2006, le passage est quasiment inexistant avec seulement 4 observations totalisant 5 individus pour les mois de février et mars.

En période de reproduction, l'espèce n'est visible qu'à l'étang de Landes ainsi qu'à l'étang Tête de Bœuf (23). Aucune preuve de reproduction n'a pu être prouvée.

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

● L'espèce est observée toute l'année, mais elle se fait plus rare en période de reproduction.

Elle revient en nombre dès la fin de l'été :

- 12 ind. le 23/08/05 à l'étang de Murat (87-VirA),
- 14 ind. le 23/08/05 à l'étang de Boutilly (87-VirA),
- 5 ind. le 07/09/04 à Liginiaç (19-BarJ).

L'arrivée des premiers froids fait augmenter fortement les effectifs :

- 80 ind. le 01/12/04 à l'étang de Murat (87-EyrO),
- 69 ind. le 20/12/04 à l'étang Tête de Bœuf (23-DupE),
- 75 ind. le 20/11/05 à l'étang de Landes (23-PalG).

Au cœur de l'hiver deux sites accueillent régulièrement plus d'une centaine d'individus, il s'agit de l'étang de Murat (87) et de l'étang de Landes (23).

Au cours de la migration prénuptiale, des individus sont observés sur de nombreux plans d'eau, avec des effectifs de quelques dizaines au maximum.

L'espèce est très discrète en période de reproduction :

- reproduction certaine (observation de jeunes) à l'étang Boutilly en juin 2006 (87-CavP),
- observation d'un couple le 06/06/06 à l'étang de Chabannes (19-BouH).

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

● L'espèce est très commune. Elle est observée toute l'année et souvent en nombre sur les plans d'eau du Limousin.

L'hiver certains rassemblements peuvent être très importants et atteindre 1 600 individus présents le 19/12/05 à l'étang de Landes (23-VirA).

La nidification peut être relativement précoce. Des coquilles d'œufs sont trouvées le 17/03/06 à l'étang du Bois de Sainte-Anne (87-RogJ). Rares sont les plans d'eau à ne pas accueillir la nidification de l'espèce.

Canard pilet (*Anas acuta*)

● L'espèce fréquente en petit nombre les plans d'eau limousins. Quatre sites concentrent plus des trois quarts des citations : l'étang de Landes (23), le lac de Saint-Pardoux (87), le Grand étang d'Azat-le-Ris (87) et l'étang de Lavaud (87).

Les premiers individus sont de retour le 15/09/05 à l'étang de Landes (23-MerC). Les groupes postnuptiaux sont généralement de faible effectif, le plus important étant de 11 individus le 10/10/04 à l'étang de Landes (23-SauJ).

Aucun hivernage véritable n'est détecté, même si 7 individus sont présents le 02/01/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ), et 1 oiseau isolé le 15/01/06 à l'étang de Landes (23-PalG).

La majorité des citations proviennent du passage prénuptial. Des groupes conséquents sont parfois vus :

- 35 ind. le 14/03/05 à l'étang de Lavaud (87-SotJ),
- 47 ind. le 17/03/06 à l'étang de Landes (23-BurS),
- 54 ind. le 23/03/06 à l'étang de Lavaud (87-LabA).

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)

● Cette espèce a fourni très peu de données, seulement 21 mentions.

Très discrète durant la migration postnuptiale, elle n'est observée que deux fois à cette occasion :

- 1 ind. le 15/09/05 à l'étang de Landes (23-MerC),
- 2 ind. le 13/08/06 à l'étang de Landes (23-BarJ).

Les autres données concernent uniquement le passage prénuptial au cours des mois de mars et avril :

- 3 ind. le 26/03/05 à l'étang du Coiroux (19-MarP),
- 14 ind. le 26/03/06 à l'étang de Lavaud (87-BusR),
- 4 ind. le 01/04/06 à l'étang de Cieux (87-BouH),
- 11 ind. le 02/04/06 à l'étang de Landes (23-PalG).

Aucun indice de nidification ne sera obtenu durant ces deux années. Faut-il y voir un manque de prospection ou une désertion momentanée de l'étang de Landes qui accueille régulièrement l'espèce en période de reproduction ?

Canard souchet (*Anas clypeata*)

● Lorsque l'été touche à sa fin, les premiers oiseaux sont vus le 31/08/04 à l'étang de Cieux (87-BouH) et le 17/08/05 à l'étang de la Serrerie avec 4 oiseaux (87-DumA).

Le passage postnuptial culmine en octobre et novembre :

- 23 ind. le 31/10/04 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 40 ind. le 12/11/05 à l'étang de Landes (23-BarJ).

Durant l'hivernage, quelques rares oiseaux sont présents épisodiquement sans que l'on puisse apparenter cela à un véritable hivernage.

Le retour des oiseaux s'observe à la fin du mois de février, le mois de mars concentrant de gros effectifs :

- 16 ind. le 19/03/05 à Neuvic (19-BarJ),
- 28 ind. le 19/03/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR),
- 32 ind. le 23/03/06 à l'étang de Lavaud (87-LabA),
- 42 ind. le 26/03/06 à l'étang de Montsour (19-SegC),
- 30 ind. le 27/03/06 à l'étang de Cieux (87-SchO).

Une observation quelque peu insolite est faite le 12/03/06 sur la Butte de Frochet à Bussière-Boffy, où 5 individus passent en migration active (87-DouA).

Malgré la présence d'oiseaux isolés durant le printemps et l'été à l'étang de Landes (23), aucune reproduction n'a été constatée.

Nette rousse (*Netta rufina*)

● Trois mentions sont rapportées :

- 2 ind. le 19/03/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 1 femelle immature le 14/09/05 à l'étang de la Mazère (87-MerC),
- 1 couple le 13/03/06 à l'étang de Landes (23-DesN).

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

● Présent toute l'année. Il s'agit du fuligule le plus régulièrement observé.

Au cours du mois d'octobre, des groupes commencent à se constituer :

- 11 ind. le 30/10/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-SotJ),
- 59 ind. le 31/10/04 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 30 ind. le 24/10/05 à l'étang de Landes (23-DubG).

Durant l'hiver, si l'espèce est notée sur de nombreux étangs, quelques uns se distinguent par le nombre d'individus présents :

- 60 ind. le 31/12/04 à l'étang des Planchettes (87-NorT),
- 129 ind. le 16/01/05 à l'étang de Landes (23-PalG),
- 124 ind. le 16/01/05 à l'étang de Murat (87-CouR),
- 82 ind. le 30/01/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 114 ind. le 05/02/05 à l'étang de Lavillemichel (87-HubP).

Ce fuligule se reproduit dans le nord de la région :

- couple présent le 13/05/05 à l'étang de Lavillemichel (87-MerC),
- reproduction certaine en 2005 à l'étang Tête de Bœuf où 6 jeunes sont observés (23-VirA),
- reproduction certaine en 2006 à l'étang de Boutilly (87-CavP) et à l'étang de Landes (23-HubP).

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)

● Une seule mention : un mâle en plumage nuptial découvert le 29/12/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA).

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

● Beaucoup moins commun que son cousin le milouin. Les effectifs sont toujours très faibles.

Absent durant la période estivale, il est de retour durant l'automne où des individus sont vus, le plus souvent à l'unité ou en très petit groupe.

Les mois de janvier et février réunissent la majorité des observations :

- 3 ind. le 15/01/05 à l'étang de Boutilly (87-MerC),
- 1 ind. le 17/02/05 à l'étang des Bordes (87-CoqM).

L'effectif le plus important est noté le 15/03/06, où 8 oiseaux présents au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP). Un couple est observé le 11/05/06 à l'étang de Landes mais aucune preuve de reproduction n'a été rapportée par la suite (23-LabA).

Fuligule milouinan (*Aythya marila*)

● Une femelle est observée le 16/05/05 à l'étang de Boutilly (87-CavP) et un mâle le 13/03/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR).

Eider à duvet (*Somateria mollissima*)

● Un mâle a stationné du 13/02/06 au 19/03/06 à l'étang Neuf (19-ChaJ et *al.*). Au vu des observations, son régime alimentaire était en partie composé d'écrevisses.

Macreuse brune (*Melanitta fusca*)

● Un groupe remarquable de 6 est observé le 20/12/04 à l'étang de Landes (23-DupE).

Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)

● Deux citations portant sur l'observation de femelles :

- 1 ind. le 16/03/05 à l'étang de la Mazère (87-MerC),
- 2 femelles le 19/02/06 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP).

Harle piette (*Mergus albellus*)

- Visiteur d'hiver occasionnel dans la région.

Un individu est observé le 11/02/06 à l'étang de Landes (23-DubP), et deux sont vus le 22/03/06 à l'étang de Landes (23-RouJ).

Harle huppé (*Mergus serrator*)

● Une femelle stationne du 22/12/04 au 27/12/04 à l'étang de Landes (23-AudA et *al.*). L'hiver suivant, toujours en décembre, un couple est vu le 15/12/05 une fois de plus sur l'inévitable étang de Landes (23-DubP).

Harle bièvre (*Mergus merganser*)

● Cette espèce ne se montre que durant la période hivernale, 30 des 38 mentions proviennent de l'hiver 2004/2005.

Une femelle stationne du 15/12/04 au 23/02/05 à l'étang de Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Ce même hiver, 5 individus sont présents durant 4 jours sur l'étang de la Pêcherie (87-SchO et *al.*).

Les grands lacs de barrage situés sur la Montagne limousine sont ceux qui attirent le plus l'espèce : lac de Vassivière (87/23), lac de Viam (19), lac du Chamet (19) etc.

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)

● Un maximum de 15 individus ensemble le 11/12/05 à Lagnac-sur-Rondelles (19-ChaJm). Des individus peu farouches sont souvent observés à l'unité ou par paire, et n'hésitent pas à s'approcher des habitations en toute saison. Trois indices de reproduction certaine : des jeunes sont notés le 14/07/05 à Charrier-Ferrière (19-GauR) et le 01/06/05 à Fontanières et Sannat (23-DubP).



Perdrix rouge, Budelière (23), avril 2006
(Pascal Duboc)

Perdrix grise (*Perdix perdix*)

● L'espèce est bien plus rare que la précédente, avec sept observations sur la période considérée. Un groupe de 4 individus est noté le 17/10/04 à Neuvic (19-BarJ). Des mâles chanteurs sont entendus le 01/06/05 et 15/06/05 sur les secteurs de Chambon-sur-Voueize et Evaux-les-Bains (23-DubP). La reproduction n'est pas prouvée.

Caille des blés (*Coturnix coturnix*)

● Dernière mention le 03/08/05 avec un chant entendu. Les premiers migrateurs sont entendus le 25/04/05 à Ambazac (87-LanJ) et le 18/04/06 à Beynat (19-CorP). L'essentiel des citations concerne des mâles chanteurs isolés. L'espèce est principalement contactée en Haute-Vienne (56 citations), puis en Corrèze (34 citations) et en Creuse (24 citations). Deux preuves de reproduction certifiées : des poussins le 01/06/05 à Beynat (19-MarP) et une famille le 15/06/06 à Masléon (87-DesM). Notons, cet individu victime de la circulation routière le 19/06/06 à Chéniers (23-LanJ).

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)

● Un maximum de 8 individus ensemble le 19/03/05 à Bussière-Galant (87-CouC) et le 11/12/05 à Flavignac (87-PreP). Un seul indice de reproduction certaine en milieu naturel : des jeunes avec une femelle le 18/05/06 à Gajoubert (87-LabB). Un individu mélanique est observé le 09/02/05 à Ambazac (87-LanJ).



GAVIIDÉS

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)

● Deux individus sont signalés au cours de la période considérée. Un oiseau de 1^{er} hiver est découvert le 19/12/04 au lac de Saint-Pardoux (87-DesF). Il est contacté ensuite à plusieurs reprises jusqu'au 30/01/05 (SotJ et al.), hivernant sur le lac durant 43 jours au moins. Un autre individu est observé l'année suivante, le 18/02/06, à l'étang de Jonas (87-LanJ). Il s'agit peut-être d'un oiseau en halte migratoire, lors de sa remontée vers les sites de reproduction.

Plongeon imbrin (*Gavia immer*)

● Un seul individu, de 1^{er} hiver, est observé au cours de la période considérée. Il est découvert le 06/02/06 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ), puis est revu les jours suivants jusqu'au 09/02/06 (SchO et al.), effectuant une halte migratoire de quelques jours. Les plongeurs sont des espèces rares à l'intérieur des terres, en Limousin comme ailleurs. Néanmoins, le lac de Saint-Pardoux (87) et le lac de Vassivière (23-87) sont de bons sites pour les rechercher en hiver.

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

- Quelques rassemblements sont observés en fin d'été :
 - 12 ind. le 29/09/04, puis 11 les 28 et 31/10/04 à l'étang des Bordes (87-GauR et HubP),
 - 45 ind. le 14/08/05, puis 33 le 16/08/05 et 40 le 23/08/05 à l'étang de Boutilly (87-VirA et CavP),
 - 10 ind. le 26/10/05 à l'étang des Bordes (87-GauR).

Les effectifs hivernaux sont peu élevés et n'excèdent pas 5 individus sauf :

- 7 ind. le 08/01/05 à l'étang des Oussines (19-BarJ),
- 8 ind. le 15/11/05 à l'étang des Bordes (87-VirA),
- 12 ind. le 15/01/06 sur la Vienne à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- 12 ind. le 20/01/06 sur les bords de Vienne à Limoges (87-LabA).

La nidification de l'espèce fournit quelques données de reproduction certaine :

- 1 jeune volant le 28/06/05 à l'étang de Charrain (87-GauR),
- 2 couples avec 2 jeunes chacun le 14/07/05 à l'étang de la Maison de Bois (87-VirA),
- 2 jeunes non volants à l'étang Tête de Bœuf (23-VirA),
- des familles le 13/08/05 à Blaudeix (23-NorT),
- 1 jeune quémante sa nourriture le 17/06/06 à l'étang de Boutilly (87-CavP),
- 3 jeunes non volants le 25/06/06 à l'étang de la Chassagne (19-GauR),
- 2 jeunes le 26/06/06 à Oradour-sur-Vayres (87-LabB).

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

- Les premiers rassemblements conséquents sont notés à partir de la deuxième décennie de septembre avec 80 individus le 19/09/04 à l'étang de Landes (23-DubG).

Les plus gros effectifs sont comptabilisés de décembre à début avril :

- 100 ind. du 30/01/05 au 26/02/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ et HubP),
- 90 ind. le 02/04/05 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 100 ind. le 29/12/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA).

Les premières parades sont signalées le 01/01/05 à l'étang de Cieux (87-CoqM) et le 22/01/06 à l'étang des Bordes (87-GauR). Les années 2005 et 2006 fourniront une cinquantaine de données de reproduction, parmi lesquelles : les premiers jeunes notés le 25/05/05 à l'étang Saint-Fortunat (87-PreP) et le 27/05/06 à l'étang de L'Age (87-CavP).

Grèbe jougris (*Podiceps grisegena*)

- L'espèce reste accidentelle dans notre région. Durant cette période, 4 sites l'ont accueilli :

- 2 ind. le 13/11/04 au Grand Etang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. séjourne du 29/12/05 au 17/02/06 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA et HubP),
- 1 ind. séjourne du 21/01/06 au 27/02/06 à l'étang de la Pouge (87-VirA, FleJ et HubP),
- 1 ind. le 21/01/06 au lac de Vassivière (23-GenC).

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

Les observations sont essentiellement comprises entre la mi-mars et la fin septembre. L'étang de Landes fournit à lui seul plus de 70 % des données pour la période.

Au printemps, un individu est noté à l'étang de Landes du 26 au 28/03/05 (23-VinS et VirA), et un le 08/04/06 à l'étang de Lavaud (87-BusR).

Puis en fin d'été, trois observations différentes sont faites :

- 1 ind. le 18/07/05 à Liginiaç (19-BouH),
- 1 ind. le 22/08/05 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 1 ind. le 28/09/05 à l'étang de Landes (23-RobS).

PHALACROCORACIDÉS


Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Dès fin août, de petits groupes sont observés ici et là sur les plans d'eau ou en migration active. La migration s'affirme dans la deuxième quinzaine d'octobre.


Le recensement au dortoir de la mi-janvier montre que l'effectif varie peu d'une année à l'autre.

En février, la diminution des effectifs s'amorce et dès la deuxième décade d'avril la chute est brutale.

L'année 2006 voit les premières nidifications confirmées de l'espèce en Limousin. Un nid garni avec œufs est découvert le 08/04/06 à La-Croix-sur-Gartempe (87-CavP) et un autre le 27/05/06 au Dorat (87-CavP).



Nombre d'individus de Grands cormorans par semaines
du 16/08/04 au 15/08/05



Nombre d'individus de Grands cormorans par semaines
du 16/08/05 au 15/08/06

ARDEIDÉS

Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)

● Aucune donnée estivale. Seule une donnée hivernale est répertoriée le 10/11/05, avec l'observation d'un individu posé au barrage de Bujaleuf (87-FauFr).

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

● Les derniers individus en période postnuptiale sont signalés le 28/08/04 à l'étang de Landes (23-DudG), et un vol de 13 oiseaux est mentionné le 21/08/04 à Saint-Loup, situé au sud de l'étang de Landes (23-DudG). En 2005, 28 oiseaux sont encore présents sur ce même étang le 30/08 (23-DupE) et 2 ind. le 10/09 (23-DubG). L'ultime observation de 2005 nous vient le 11/09 de Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR).

Les premières observations sont tardives en 2005 puisqu'elles sont enregistrées seulement à partir du 24/04 à l'étang de Landes avec 1 individu et 8 ind. à l'étang Tête de Boeuf (23-DupE) ; de même à Saint-Pantaléon-de-Larche où un oiseau est observé le 06/05 (19-GauR). Les dates de retour sont plus classiques pour l'espèce en 2006 avec les premiers adultes signalés dans les trois départements :

- 1 ind. le 31/03 à l'étang du Griffolet (19-CoqM),
- 1 ind. le 01/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 2 ind. le 02/04 à l'étang de Landes (23-PalG).

Le 21/04, deux individus sont présents sur l'étang de la Pouge (87-OllJ), et un oiseau est signalé en vol le 05/06/06 à Aix-sur-Vienne (87-LabB), dans un secteur où la reproduction de l'espèce n'est pas connue.

Les seuls cas de nidification proviennent de l'étang de Landes et de sa région. Ainsi, un couple observé le 15/06/05 se reproduit à l'étang de Tornage (23-DubP), alors que 4 couples étaient installés en 2004 mais l'arbre qui supportait les nids est tombé entre temps. Sur l'étang de Landes où le dénombrement exhaustif des oiseaux est difficile, la reproduction se déroule sur les deux colonies mixtes, celle située au nord-est et celle du sud-ouest. De mai à juillet, des adultes et des jeunes sont observés régulièrement dans les deux héronnières (23-BarJ, DupE, DubG et PalG). Plus de trente individus dont 12 juvéniles sont présents sur les colonies ou sur le pourtour de l'étang le 15/07/05 (23-VirA). Retenons également, la possible reproduction de l'espèce en dehors de son bastion régional de l'étang de Landes, avec la découverte de 2 nids situés dans la partie basse des arbres à 50 cm au dessus de l'eau le 14/08/05 à Verneuil-Moustier (87-VirA). Un individu de 1^{er} été est observé sur ce même site le 30/05/06 (87-VirA). Les premiers nids occupés à l'étang de Landes sont signalés le 14/04/06 (23-VirA). Notons la découverte de trois nids occupés le 15/04/06 à l'étang de la Bastide et 2 à l'étang Tête de Bœuf, (23-PalG). Un minimum de 20 couples se sont reproduits en 2006 à l'étang de Landes selon les relevées du 06/06 et 15/06 (23-BurS et PalG). Des observations régulières de quelques individus sont notées ici et là de mai à août (23-BarJ, BusR, DupE, LabA et Pral).

Héron garde-boeufs (*Bubulcus ibis*)

Peu d'observations sont enregistrées à l'automne 2004. Elles proviennent de l'étang de Landes où 2 à 3 individus au maximum sont vus régulièrement entre le 25/10 et 31/10 (23-DupE et DubG), et de Meilhac avec l'observation de 40 oiseaux (87-MerC). Un individu est noté le 30/08/05 à l'étang de Landes (23-DupE) sans autres données automnales et hivernales pour ce lieu. Par contre, sa présence en hiver est signalée dans le reste de la région mais toujours avec de petits effectifs : en Haute-Vienne par exemple le 09/12/05 à la Maisonnais-sur-Tardoire (87-CouC), le 17/12/05 à l'étang de la Pouge (87-Pral), et en Corrèze le 13/12/05 à Turenne (19-DauR).

La reproduction est suspectée à l'étang de Lande dès l'année 2005 avec la présence d'un oiseau adulte dans la héronnière le 10/06 (23-MerC), mais ce n'est qu'en 2006 qu'un couple reproducteur est présent le 15/04 dans la héronnière du nord-est sur son nid (23-PalG). Les jeunes sont éclos et un adulte nourrit les jeunes le 06/06 (23-PalG). Il s'agit de la première donnée de nidification de l'espèce pour le Limousin !

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

Les observations de fin d'été et d'automne ne sont pas fréquentes en dehors du bastion des étangs de Lussat :

- 5 ind. le 05/09/04 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-BarP),
- 6 ind. le 13/08/05 à l'étang des Portes (23-MerC),
- 3 ind. le 31/08/05 à l'étang Le Cante (23-MerC).

Une seule observation pour la Corrèze le 15/08/05 aux Gravières à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR).

Trois oiseaux sont observés le 01/11/04 à l'étang de Landes (23-CoqM) ainsi qu'un autre le 27/12/04 (23-MerC). Les autres observations hivernales, avec un individu à chaque fois, se font au Grand Etang d'Azat-le-Ris les 13/11 et 21/11/04 (87-CavP et JofP), et le 29/12/04 à l'étang de Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Durant l'hiver 2005/2006, aucune observation de l'espèce n'est signalée sur les étangs de Lussat où l'aigrette garzette se reproduit. Les données hivernales concernent la Creuse, avec 1 ind. le 04/01/06 à l'étang de la Reyberie, et la Haute-Vienne où 1 oiseau est observé du 21 au 25/01/06 à l'étang de la Pouge (87-PreP et VirA). Un individu est également présent le 09/02/06 au lac de Saint-Pardoux (87-SchO).

L'étang de Landes est la seule localité du Limousin où se reproduit l'espèce. La nidification se déroule dans les héronnières mixtes en grande proximité avec les autres hérons arboricoles du site. Un nid occupé est signalé le 21/05/05 dans la héronnière située au nord-est de l'étang (23-DupE). Pour l'année 2006, la reproduction est confirmée dès le 15/04 avec la présence de 2 couples toujours dans la même héronnière (23-PalG). Les oiseaux couvent le 25/05 (23-VirA). Un troisième couple est observé le 15/06 dans la héronnière sud-ouest alors que les jeunes se font nourrir dans les 2 nids de la colonie nord-est (23-BurS et PalG).

Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)

La migration postnuptiale débute dès les mois de juillet et août comme en atteste le contrôle d'un oiseau bagué le 07/08/05 à l'étang de Murat (87-MouG). Il était originaire du lac de Grand-Lieu (Loire-Atlantique), où il avait été bagué poussin par Loïc Marion le 17/05/04. Le Lac de Grand-Lieu, avec plus de 140 couples nicheurs, est le site de reproduction le plus important en France (environ 80 % de la population nicheuse). Les effectifs culminent dans notre région en novembre, décembre et début janvier :

- 37 ind. le 10/12/04 à l'étang Tête de Bœuf (23-DubG),
- 36 ind. le 20/12/04 à l'étang Tête de Bœuf (23-DupE),
- 20 ind. le 13/01/05 à l'étang de Landes (23-RobS),
- 29 ind. le 20/11/05 à l'étang de Landes (23-PalG),
- 62 ind. le 29/11/05 sur les 3 étangs de Lussat (23-DubP),
- 41 ind. le 04/12/05 aux étangs Tête de Bœuf et La Bastide (23-GauR),
- 61 ind. le 15/12/05 sur les 3 étangs de Lussat (23-DubP).

En dehors de ces périodes favorables, des observations d'individus isolés ou de petits groupes sont enregistrées sur plus de 40 sites, en dehors des étangs de Lussat, en Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. A noter deux adultes en plumage nuptial observés le 28/03/05 à l'étang de Landes, sans tentative de reproduction (23-VirA).



Grande aigrette, Chambon-sur-Voueize (23), décembre 2008 (Pascal Duboc)

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

Il s'agit du héron le plus commun en Limousin aussi bien en migration post et pré-nuptiale, en hivernage qu'en période de reproduction. La migration postnuptiale amène des rassemblements parfois importants, en particulier :

- 50 ind. le 19/09/04 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 18 ind. le 22/09/04 à Lignac (19-BarJ),
- 17 ind. le 24/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 13 ind. le 22/10/04 à l'étang de Lavaud (87BusR),
- 100 ind. le 10/09/05 et 70 ind. encore présents le 24/10/05 (DubG).

Hivernage : en décembre 2004, la vidange de l'étang Tête de Bœuf est le lieu de quelques rassemblements plus importants avec 75 ind. le 20/12 (DupE), 38 ind. le 23/12 (23-VirA) et 24 ind. le 24/12 (23-DupE). En prenant comme référence le comptage WETLANDS du 16/01/05 et du 12/01/06, c'est à l'étang de Murat et les étangs du bassin de Gouzon (Tête de Bœuf, la Bastide, la Vierge et l'étang de Landes) que les effectifs étaient les plus importants. Le comptage révèle la présence de 31 ind. en 2005 et 20 ind. en 2006 à l'étang de Murat (87-CouR), et de 51 ind. en 2005 et 43 ind. en 2006 pour le bassin de Gouzon (23-PalG). 24 ind. sont observés le 15/01/06 à l'étang de la Pouge (87-VirA) avec un maximum de 33 individus dénombrés le 29/01/06 (87-FleJ).

Les premières données d'oiseaux au nid en 2005 proviennent de Rilhac-Lastours le 13/02 (87-DumA) et en 2006 de l'étang de Landes à une date classique le 10/02 (23-DubP). Alors que les différents sites de reproduction sont occupés, des oiseaux en migration active sont signalés à Flavignac le 12/03/05 (87-PreP). Les deux colonies les plus importantes se localisent pour la première à Mézières-sur-Issoire en Haute-Vienne où un minimum de 81 couples sont dénombrés le 03/04/05 (87-DouA), et pour la deuxième en Creuse à l'étang de Landes avec au moins 47 nids occupés le 02/04/06 (23-PalG). Les jeunes bien visibles sur les nids sont notés dès le 02/04/05 à l'étang de Marsaguet (87-DumA), et le 07/04/06 à l'étang de l'Age (87-CavP). Pour l'ensemble de la région, 45 sites de reproduction sont dénombrés sur les deux années 2005 et 2006 : 22 pour la Haute-Vienne, 12 pour la Creuse et 11 pour la Corrèze.



Héron cendré, Videix (87), mars 2005 (Raphaël Bussière)

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

En 2004, les derniers oiseaux sont signalés le 19/09 à l'étang de Landes (23-DubG) et le 22/09 à l'étang des Planchettes (87-CavP). La dispersion postnuptiale 2005, en dehors du bassin de Gouzon (23) où l'observation de l'espèce est régulière jusqu'au 10/09 (23-DubG), concerne plusieurs secteurs de la région Limousin :

- 3 ind. le 14/08 et 2 ind. le 22/08 (87-VirA) puis 1 adulte le 02/09 et 1 juvénile le 14/09 à l'étang de Murat (87-MerC),
- 1 ind. le 15/08 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR),
- 1 juvénile le 16/08 à l'étang des Planchettes (87-CavP),
- 1 ind. en migration active le 11/09 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Le retour sur les lieux de reproduction, en 2005, est noté le 07/04 à l'étang de Landes (23-TheM) avec un individu, puis d'autres observations suivent le 12/04 (23-MerC) et un total de 7 oiseaux présents sur le site le 24/04 et 10 ind. le 01/05 (23-DupE). Bien que l'espèce soit observée sur les étangs voisins de la Bastide et Tête de Bœuf, la reproduction concerne uniquement l'étang de Landes où 2 nids occupés sont signalés le 15/05 (23-BarJ), 5 nids le 21/05 (23-DupE), et 10 adultes sont observés sur la colonie le 28/05 pour un minimum de 7 nids (DubG et PalG). 13 juvéniles sont dénombrés sur la colonie NE de l'étang de Landes le 15/07 (23-VirA). Ce sont 25 oiseaux volants, juvéniles et adultes, qui sont posés en queue d'étang le 16/07. Il faut noter la présence insolite, pour la date, d'un individu probablement en plumage de 1^{er} été le 26/05/05 à Lignac (19-BarJ).

L'arrivée des premiers migrateurs en 2006 est constatée le 02/04 (23-PalG). D'autres observations suivent en avril (23-VirA, DubG, PalG) avec un relevé le 15/04 où 7 nids sont occupés (23-PalG). Un deuxième comptage permet de mettre en évidence un minimum de 9 nids le 06/05 et 10 oiseaux adultes sont observés le 15/06 (23-BurS). En dehors de l'étang de Landes, une seule observation d'un oiseau en vol est rapportée le 28/04 à la Lande de Saint-Laurent, commune de la Roche-L'Abeille (87-Pral). Les premiers jeunes volants à l'étang de Landes sont notés le 17/06 (DupE), puis le 04/07 (23-ChaG). Ensuite des observations estivales habituelles d'individus isolés, adulte ou jeune, les 25/07 (23-RobS) et 12/08 (23-BarJ) à l'étang de Landes, le 04/08 à l'étang des Grands Champs (87-CavP), et le 06/08 à l'étang de Murat (87-MouG).

CICONIIDÉS

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

● 73 % des citations recueillies (n=106) concernent des oiseaux observés à l'unité.


Les passages postnuptiaux, 29 citations en 2004 et 18 citations en 2005, débutent par l'observation d'un oiseau posé le 16/08/04 à Saint-Barbant (87-SirD) et 1 ind. le 15/08/05 à Peyrat-la-Nonière (23-CreN). Le passage le plus précoce est mentionné le 14/08/06 avec un individu en migration active à Saint-Léger-Magnazeix (87-StaB). Les groupes les plus importants lors de cette migration sont de :

- 12 ind. le 05/09/04 à Château-Chervix (87-TeuJ),
- 6 ind. le 05/09/04 à Nexon (87-TeuJ),
- 4 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 5 ind. le 18/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 5 ind. le 27/08/05 à Flavignac (87-PreP).

Les passages prénuptiaux, 17 citations en 2005 et 37 citations en 2006, débutent par l'observation d'un oiseau le 01/03/05 à Aubazine (19-MarP) et par 1 ind. le 24/02/06 à Lépinas (23-FanP). Le groupe le plus important en migration prénuptiale est de 5 ind. le 01/04/06 à Aubazine (19-MarP). Les autres observations prénuptiales concernent des oiseaux migrant seuls ou en duo.

On note aussi 3 citations en dehors des fourchettes classiques de migration. Elles présagent l'installation possible de l'espèce comme nicheuse pour bientôt.

- 1 ind. le 04/06/05 à Puy-Malsignat (23-ZinM),
- 1 ind. le 30/07/05 à Lussat (23-DubJ),
- 1 ind. le 06/06/06 à Neuvic (19-GfeE).



Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)


Respectivement 11 et 21 citations aux passages postnuptiaux sont mentionnés en 2004 et 2005 et 3 en août 2006. Les premiers migrateurs sont 18 ind. le 26/08/04 à la Celle-Dunoise, où ils passent la nuit (23-DucJ). En 2005, le premier individu est observé le 13/08/05 à Saint-Loup (23-DubG). Toutefois, le passage le plus précoce est de 24 ind. le 07/08/06 à Châteauponsac (87-LafM). Les derniers migrateurs à être observés sont :

- 1 ind. le 23/10/04 à Veyrac (87-BarMa),
- 1 ind. le 24/10/05 à Séreilhac (87-Sepol).

Pour cette migration, les groupes les plus importants sont de 28 ind. le 05/09/04 à Flavignac (87-PreP) et le 26/08/05 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Des).

Lors de la migration prénuptiale, l'espèce est citée à 13 reprises en 2005 et 21 en 2006. Les premiers migrateurs sont 2 ind. en vol le 27/02/05 à Glénic (23-PioJ), et 1 ind. observé le 23/02/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-GenS). Cette phase migratoire se termine par les observations d'un oiseau le 04/05/05 à Limoges (87-VirJ) et de 2 ind. en vol le 30/05/06 à Saint-Martin-le-Mault (87-VirA). Les groupes les plus importants comprennent 5 ind. le 28/02/05 à Limoges (87-SchO) et 6 ind. le 14/04/06 à Lagraulière (19-ChaJ).

Les voyages de ces oiseaux ne sont pas sans péril. Ainsi 8 individus sont trouvés électrocutés le 27/08/05 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Des). L'espèce n'est pas citée en dehors des périodes classiques de migration.



Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

● Pour la migration postnuptiale, les oiseaux les plus précoces observés sont ces 35 bondrées le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), et le plus tardif est noté le 24/09/04 à Limoges (87-ChaG). Pour les deux années confondues, ce sont 661 oiseaux comptabilisés en migration en août et 419 en septembre.

En migration prénuptiale, les plus précoces sont 5 bondrées le 04/05/06 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-VirA) et l'observation la plus tardive est le 31/05/06 à Palisse (19-SegC). Pour les deux années confondues, ce sont 185 oiseaux comptabilisés en migration en mai.

Les plus belles observations pour le nombre sont :

- 31 ind. en migration active le 02/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 65 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 99 ind. le 12/05/05 à Oradour-Saint-Genest observées entre 12h50 et 13h35 (87-LabG).

Période estivale : on recense 9 nidifications certaines dans la région Limousin, ce qui est évidemment peu pour un oiseau qui semble bien présent chez nous en tant que reproducteur, mais certes difficile à observer à cause de sa ressemblance avec la buse, de sa discrétion et de la situation de ses aires, bien dissimulées dans les feuillages.

Les premières parades sont notées le 01/05/05 à Vars-sur-Roseix (19-CreD). Une construction de nid est signalée le 16/05/05 à Blaudeix et des jeunes envolés le 23/08/05 sur ce même site (23-NorT). Deux poussins au nid le 24/07/06 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT). Un jeune tout juste envolé le 23/07/06 à Aubazine (19-MarP). Un adulte avec un jeune sont observés le 24/07/06 à Ambazac (87-LanJ).

Milan noir (*Milvus migrans*)

● La migration en quelques dates...

Migration postnuptiale :

- 1 ind. le 18/08/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 05/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 3 ind. le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 18/08/05 à Guéret (23-RobS),
- 1 ind. le 16/10/05 à Albussac (19-CelJ),
- 2 ind. le 09/11/05 à Tulle (19-SouP),
- 1 ind. le 02/07/06 à Limoges (87-VirA),
- 1 ind. le 02/08/06 à Aubazine (19-MarP).

Migration prénuptiale :

- 4 ind. le 19/03/05 à La Roche-l'Abeille (87-DumA),
- 1 ind. le 17/04/06 à Coussac-Bonneval (87-CelJ),
- 5 ind. le 04/03/06 à Lagarde-Enval (19-FarF),

- 1 ind. le 12/03/06 à Flavignac (87-PreP),
- 6 ind. le 12/03/06 à Neuvic (19-BouH).

Deux observations hivernales : 1 ind. le 01/01/05 à Glandon (87-CelJ) et 1 le 20/02/06 à Aubazine (19-MarP).

Le milan noir est noté nicheur certain sur 28 communes de la région. 13 fois en Haute-Vienne, 12 fois en Corrèze et seulement 3 fois en Creuse où il faut accentuer la recherche de nidification.

Pour résumer, quelques dates clés...

Parades nuptiales :

- le 11/03/06 à Aubazine (19-MarP),
- le 16/03/06 à Neuvic (19-SegC),
- le 19/04/06 à Servière-le-Château (19-CavP, NorT et SchO).

Dortoir :

- le 07/05/05, avec 8 ind. à Marcillac-la-Croisille (19-NorT et PlaD).

Transport de matériaux :

- le 28/03/05 à l'étang de Landes (23-VirA).

Construction de nids :

- le 19/04/06 à Saint-Martin-la-Méanne (19-CavP).

Couvaison :

- le 09/04/05 à Flavignac (87-PreP) ou le 09/05/05 à Lapleau (19-NorT).

Nids avec œufs :

- le 20/04/06 à Marcillac-la-Croisille (19-CavP et SchO) et à Saint-Merd-de-Lapleau (19-NorT).

Nids avec poussins :

- le 24/05/05 : 2 poussins à Saint-Martin-Terressus (87-DesJe).

Jeunes sur site de reproduction :

- le 06/08/06 : 3 jeunes à Saint-Léger-de-Magnazeix (87-MouG).




Milan noir, Chaillac-sur-Vienne (87), juin 2006 (Raphaël Bussière)

Milan royal (*Milvus milvus*)

● Durant cette période, 2 609 milans royaux nicheurs, erratiques ou migrateurs ont été vus et notés en Limousin (ce qui est plus que la buse !). 91 observateurs ont transmis leurs données. Cet élégant oiseau, facilement identifiable, ne laisse pas indifférent !

Le diagramme suivant montre bien, par le nombre d'observations notées, les comportements migratoires bien marqués en octobre lors de la migration postnuptiale et, en février ou mars, pour la migration pré-nuptiale.



On comptera jusqu'à 50 individus en vol le 24/02/2005 à Voutezac (19-FacP) ou 38 le 16/10/05 à Albussac (19-ChaJ).

L'espèce est présente en hiver et se regroupe parfois en dortoir comme le 22/01/06 où une centaine d'individus sont notés à Sarroux (19-MoIV) ou encore 13 oiseaux le 01/02/06 à Bort-Les-Orgues (19-BouH).

Des parades nuptiales sont observées le 30/03/05 à Neuvic (19-BarJ), le 24/04/06 à Bort-les-Orgues (19-CavP), le 27/04/06 à Sainte-Marie-Lapanouze (19-CavP) et à Sérandon (19-CavP et NorT).

La nidification de l'espèce est prouvée le 16/05/05 à Saint-Laurent-les-Eglises avec un nid et deux poussins (87-MerC), le 11/06/05 à Bort-Les-Orgues et à Roche-le-Peyroux (19-NorT) et le 04/06/05 à Aubazine (19-MarP).

Vautour fauve (*Gyps fulvus*)

● 1 individu est observé en vol les 17 et 24/10/04 à Moissannes (87-BarJ). Un autre oiseau (ou le même ?...) se laisse admirer pendant près d'une heure, posé sur un poteau EDF, le 25/10/04 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ). Un oiseau est posé sur un feuillu le 01/05/2006 à Lagraulière (19-ChaJ).

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)

- 2 données en migration postnuptiale :
 - 3 ind. le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
 - 1 ind. le 11/09/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Les observations printanières et estivales ne concernent pas vraiment des oiseaux en migration mais des circaètes qui pourraient bien être sur leurs lieux de reproduction, sans certitude évidemment...

- 2 ind. le 23/04/05 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT et PlanD),
- 1 ind. le 07/05/05 à Gentioux-Pigerolles (23-NauD),
- 1 ind. le 20/05/05 à Meymac (19-BarJ),
- 1 ind. le 30/06/05 à Blond (87-BouH),
- 1 ind. le 15/03/06 à Saint-Merd-les-Oussines (19-VirA),
- 1 ind. le 26/03/06 à Sérandon (19-BouC),
- 1 ind. le 01/04/06 au Chastang (19-MarP),
- 2 ind. le 08/04/06 à La Croix-sur-Gartempe (87-CavP),
- 2 ind. le 18/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-NorT, SchO et CavP),
- 3 ind. le 19/04/06 à Servièrre-le-Château (19-NorT, CavP et SchO),
- 2 ind. le 11/05/06 à Royère-de-Vassivière (23-MorS).


Les nidifications certaines sont rapportées :

- le 06/09/04 à Laval-sur-Luzège où un oiseau survole son nid détruit (19-NorT),
- le 28/04/06 à Soursac avec l'observation d'un adulte au nid (19-CavP et NorT),
- le 13/07/06 : nid avec un jeune à Marcillac-la-Croisille (19-CavP, NorT et SchO).

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)

- Les premières et dernières observations concernant les migrations post et pré-nuptiales sont :

- 2 ind. le 19/03/05 à La Roche-l'Abeille (87-DumA),
- 1 ind. le 09/05/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- 1 ind. le 15/08/05 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 25/10/05 à Flavignac (87-Pral).



On peut noter deux observations hivernales :

- 1 ind. le 17/11/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK),
- 3 ind. le 24/12/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR).

La nidification n'est pas prouvée pour cette espèce. Cependant, des observations en période favorable sont signalées, notamment à l'étang de Landes où l'espèce sera notée 22 fois toutes saisons confondues :

- le 02/04/06 : une femelle (23-PalG),
- le 11/05/06 (23-LabA),
- le 25/06/06 (23-BusR),
- le 04/04/06 : un mâle (23-BouH),
- le 06/06/06 à l'étang de Chabannes (19-BouH).

Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

Les observations de migration postnuptiale débutent fin août :

- 1 ind. le 31/08/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 12/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 24/10/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 1 ind. le 27/10/04 à Lussat (23-VirA),
- 1 ind. le 08/09/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ),
- 1 ind. le 14/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En période hivernale, l'espèce est présente avec des citations relevées dans les trois départements :

- 1 ind. le 26/12/04 à Azat-le-Ris (87-SotJ),
- 1 ind. le 01/01/05 à Peyrilhac (87-MorS),
- 1 ind. le 08/01/05 à Tarnac (19-BarJ),
- 1 ind. le 15/02/05 à Azérables (23-MerC),
- 1 ind. le 12/01/06 à Naves (19-ChaJm).

L'espèce se regroupe en dortoirs, plus ou moins importants, sur certaines landes de la région :

4 busards de couleur brune le 20/11/2004 à Bussière Galant (87-PreP)

- 9 ind. le 07/12/04 à Gorre (87-NauD),
- 9 ind. le 15/02/05 à Gorre (87-GorP),
- 9 ind. le 20/11/05 à Gorre (87-NauD),
- 5 ind. le 10/12/05 à Gorre (87-ChoP),
- 3 ind. le 14/01/06 à Château-Chervix (87-MorS),
- 7 dont 6 mâles le 23/02/06 à Cieux (87-VirA),
- 5 ind. le 21/03/06 à Cieux (87-NauD).

Pour le retour printanier, l'espèce est vue en migration active dès la mi-mars :

- 1 mâle le 17/03/05 à Limoges (87-SchO),
- 1 ind. le 08/04/05 à Guéret (23-RobS),
- 2 ind. le 23/03/06 à Rilhac-Rancon (87-LanJ).

La reproduction est prouvée à 3 reprises seulement :

- le 18/08/04 à Chénérailles (23-ZinM),
- le 01/05/06 à Glanges (87-MorS),
- le 11/06/06 à Cieux où des jeunes sont nourris (87-VirA).

Il est noté nicheur probable :

- un couple le 21/04/05 au Puy à Eygurande (19-DouA),
- un couple alarme le 18/05/05 à Saint-Maurice-la-Souterraine (23-LabG et GueK),
- un couple parade le 14/04/06 à Bussière-Bofy (87-LabA).

Busard cendré (*Circus pygargus*)

- Seulement 11 données pour cette période d'observation !

On peut les résumer comme suit :

- 1 ind. en migration active le 28/08/04 à Jouac (87-MerC),
- 1 ind. le 31/08/04 à Flavignac (87-VirA),
- 1 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 10/10/04 à Cieux (87-BouH),
- 1 ind. le 02/05/05 en vol vers le nord-est à Cressat (23-NorT),
- 1 ind. en migration active le 07/05/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP),
- 1 ind. le 20/07/05 à Peyrelevade (19-AurF),
- 1 ind. le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 17/10/05 à l'étang de Chavaignac (87-BouP),
- 1 ind. le 06/04/06 à Neuvic (19-DubY).

Hormis ces deux dernières observations qui peuvent laisser entrevoir une nidification possible, pas de données pour la reproduction de cette espèce qui semble ne pas « pouvoir » se réinstaller dans notre région.

Autour des Palombes (*Accipiter gentilis*)

- Toujours aussi discret, l'autour fournit 71 données, ce qui est tout de même deux fois plus que dans la précédente centrale.

Plusieurs observations de parades nuptiales sont relevées :

- le 13/03/05 à Saint-Sylvestre (87-VirA),
- le 10/04/05 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-VirA),
- le 23/04/05 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT et PlaD),
- le 01/06/05 à Fontanières (23-DubP),
- le 01/06/05 à l'étang de Fayolle (23-DubP),
- le 16/03/06 à Neuvic (19-GfeE),
- le 11/04/06 à l'étang de Gouillet (87-GueK).

Un oiseau est entendu le 25/05/06 à Peyrilhac (87-BouP).

Deux preuves de nidifications sont rapportées :

- nid avec 3 poussins le 16/06/05 à Blond et revus volants le 03/08/05 (87-BouH),
- nid découvert le 17/07/05 à Saint-Sylvestre (87-VirA),

mais certaines aires, suivies depuis plusieurs années, sont abandonnées :

- nid inoccupé le 23/04/06 à Eygurande (19-DouA),
- nid inoccupé le 10/05/06 à Maisonnisses (23-NorT).

L'espèce est observée sur des sites favorables à sa reproduction : le 18/04/06 à Allasac, le 19/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne, le 20/04/06 à Saint-Merd-de-Lapleau et le 21/04/06 à Soursac (19-CavP, NorT, JorV et SchO).

Durant l'automne et l'hiver, l'oiseau est également observé :

- le 05/10/05 à Glandon (87-CelJ),
- le 11/02/06 à l'étang de Landes (23-DubP),
- le 04/02/06 à Bussière-Boffy (87-DouA).

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

● En migration postnuptiale, il est noté dès août avec notamment l'observation d'un migrateur le 21/08/05 à Guéret (23-RobS). Sur le site de suivi de migration à Flavignac, il est observé presque tout les mois en migration active comme le 12/09/04, le 06/11/04 ou le 20/08/05 (87-PreP). Il est observé de passage lors d'études migratoires le 07/09/04, le 21/10/04 et le 26/10/04 à Janailat (23-RogJ). Un migrateur est également noté le 12/10/04 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD).

Pour le retour printanier, on signale :

- 1 ind. le 15/03/06 à Neuvic (19-BouH),
- 1 ind. le 09/04/06 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Une parade nuptiale est observée le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).

Quelques preuves de nidification ont été apportées :

- le 01/06/05 à Fontanières et Sannat (23-DubP),
- le 10/08/06 à Beynat et Palazinges (19-MarP),
- le 10/06/06 à Couzeix (87-VirA).

De nombreuses observations de chasse sur différentes espèces sont signalées :

- le 24/10/04 à Châlus sur des pipits farlouses (87-CouC),
- le 07/11/04 à Limoges sur des moineaux domestiques (87-EyrO),
- le 09/11/04 à Limoges sur des étourneaux sansonnets (87-SchO),
- le 31/12/04 à Maisonnais-sur-Tardoire sur une mésange bleue (87-RayA),
- le 01/01/05 à Limoges où un oiseau s'attaque à des tarins des aulnes (87-GauR),
- le 16/01/05 à Limoges sur un verdier (87-VirA),
- le 25/06/05 à Oradour-Saint-Genest, un épervier capture une hirondelle rustique (87-CavP),
- le 19/07/05 à Chaillac-sur-Vienne où un accenteur mouchet est attrapé au sol (87-BusR),
- le 05/01/06 à Limoges où un individu s'en prend aux oiseaux à la mangeoire (87-VirA).

Un cas d'albinisme partiel est noté sur un individu le 25/02/2006 à Marcillac-la-Croisille (19-NorT).

Un épervier est trouvé, tué par un choc avec un véhicule, le 25/02/06 à Magnac-Bourg (87-MorS).

Buse variable (*Buteo buteo*)

● 2 356 observations réparties comme suit : 1 180 en Haute-Vienne, 699 en Corrèze et 477 en Creuse.

Des migrateurs postnuptiaux sont décelés ici et là, surtout en octobre, avec notamment :

- 2 ind. le 26/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 22 ind. le 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ),
- 2 ind. le 18/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 2 ind. le 19/10/05 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 24/10/04 à Ayen (19-FauB),
- 5 ind. le 06/11/04 à Flavignac (87-PreP).

L'hiver, des groupes sont repérés posés dans les champs à la recherche de nourriture :

- 8 ind. le 08/10/05 à Lussat (23-VirA),
- 14 ind. le 01/02/05 à La Geneytouse (87-SchO),
- 11 ind. le 09/01/06 à Saint-Hilaire-Peyroux (19-MarP).

La remontée prénuptiale est signalée en mars :

- 6 ind. le 04/03/06 à Neuville (19-DubY),
- 14 ind. le 10/03/06 à Neuville (19-DubY),
- 1 ind. le 14/03/06 à Limoges (87-VirA).

Les premières parades sont signalées en janvier et février mais se poursuivent jusqu'en été avec souvent des jeux aériens spectaculaires et des réaffirmations de territoire :

- le 13/03/05 à Glandon (87-CelJ),
- le 26/01/06 à Neuville (19-GfeE),
- le 16/03/06 à Aubazine (19-MarP),
- le 26/04/06 Saint-Julien-Près-Bort (19-CavP),
- le 14/05/06 à Blond (87-CavP),
- le 14/06/06 à Darnac (87-LabG),
- le 27/06/06 à Limoges (87-VirA).

Un accouplement est noté à côté du nid le 26/03/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-SchO). La première couvaison est citée le 26/03/05 à Flavignac (87-PreP), et une autre signalée le 16/05/06 à Blaudeix où les jeunes juste envolés seront vus le 10/08/06 (23-NorT). Deux poussins au plumage duveteux sont observés le 21/05/05 à Flavignac (87-PreP). Un jeune est nourri hors du nid le 25/07/05 à Reygade (19-NorT).

La buse n'échappe pas au danger comme le prouvent ces deux observations :

- une trouvée morte le 08/10/05 à l'étang de la Bastide, probablement électrocutée (23-VirA),
- tuée par un choc de véhicule le 10/07/05 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).



Buse variable, Flayat (23), février 2007 (Etienne Dupoux)

Aigle criard (*Aquila clanga*)

● Un individu de 2^{ème} hiver est découvert le 21/12/04 à l'étang de Landes (23-EyrO et VirA) et il sera revu pour la dernière fois le 10/03/05 (23-TheF). L'oiseau passera donc presque trois mois sur le site, se nourrissant principalement de foulques et canards.

Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)

● Un oiseau est signalé le 10/12/04 à Vidaillat (23-BlaS).

Aigle botté (*Aquila pennata*)

● L'espèce est signalée sur 23 communes en Corrèze et sur 2 seulement en Haute-Vienne. Pas de données pour le département de la Creuse.

Les dernières observations postnuptiales sont notées le 10/09/05 à Servière-le-Château (19-NorT) et le 16/09/05 à Hautefage (19-FarF).

La première observation printanière est celle d'un oiseau de phase claire noté le 24/03/06 à Saint-Julien-Près-Bort (19-MarP).

Les premières parades sont remarquées le 11/04/06 à Allasac (19-LabB).

La reproduction est prouvée sur 5 communes, uniquement en Corrèze.

- accouplement le 18/04/06 à Argentat (19-NorT et SchO),

- 2 ind. près du nid le 19/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-NorT, CavP et SchO).

Les premiers poussins sont notés le 16/06/06 à Allasac, avec deux jeunes en duvet à l'aire (19-SchO). Ces poussins sont revus le 10/07/06 (19-SchO et CavP). Un jeune est au nid le 12/07/06 à Argentat (19-NorT, CavP, SchO et PlaD). Une famille est observée en vol le 29/08/05 à Laval-sur-Luzège (19-NorT).

Un aigle intimidé, par des attaques, un milan noir le 30/07/07 à Aubazine (19-MarP).

Hors Corrèze, un oiseau est observé le 04/05/06 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-VirA), un autre le 13/05/06 à Saint-Jean-Ligoure (87-HipS).

PANDIONIDÉS

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

• L'oiseau est visible de fin août à début novembre en migration postnuptiale :

- 1 ind. le 28/08/04 à Saint-Médard-la-Rochette (23-ZinM),
- 1 ind. le 07/09/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA),
- 1 ind. le 12/09/04 à Evaux-Les-Bains (23-DupE),
- 1 ind. le 28/09/04 à Sérandon (19-BarG),
- 1 ind. le 17/10/04 à Beaumont-du-Lac (87-HenE),
- 1 ind. le 01/11/04 à l'étang de Landes (23-CoqM),
- 1 ind. le 28/08/05 à l'étang du Coiroux (19-MarP),
- 1 ind. le 10/09/05 à Servièrre-le-Château (19-NorT),
- 2 ind. le 11/09/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. le 05/11/05 à Flavignac (87-PreP).

Une seule mention en période hivernale : 1 ind. le 08/01/05 à l'étang de Landes (23-DauR).

Le passage printanier est décelé de mi-mars à fin mai :

- 1 ind. le 13/03/05 à Saint-Victorien (87-DouA),
- 1 ind. le 23/03/05 à Limoges (87-SchO),
- 1 ind. le 10/04/05 au Grand Etang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 06/05/05 à Lussat (23-RogJ),
- 1 ind. le 17/03/06 à Neuviç (19-Sepol),
- 1 ind. le 14/04/06 à l'étang de Fromental (87-BouH),
- 1 ind. le 25/05/06 à Saint-Fréjoux (19-VarC).

FALCONIDÉS

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

• En migration postnuptiale, l'espèce est notée essentiellement de fin septembre à fin octobre :

- 1 ind. le 25/09/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 02/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA).

Pour la migration prénuptiale, les dates sont plus aléatoires. Néanmoins, quelques observations de migrants sont rapportées, avec notamment : 1 ind. en migration active le 19/03/05 à la Roche-l'Abeille (87-DumA).

Plusieurs preuves de nidification sont mentionnées ici et là :

- accouplement le 17/03/05 à Azérables (23-MerC),

- couvaion le 22/04/05 à Flavignac. La femelle couve toujours le 13/05/05 (87-PreP),
- 5 poussins le 19/05/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- nid découvert le 11/06/05 à Séréilhac (87-GauR),
- 2 poussins le 11/06/05 à Rilhac-Rancon (87-LanJ),
- jeunes volants le 16/06/05 à Limoges (87-GauR),
- couvaion le 27/06/05 à Leyrat tandis qu'un autre nid contenait 5 jeunes (23-NorT),
- parade le 17/03/06 à Flavignac (87-NauD),
- nid avec des jeunes le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Faucon kobez (*Falco vespertinus*)

- Espèce notée régulièrement dans la région mais en faible quantité !
Un juvénile est observé le 17/08/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Faucon émerillon (*Falco colombarius*)

- Au passage postnuptial, le premier contact est noté le 27/09/04 à Saint-Priest-la-Feuille (23-GueK) et c'est en octobre où la majorité des observations sont recueillies avec notamment :

- 1 ind. le 10/10/04 à Oradour-sur-Glane (87-SotJ),
- 1 ind. le 24/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 12/10/05 à Aubazine (19-MarP),
- 1 ind. le 14/11/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Plusieurs données peuvent correspondre à des oiseaux hivernant en Limousin :

- 1 ind. le 11/12/05 à Glandon (87-CelJ),
- 1 ind. le 08/01/06 à l'étang des Oussines (19-BouH),
- 1 ind. le 19/01/06 à Cussac (87-HubP).

Le passage printanier donne lieu à une seule donnée avec un individu le 02/03/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

- L'espèce est peu observée en migration active. Le premier migrateur postnuptial est observé le 18/08/05 à Guéret (23-RobS) puis un autre le 31/08/04 à Azérables (23-MerC). Le passage est surtout relevé en septembre avec notamment : 1 ind. le 23/09/04 à Limoges (87-SchO) et 1 le 12/09/04 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP). La dernière mention de migrateur automnal est relevée le 22/10/04 à Flavignac (87-PreP).

Le retour printanier s'étale de la dernière décade de mars à mi-avril :

- 2 ind. le 28/03/05 à Aubazine (19-MarP),
- 1 ind. le 16/04/05 à Ambazac (87-LanJ),
- 1 ind. le 14/04/06 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Un groupe de 9 individus est aperçu le 19/04/06 à Monceaux sur Dordogne (19-CavP, NorT et SchO). Quatre d'entre eux avaient des comportements de défense territoriale en houspillant les autres, qui semblaient être de passage. La présence de nid est très probable.

Aucune preuve de nidification certaine n'a été notée, mais :

- couple le 29/05/05 à Flavignac (87-Pral),
- transport de nourriture le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP).

Un oiseau chasse un groupe d'Hirondelles rustiques le 25/06/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

● L'espèce est présente toute l'année en Limousin.

Durant la période hivernale, l'oiseau est vu en chasse à plusieurs fois dans la ville de Limoges, comme cet individu poursuivant un groupe d'étourneaux le 25/10/05 sur la place de la république (87-ArnL), ou le 21/01/2005 autour de la cathédrale (87-ChaG). Il est signalé également en campagne, avec l'observation d'un juvénile en vadrouille 21/12/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), ou le 12/11/04 à l'étang de Landes (23-BarJ).

On peut signaler également une femelle de 1^{ère} année heurtée par un véhicule le 17/03/06 à Condat-sur-Ganaveix (19-NauD) et, qui sera relâchée après son passage au centre de soin de l'association « SOS Faune Sauvage » à Verneuil-sur-Vienne.

En période de reproduction, l'espèce niche en Limousin suivant la répartition présente :

Départements	Haute-Vienne		Corrèze		Creuse	
	2004	2005	2004	2005	2004	2005
Nombre de sites occupés	12	16	13	15	2	-
Reproduction prouvée	7	12	12	11	1	-

Le premier accouplement est noté le 20/02/05 (87-MerC).

La première couvaison est signalée le 13/03/05 (19-BarJ).

Les premiers jeunes au nid sont observés le 22/04/05 (19-NorT).

Des jeunes à l'envol sont repérés le 30/05/06 et le 08/06/06 (19-ReyA).

Un juvénile en vol est vu le 15/07/05 à Noailles (19-GauR).

Un passage de proie est signalé le 27/04/06 à Sérandon (19-CavP). On note une nichée détruite par la prédation d'un Grand Duc le 15/05/06 à Servièr-le-Château (19-ReyA). Un individu se querelle avec deux Grands corbeaux le 21/08/04 à Compreignac (87-SotJ).

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

● Présent toute l'année dans les zones humides du Limousin, le râle d'eau est pourtant une espèce rarement notée (30 citations). Faisant preuve d'une discrétion extrême, et vivant dans une végétation dense il est très difficile de l'apercevoir. Plus des deux tiers des contacts sont seulement auditifs.

Deux étangs, celui de Landes (23) et de Cieux (87), fournissent la plus grande majorité des données.

L'espèce peut être notée en plein cœur de l'hiver :

- 1 ind. le 29/12/04 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 14/01/06 à l'étang de Ganetorte (19-BesM).

Aucun indice de nidification probable ou certain n'est obtenu. Seul des nidifications possibles sont observées : à l'étang de Landes (23-DupE et al.) et à l'étang de Chabannes (19-BouH).

Il est probable que l'espèce passe inaperçue sur de nombreux étangs et zones humides.

Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)

● L'espèce est présente sur de nombreux plans d'eau, son cri la trahit souvent lorsque elle reste cachée au sein de la végétation aquatique.

Durant l'hiver, il est possible d'observer des groupes relativement importants :

- 17 ind. le 07/01/05 à l'étang de L'Age (87-CavP),
- 20 ind. le 15/01/05 à l'étang du Moulin Neuf (19-BerF),
- 7 ind. le 29/01/06 sur les bords de Vienne à Limoges (87-GauR).

Le mois de juin voit naître la majorité des jeunes poules d'eau.

Foulque macroule (*Fulica atra*)

● Il s'agit d'un des oiseaux d'eau les plus fréquents sur les étangs limousins. Cependant, la Corrèze est quasiment désertée, seulement 29 des 507 citations proviennent de ce département, et uniquement hors de la période de reproduction.

Lors du comptage Wetlands de janvier 2005, 659 foulques sont comptabilisés dont près de 240 aux étangs du Bassin de Gouzon et 780 individus sont comptabilisés l'année suivante.

La première reproduction certaine est constatée le 11/04/06 avec la couvaison d'un individu à l'étang de la Toueille (23-TarE). Les premiers poussins sont vus le 21/05/05 à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC).

Grue cendrée (*Grus grus*)

De plus en plus d'observateurs fournissent des informations qui enrichissent la centrale à chaque migration, ce qui montre bien que la grue cendrée est l'oiseau emblématique du Limousin.

• Migration postnuptiale 2004

120 observateurs nous ont fourni des citations pour 180 850 grues observées.

A partir du 07/10/04, les températures fraîchissent en Scandinavie ; les places de stationnement en Europe du Nord et au nord de l'Allemagne sont bien garnies. Le signal du départ de la première vague est donné. Les 44 premières migratrices sont observées le 10/10/04 à Razès (87-CavP).

Le 12/10/04, après les stationnements en Champagne Ardennes, les premiers passages sont repérés dans notre région :

- En Haute-Vienne, 280 grues : à Limoges, 50 grues en 2 vols (87-BouP) et 130 grues (87-SchO) et à Flavignac, 100 grues posées dans un champ de maïs (87-PreP).
- En Creuse, 235 grues : à Tercillat, 230 grues (23-NauP) et à Saint-Maurice-la-Souterraine, 5 grues posées dans un pré (23-RogJ).
- En Corrèze : 70 grues vues à Tulle (19-SouP).

Le 13/10/04, alors que les grues vues la veille commencent à s'installer dans les Landes et que les premières franchissent le col d'Organbidexka, 773 grues sont observées en Limousin :

- En Haute-Vienne, 332 grues : à Ambazac 22 grues (87-LanJ), à Châlus 16 grues (5 trouvées posées et 11 qui se posent) (87-CouC), à Glandon 23 grues (87-CelJ), à Jourgnac 110 grues (87-BouM), à La Porcherie 25 grues (87-MorS), à Peyrat-le-Château 35 grues (87-CreN), à Nexon en fin d'après-midi 101 grues semblant vouloir se poser (87-EyrO).
- En Creuse : 2 vols en milieu de journée de 330 grues à Gentioux-Pigerolles (19-AlbD).
- En Corrèze, 111 grues : 96 à Lignac (19-BarJ) et 15 à Tulle (19-SouP).

Ensuite, du 14/10/04 au 04/11/04, la période est plus calme car les conditions météorologiques ne sont pas favorables : plusieurs dépressions se succèdent au niveau de l'Angleterre et les vents sont contraires au sens de la migration. Des journées calmes se succèdent avec des journées comprenant un pic de migration. Le 14/10/04, une grue adulte est posée aux Vaseix à Verneuil-sur-Vienne (87-TeuJ).

Le 23/10/04, 5 776 grues sont observées dont : 260 en Creuse, 5 516 en Haute-Vienne.

Le 24/10/04, 34 grues se posent dans un champ de maïs venant d'être récolté à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Le 26/10/04, nous assistons au premier gros passage depuis le début de la migration : 11 788 grues. Il s'agit des grues qui stationnaient au lac du Der les jours précédents, et celles-ci sont remplacées par des grues venant du nord de l'Allemagne :

- En Creuse : à Gentioux-Pigerolles 4 vols totalisant 1 000 grues (23-AlbD), à Janaillat un vol de 65 grues (23-RogJ), à Saint-Médard-la-Rochette 9 720 grues (23-Sepol) et 980 grues (23-ZinM).
- En Haute-Vienne : à Limoges 23 grues (87-VirA).

Le 28/10/04, 1 617 grues sont observées dont : 352 en Creuse et 1 265 en Haute-Vienne.

Du 05/10/04 au 13/11/04, nous assistons à la deuxième vague.

En effet, le 05/11/04, grâce à un anticyclone centré sur l'Atlantique, le beau temps revient et les vents sont favorables dans le couloir. Des milliers de grues quittent le Lac Du Der. Nous assistons au plus grand pic de la migration postnuptiale 2004 où 109 137 grues sont observées sur le Limousin :

- Le plus gros passage a lieu en Haute-Vienne avec 103 607 grues vues par 21 observateurs et se décompose comme suit : à Ambazac 333 grues (87-LanJ), à Boisseuil 576 grues (87-DouS), à Chaillac-sur-Vienne 750 grues en 3 vols (87-BusR), à Cieux 200 grues (MeiR), à Compreignac 2 000 grues (87-HubP), à Folles 10 000 grues (87-MarB), à Limoges 2 746 grues (87-DouS) + 200 grues (87-GauR) + 80 grues (87-MauM), à Maisonnais-sur-Tardoire 13 953 grues dont 3 posées à côté des maisons (87-RayA), à Nieul 3 000 grues (87-RouA), à Oradour-sur-Glane 6 319 grues (87-NauD), à Rilhac-Rancon 150 grues (87-DouS), à Saint-Priest-sous-Aixe 5 000 grues (87-BarP) + 30 000 grues (87-LabP), à Saint-Victorien 500 grues (87-LoiV), à Saint-Yrieix-la-Perche 800 grues (87-CelJ), à Saint-Yrieix-sous-Aixe 27 000 grues (87-LabP).

- En Creuse, 5 030 grues : à Jarnages 3 400 grues (23-Car), à Le Grand-Bourg 200 grues (23-JolT), à Sainte-Feyre 400 grues (23-ReyG), à Saint-Pierre-Bellevue 200 grues (23-Cha), à Saint-Pierre-Chérignac 500 grues (23-BruM), à Saint-Sulpice-le-Dunois 330 grues (23-CarP) et des milliers de grues survolant Guéret en fin de soirée (23-Lop).

- En Corrèze, 500 grues : à Beyssenac (19-CelJ).

Le 06/11/04, la migration continue après une nuit riche en passages mais pendant laquelle les grues n'ont pas pu être comptabilisées. Cependant, 4 350 grues ont tout de même été observées en Limousin avec un maximum en Corrèze à Vars-sur-Roseix 580 grues (19-CreD), à Voutezac 3 500 (FacP).

La journée du 07/11/04 est plus calme alors que des milliers de grues sont signalées rentrer en France, ce qui augure de gros passages les jours suivants : 450 grues à Fransèches (23-BeaC).

Le 08/11/04, 6 397 grues sont observées en Limousin, avec une bonne répartition entre les trois départements :

- 2 561 en Corrèze dont 650 grues posées au Lonzac (19-RenD) et (19-JonR),

- 1 657 en Creuse,

- 2 179 en Haute-Vienne avec plusieurs vols signalés à Saint-Yrieix-la-Perche dont beaucoup de cris de juvéniles (87-CelJ).

Le 09/11/04, le beau temps incite les grues à quitter le lac du Der, ce qui se traduit par le 2^{ème} plus gros passage pour cette migration ; 18 788 grues sont observées dans le Limousin :

- On assiste à un gros passage en Creuse avec 17 095 grues : 2 240 posées à l'étang de Landes (23-Car) et 750 observées à Bonnat (23-BarP), 15 à Fransèches (23-BauC), 980 à Gouzou (23-Car) + 1 000 à Guéret (23-BarF), 1 410 à Ladapeyre (23-Car), 10 700 à Lepaud (23-Car).

- En Haute-Vienne, 1 056 grues : à Blanzac 160 grues (87-SegB), à Châlus 130 grues (87-CouC), à Flavignac 125 grues posées dans un pré (87-Mic), à Saint-Yrieix-la-Perche une grue retrouvée morte par prédation (87-CelJ), à Peyrilhac 50 grues posées dans un chaume (87-MeiR).

- En Corrèze, 637 grues : à Lissac-sur-Couze 350 grues (19-GraS) et à Meymac un vol de 130 grues (19-AlbD).

Le 11/11/04, 2 331 grues sont observées en Limousin ; la migration commence à se ralentir : à Cussac une grue blessée est soignée (87-CouC), puis acheminée au centre de soins de la Loutre et 4 grues sont posées dans un pré à Saint-Laurent-les-Eglises (87-LanJ).

Le 13/11/04, 4 330 grues sont observées en Limousin dont 2 983 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Le 31/11/04, 80 grues sont posées à Azat-le-Ris (87-CavP).

Malgré quelques petits passages, la période devient calme. Les 27/12/04 et 28/12/04 peuvent être considérés comme les deux dernières journées de migration postnuptiale 2004.

Le 28/12/04, 980 grues sont observées en Limousin dont 600 en Creuse à Fransèches (23-BeaC) et 380 en Haute-Vienne : à Aix-sur-Vienne 1 vol de 140 grues (87-PreP), à Limoges 100 grues (87-VirJ), à Oradour-sur-Glane 100 grues (87-RouA) et à Verneuil-sur-Vienne 40 grues (87-LabP).

Le 29/12/04, 23 grues posées à l'étang Tête de Bœuf en Creuse (23-MerC).

Ensuite, les grues aperçues sont certainement des oiseaux se déplaçant entre les différentes zones d'hivernage en fonction des conditions météorologiques.

• Migration prénuptiale 2005

64 observateurs nous ont fourni 180 citations pour 71 255 grues observées.

En ce mois de janvier 2005, quelques vols sont aperçus, ce qui indique les prémices de la future migration : le 08/01/05, 13 grues observées à Lussat en Creuse (23-DauR), le 26/01/05 50 grues à Limoges (87-GauR).

La première quinzaine de février est marquée par des vols en provenance de l'Aquitaine : le 06/02/05, 342 grues sont observées à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

La première grosse vague de migration commence le 21/02/05. Pourtant, il fait froid : les températures sont inférieures à 5°C sur une bonne partie du trajet migratoire et approchent les 0°C vers le nord. 14 120 grues sont observées sur le limousin :

- En Haute-Vienne, 12 620 grues avec un gros passage sur Limoges : 1 250 (87-AvoN), 200 (87-BolJ), 1 200 (87-ChaG), 450 (87-HubP), 700 (87-LebA), 875 (87-MarQ), 500 (87-MorS), 1 000 (87-PouG), 120 (87-SotJ), 100 (87-VirJ).

- En Creuse, 1 400 grues : à Châtelus-le-Marcheix 700 grues (23-EyrO), à Crozant 250 grues (23-BarP), à Saint-Maurice-la-Souterraine 450 grues (23-CelJ).

Le 23/02/05, 25 000 grues quittent l'Embalse de la Sotonera en Espagne, ce qui se traduit par 2 645 grues observées en Limousin le 24/02/05, essentiellement en Haute-Vienne : à Ambazac 100 grues (87-LanJ), à Magnac-Laval 857 grues en 4 vols (87-DouS), à Peyrat-de-Bellac 950 grues (87-LapM), à Saint-Junien 38 grues (87-DouA), à Saint-Pardoux 100 grues (87-ButL), à Verneuil-sur-Vienne 250 grues (87-HagM) et 350 grues à Crozant en Creuse (23-BarP).

Puis, la grosse vague de migration se confirme avec : le 26/02/05, 947 grues en Haute-Vienne et le 27/02/05, 1 543 grues en Limousin dont :

- En Haute-Vienne, 993 grues : à Châlus 95 grues (87-CouC), à Cognac-la-Forêt 200 grues (87-BouP), à Flavignac 1 vol de 137 grues (87-PreP), plusieurs vols sur la ville de Limoges, à Saint-Junien 100 grues (87-MouL), à Saint-Just-le-Martel 400 grues (87-DouS), à Saint-Yrieix-la-Perche 28 grues (87-CelJ) et à Sauviat-sur-Vige 32 grues (87-BarJ).

- En Corrèze : à Ussel 200 grues (19-VarC).

- En Creuse : à Châtelus-le-Marcheix 350 grues (23-LanJ).

Le 01/03/05, 15 000 grues quittent l'Embalse de la Sotonera en Espagne le matin. Environ 7h plus tard, elles volent au-dessus de notre région, ce qui se traduit par 10 215 grues observées sur le Limousin :

- Gros passage sur la Haute-Vienne avec 9 515 grues : à Aix-sur-Vienne 1 vol de 120 grues (87-PreP), à Ladignac-le-Long 9 000 grues (87-CelJ), à Pensol 65 grues (87-CouC), à Peyrat-de-Bellac 80 grues (87-BouM), à Saint-Brice-sur-Vienne 250 grues (87-DouA).

- En Creuse : à Auriat 400 grues (23-Cha), à Sainte-Feyre 200 grues (23-ReyG).
- En Corrèze : à Ayen 100 grues (19-LafM), à Cosnac un vol (19-ReyA).

Le 02/03/05, le flux reste soutenu avec 23 320 grues observées sur notre région. Encore une fois, c'est la Haute-Vienne qui a le record des observations avec 20 000 grues observées à Limoges (87-MerC).

Du 03/03/05 au 07/03/05, malgré quelques vols aperçus, la migration est à l'arrêt suite à des conditions météorologiques défavorables (vents nord-est et chutes de neige).

Le 08/03/05, les températures redeviennent positives et la migration reprend : 720 grues sont observées sur le Limousin, essentiellement en Haute-Vienne.

Le 09/03/05, des vols continuent à passer sur le Limousin : 1 870 grues observées en Haute-Vienne avec à Flavignac 1 500 grues en 2 vols (87-PreP), à Oradour-Saint-Genest 270 grues posées dans un pré (87-CavP) et à Peyrilhac 100 grues (87-BouP).

Le 10/03/05 constitue le dernier pic de migration pour ce printemps. Alors qu'un nombre important de grues quitte le territoire national en direction de l'Allemagne, un grand nombre de grues stationnées en Aquitaine traversent notre région. C'est ainsi qu'environ 13 000 grues sont observées sur notre région :

- En Haute-Vienne, 12 391 grues : à Châlus 2022 grues (87-CouC), à Cieux 600 grues (87-MerC) + 28 grues (87-RogJ), à Flavignac 11 grues (87-LabB), à Mortemart 30 grues (87-BouM), à Oradour-Saint-Genest 9 500 grues (87-CavP), à Saint-Gence 200 grues (87-PraF).

- En Creuse : à Crozant 486 grues (23-BarP), à Lussat 23 grues posées à l'étang de Landes (23-DesF).

- En Corrèze : 100 grues à Benayes (19-SheJ).

Le 12/03/05, 10 grues posées à Saint-Julien-les-Combes dans un champ (87-VirA).

Le 13/03/05, 746 grues traversent encore notre région, puis les passages diminuent.

Le 14/03/05, 4 grues sont posées à l'étang de Lavaud (87-SotJ).

Les derniers oiseaux observés sont signalés dans la région le 21/05/05 de Peyrat-de-Bellac (87-LapM).

• Migration postnuptiale 2005

92 observateurs nous ont fourni 473 citations pour 14 9216 grues observées.

En ce mois de septembre 2005, les premiers vols sont aperçus dans notre région le 16/09/05 : 40 grues en Corrèze à Donzenac (19-LafJ) et 500 grues en Creuse à Budelière (23-AurF).

Le début du mois d'octobre est marqué par quelques passages suite à une période de très beau temps sur la France, ce qui a favorisé l'arrivée d'un nombre important de grues au Lac du Der.

Le 15/10/05, 20 grues se posent à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Suite au froid qui s'installe au nord de l'Europe, à partir du 16/10/05 nous assistons à la première grosse vague de migration.

Le 16/10/05, 1 934 grues sont observées sur le Limousin :

- En Haute-Vienne, 1 161 grues : à Cieux 262 grues (87-RogJ), à Flavignac 462 grues (87-PreP) + 47 grues (87-Pral), à Saint-Germain-les-Belles 250 grues (87-MorS), à Condat-sur-Vienne 60 grues (87-MulP).

- En Creuse, 648 grues : à Gioux 550 grues en 9 vols (23-AlbD), à Banize 75 grues (23-LebC) et à Guéret 23 grues (23-RobS).

- En Corrèze, 125 grues : à Albussac 50 grues (19-ChaJ) + 75 grues (19-MarP).

Le 17/10/05 constitue le pic de la migration postnuptiale 2005. En effet, 47 000 grues sont comptabilisées traversant la Nièvre, tandis que 74 110 grues sont observées en Limousin, ce qui revient à estimer que le nombre de grues ayant traversé notre région est de l'ordre de plus de 20 000 :

D'abord en Creuse, 20 000 grues arrivent par l'est et sont observées à la Mazière-aux-Bons-Hommes (23-DesN), à Auriat 5 000 grues (23-Cha), à Guéret 1 380 grues et un vol (23-RobS), à Saint-Pierre-de-Fursac 1 000 grues (23-DouA) et à La Souterraine 1 750 grues (23-GueK).

C'est en Haute-Vienne que le nombre de grues observées est le plus élevé, avec des vols importants sur la ville de Limoges : 5 000 grues (87-DouS), 750 grues en 2 vols (87-ArnL), 240 grues en 4 vols, 2 vols de 572 grues + 733 grues (87-DelC), 350 grues (87-GauR), 1 vol (87-DumA) et d'autres grues (87-SchO).

Le 18/10/05, la vague continue avec moins de passages, toutefois 4 987 grues sont encore observées en Limousin.

Le 19/10/05, la décroissance continue avec 1 588 grues citées en Limousin.

Ensuite, du 20/10/05 au 12/11/05, la période est plus calme mais des vols sont régulièrement aperçus en Limousin :

Le 21/10/05, 800 grues posées à l'étang de Lavaud (87-Sepol).

Le 27/10/05, 30 grues en Corrèze à Aubazine (19-MarP).

Le 31/10/05, toujours à Videix, 200 grues + 60 grues posées (87-BoiM), 2 grues posées à Laurière (87-VinS), à Folles 312 grues (87-VinS).

Le 13/10/05, on assiste à une reprise importante de la migration qui peut s'expliquer par une situation météorologique avec des vents favorables (direction nord-ouest) : 15 890 grues sont observées en Haute-Vienne avec un passage important sur la commune d'Oradour-Saint-Genest où 14 000 grues sont comptabilisées (87-CavP).

Du 16/11/05 au 22/11/05, on assiste à la dernière vague avec un passage important le 22/11/05 puisque 30 636 grues survolent les 3 départements du Limousin. Il s'agit en grande partie de grues venant d'Allemagne poussées par une vague de froid s'installant sur le nord-est :

- En Corrèze : à Meymac 130 grues en 3 vols puis 610 grues (en 5 vol) en haute altitude (19-AlbD), à Saint-Bonnet-L'Enfantier 800 grues en 9 vols (19-CorA).

- En Creuse : à Ahun 2 650 grues (23-RobS), à Evaux-les-Bains 800 grues (23-DubP).

- En Haute-Vienne : 24 914 grues dont un gros passage à Meuzac avec 10 583 grues (87-VirA), à Flavignac 3 025 grues (87-PreP) + 4 200 grues (87-VarJ), à Limoges 1 000 grues (87-GauR) + 3 501 grues (87-PouG), à Saint-Germain-les-Belles 1 000 grues (87-MorS).

La première quinzaine de décembre 2005 est marquée par des passages de grues venant du Lac du Der en direction des Landes avec un passage important le 11/12/05 : 2 439 grues sont observées en Haute-Vienne dont 987 à Bessines-sur-Gartempe (87-LanJ).

Ensuite, le froid s'installe sur l'Europe et les dernières grues en migration sont observées le 23/01/06 avec 30 grues en Creuse à Crozant (23-BarP) et 27 grues en Haute-Vienne à Verneuil sur Vienne (87-GalC).

• Migration prénuptiale 2006

58 observateurs nous ont fourni 208 citations pour 53 705 grues observées.

Les premiers vols indiquant le signal de la migration sont observés le 12/02/06 : 425 grues en Haute-Vienne, à Maisonnais-sur-Tardoire 250 grues (87-RayA), à Séreilhac 175 grues (87-ChoP) et à Verneuil-sur-Vienne 1 vol (87-GauR).

Jusqu'au 23/02/06, les vols réguliers commencent à passer au-dessus du Limousin.

Le 18/02/06, 1 317 grues sont observées en Haute-Vienne : à Cieux 750 grues en 6 vols (87-BouH), à Flavignac 80 grues (87-Pral) + 410 grues (87-PreP), à Ambazac 55 grues (87-LanJ), à Isle 22 grues (87-GerA), à Verneuil-sur-Vienne 1 vol (87-GauR).

Le 24/02/06, on observe un gros pic en fin d'après-midi à Oradour-Saint-Genest où 22 274 grues sont comptabilisées (87-CavP) ; 20 grues sont posées à l'étang d'Aigueperse (87-OllJ).

Le 28/02/06, 50 000 grues sont rassemblées sur l'Embalse de la Sotonera en attendant des conditions météorologiques favorables pour partir.

A partir du 02/03/06, suite à des dépressions sur l'Atlantique, des vents favorables donnent le signal de départ. Ce jour-là, 6 226 grues sont observées en Limousin dont 5 514 sur la Haute-Vienne. 2 grues sont retrouvées électrocutées à Saint-Robert (19-GauR).

Le 03/03/06, nous assistons à un gros passage puisque 10 332 grues sont observées sur notre région :

- En Haute-Vienne, 9 632 grues : à Limoges 4 vols de 650 grues (87-DumA), 35 grues (87-HubP), 1 000 grues (87-JofP), 4 475 grues (87-VirA), à Bussière-Poitevine 856 grues (87-CavP), à Ambazac 3 vols (87-LanJ), à Oradour-sur-Glane 1 070 grues (87-NauM), à Saint-Germain-les-Belles 190 grues (87-MoS) et une grue de posée à Saint-Germain-les-Belles (87-GabP).

- En Corrèze : à Lagraulière 650 grues (19-ChaJ).

Le 04/03/06, 47 grues posées à l'Etang de L'Age (87-CavP) et 356 grues posées suite à des conditions météorologiques difficiles (87-CavP).

Du 09/03/06 au 11/03/06, toujours quelques vols et surtout en Corrèze :

- le 09/03/06, 200 grues à Malemort-sur-Corrèze (19-CoqM),
- le 10/03/06, 140 grues survolent Bugeat (19-GamM) et 114 grues à Neuvic (19-DubY),
- le 11/03/06, 79 grues observées à Aubazine (19-MarP) et 25 grues à Voutezac (19-FacP),
- le 13/03/06, 9 grues posées à l'étang de Landes (23-DesN).

Les 14/03/06 et 15/03/06, deux passages importants encore en Haute-Vienne :


- le 14/03/06, 1 515 grues observées en Haute-Vienne dont 970 à Compreignac (87-LanJ) et en Creuse 1 050 grues comptabilisées à la Souterraine-en-Creuse (23-GueK) et (23-VinE),

- le 15/03/06, 1 625 grues observées sur la Haute-Vienne avec à Flavignac 705 grues en 8 vols (87-LabB) et à Oradour-Saint-Genest 400 grues (87-CavP).


Le 17/03/06, 70 grues posées à l'étang des Planchettes (87-LabA).

Jusqu'au 21/03/06, les vols vont en diminuant. La dernière grue observée pour cette migration est une grue posée le 03/04/06 aux Grands-Chézeaux (87-GauR).


Grâce à vos observations, on peut estimer la population des grues cendrées sur le couloir ouest à 228 000 individus environ. Merci à tous les observateurs ayant participé.




Répartition des citations de Grue cendrée lors de la migration postnuptiale 2004 en Limousin



Répartition des citations de Grue cendrée lors de la migration postnuptiale 2005 en Limousin



Répartition des citations de Grue cendrée lors de la migration pré-nuptiale 2005 en Limousin



Répartition des citations de Grue cendrée lors de la migration pré-nuptiale 2006 en Limousin

RÉCURVIROSTRIDÉS

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*)

- Deux observations lors de la migration prénuptiale :
 - 1 ind. le 09/04/06 à l'étang Baudy (87-CelJ),
 - 3 ind. le 14/04/06 à l'étang de Landes (23-PalG).
- Et une observation de juvéniles en migration postnuptiale :
 - 3 ind. le 13/06/05 à l'étang de Manteix (87-GauR).

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)

- Les observations se font majoritairement sur plusieurs étangs de Haute-Vienne lors de la migration postnuptiale, et concernent de plus ou moins petits groupes, hormis une observation au mois de mai.
 - 15 ind. le 06/11/04 à l'étang de Cieux (87-BouH),
 - 15 ind. le 07/11/04 à l'étang des Planchettes (87-CavP),
 - 1 mâle le 01/12/04 au Grand Etang d'Azat-le-Ris (87-EyrO),
 - 1 ind. le 15/11/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA),
 - 6 ind. le 18/12/05 au lac de Saint-Pardoux (87-VirA).

Un groupe de 4 individus, sans doute des migrateurs prénuptiaux, est observé le 14/05/06 au lac de Bort-les-Orgues (19-Del).

BURHINIDÉS

Edicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)

- Un individu est encore en position de couveur le 20/08/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC), où un juvénile est ensuite observé le 26/08/04 (87-EyrO). Il s'agit sûrement d'une ponte de remplacement. Aucun rassemblement postnuptial n'est rapporté. Le dernier individu est entendu le 30/08/05 à Lussat (23-DupE). Le site de Bessines-sur-Gartempe est réoccupé à partir du 16/04/05 où deux poussins sont observés le 21/05/05 (87-MerC). Des juvéniles sont notés le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Ailleurs, l'espèce s'est probablement reproduite sur les communes d'Evaux-les-Bains (23-DubP), Lussat (23-DubG) et Viersat (23-DubP).

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

● L'espèce est principalement observée en période de nidification lors du cantonnement des couples, et ce jusqu'à l'envol des jeunes. Seulement quatre observations ont été recueillies lors de la migration postnuptiale :

- 2 ind. le 23/08/04 à l'étang du Grand Champ (87-VirA),
- 1 ind. le 28/08/04 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 2 et 8 ind. les 08/09/04 et 11/09/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR).

Lors de la période de nidification, 66 observations ont été répertoriées entre la mi-mars et la fin août. La première observation a lieu le 16/03/06 à Aubazine (19-MarP), et la dernière le 21/08/05, avec l'observation d'un adulte et d'un jeune à Videix (87-RogJ). 7 sites possèdent des preuves de nidification certaine :

- 4 jeunes le 13/05/05 sur un terrain vague à Boisseuil (87-MerC),
- 2 jeunes non volants le 29/05/05 sur l'étang de Maubrant (23-MerC),
- 1 nid garni d'œufs le 11/06/05 sur l'étang des Garennes (87-BouH),
- 2 jeunes non volants le 12/06/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-BurJ),
- 1 couple avec des jeunes le 04/07/06 aux Sablières des Séguines à Saint-Brice-sur-Vienne (87-LabB),
- 1 jeune le 10/07/05 à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC),
- 1 adulte avec 1 jeune non volant le 21/08/05 à l'étang de Lavaud (87-RogJ).

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)

● Les données concernent uniquement des observations de migrateurs post et pré-nuptiaux :

Migration pré-nuptiale :

- 2 ind. le 01/04/05 au Grand Etang (87-SotJ),
- 1 ind. le 09/05/05 au Grand Etang (87-CavP),
- 1 ind. le 23/05/05 à l'étang de Landes (23-VirA).

Migration postnuptiale :

- 1 à 8 ind. du 08/09/04 au 17/09/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR et HubP),
- 1 ind. le 04/08/06 au Grand Etang d'Azat-le-Ris (87-CavP).

Pluvié doré (*Pluvialis apricaria*)

● Quatre observations ont lieu en migration postnuptiale, deux en période hivernale et une seule en migration pré-nuptiale. L'espèce reste un migrateur rare en région Limousine.

Migration postnuptiale :

- 1 ind. le 05/11/04 à Flavignac (87-EyrO et PreP),
- 7 ind. le 07/11/04 à Oradour-sur-Vayres (87-EyrO),

- 9 ind. le 17/11/04 à Châlus (87-CouC),
- 5 ind. le 25/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En période hivernale :

- 1 ind. le 01/01/05, puis 9 ind. le 07/01/05 à l'étang de l'Age (87-CavP),
- 1 ind. parmi un groupe de Vanneaux huppés le 18/01/05 à Flavignac (87-HubP).

Migration prénuptiale :

- 6 ind. le 17/03/06 en migration active à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)

- Seulement trois observations en migration postnuptiale lors de ces deux années.

Notons le rapprochement des dates :

- 1 imm. le 02/10/04 à l'étang de Landes (23-VinS),
- 1 ind. le 16/09/05 à l'étang de Lavaud (87-SotJ),
- 1 ind. le 08/10/05 à l'étang de Landes (23-VirA).

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

- 469 données ont été récoltées dont 40 en période de nidification. Les observations montrent un maximum de données en Haute-Vienne (n = 324), suivie de la Creuse (n=102) puis de la Corrèze (n=43).

La première mention de migrateur postnuptial est datée du 14/10/05 avec 1 ind. à Flavignac (87-PreP). Un groupe de 154 ind. est détecté en vol le 20/11/04 au Grand Etang d'Azat-le-Ris (87-CavP).

La première mention d'oiseaux hivernants est de 150 ind. le 01/11/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ). Le plus grand groupe, comptant pas moins de 1000 oiseaux, est signalé le 15/01/06 à Saint-Martial-sur-Isop (87-DouA).

La première observation en migration prénuptiale concerne 2 ind. le 01/01/06 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). Un vol de 650 ind. est aperçu le 13/03/06 à Nexon (87-DumA).

Concernant la reproduction, le premier cantonnement est noté le 01/04/06. 4 sites fournissent des données de nidification certaine :

- 1 femelle avec 1 poussin le 26/04/06 à la Tourbière de Malsagne de Peyrelevade (19-RogJ),
- 1 famille le 15/05/06 à Boussac-Bourg (23-NorT),
- 1 ind. couvant le 18/05/06 à Gajoubert (87-LabB),
- 1 ind. couvant le 30/05/06 à l'étang de la Mazère (87-VirA).

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)

● Deux individus ont été observés :

- 1 en migration prénuptiale le 09/05/05 au lac de Neuvic (19-BarJ),
- 1 en migration postnuptiale le 24/08/05 à l'étang de Landes (23-NorT) puis revu 4 jours plus tard (MerC).

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

● Hivernante du littoral français, l'espèce est vue occasionnellement à l'intérieur des terres, comme ces 3 ind. observés le 08/05/05 sur les rives de la Vienne à Saint-Junien (87-DouA). Remarquons la concomitance de cette observation avec celle d'un Tournepierré à collier et d'un Bécasseau maubèche, indiquant probablement que des conditions météorologiques particulières ont perturbé la migration prénuptiale de ces espèces.

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

● Il a été uniquement observé lors de son retour automnal sur trois sites différents :

- 4 le 08/09/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR) où 3 ind. (les mêmes ?) sont toujours présents le 15/09 (HubP),
- 1 le 02/09/05 à Saint-Léger-Magnazeix (87-MerC),
- 1 le 15/09/05 à l'étang de Landes (23-MerC).

Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)

● L'espèce n'a été observée qu'une fois, en compagnie d'un bécasseau maubèche : 1 ind. le 24/08/05 à l'étang de Landes (23-NorT), revu 4 jours après (MerC).

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

● Ce bécasseau est essentiellement observé à la migration postnuptiale avec des premiers passages d'1 ind. le 21/08/04 à Saint-Merd-les-Oussines (19-MerC) et 4 ind. le 10/09/05 à l'étang de Landes (23-DubG). Les plus tardifs (5 oiseaux) sont vus le 10/10/04 à l'étang de Landes (23-SauJ) et 1 ind. le 25/10/05 à Azat-le-Ris (87-CavP). Le groupe le plus nombreux rassemble 6 ind. le 28/09/05 à l'étang de Landes (23-RobS).

Une seule donnée se rapporte à la migration de printemps avec l'observation d'un oiseau le 30/03/06 au lac de Neuvic (19-Sepol).

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)

● Migrateur régulier mais peu nombreux en Limousin : 11 citations relevées. Les plus précoces redescendent le 24/08/05 : 2 ind. à l'étang de Landes (23-NorT). Un oiseau est noté le 10/10/04 à l'étang de Landes (23-SauJ) et le 25/09/05 toujours à l'étang de Landes (23-HubP).

Pour la migration prénuptiale, seule l'année 2005 voit passer l'espèce : 5 ind. le 26/02/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR), 2 ind. le 26/03/05 à l'étang de Landes (23-VirA) et 9 ind. le 10/04/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Bécassine sourde (*Lymnocyrtus minimus*)

- Six mentions pour cet hivernant très discret :
- 1 tuée à la chasse le 19/09/04 à Gorre (87-ChaS),
 - 1 ind. le 26/10/04 et le 14/12/04 à la tourbière des Dagues (87-GueK),
 - 1 baguée le 07/12/04 à Veyrac (87-TeuJ),
 - 1 le 23/03/05 à Limoges (87-ChaS),
 - 1 le 25/10/05 à Bersac-sur-Rivalier (87-GueK).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

● Elles sont de retour dans notre région à partir d'août : 1 ind. le 28/08/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC) et 5 ind. le 13/08/05 à l'étang de Landes (23-DubG). Des oiseaux passent l'hiver chez nous mais c'est pendant les périodes de migration que les effectifs maximums sont notés : 30 ind. le 04/10/04 à l'étang de Landes (23-DubG), 50 ind. le 28/09/05 sur le même site (23-RobS) et 44 ind. le 01/04/06 à l'étang de Vitrat (23-CreN).

Au printemps, 1 ind. est encore présent le 20/04/05 à Lavaufanche (23-NorT) et le 26/05/06 à Pensol avec des parades (87-GroG).

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)

● Les observations sont rares entre la reproduction et l'hivernage. Signalons la présence d'un individu le 24/09/04 à Aix-sur-Vienne (87-ChaS) et de 2 ind. le 17/08/05 à Limoges (87-VirA).

Les premiers prélèvements par la chasse ont lieu le 01/11/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Sepol) et le 01/11/05 à Gorre (87-ChaS). Au cours de l'hiver, les bécasses se regroupent parfois, avec notamment :

- 7 ind. le 17/12/04 à Saint-Martin-Terressus (87-MerC),
- 10 ind. le 21/01/05 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-MerC),
- 4 ind. le 24/11/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP).

Des parades sont observées le 15/03/05 à Moustier-Ventadour (19-ThoF) et les premiers chanteurs à la croule sont notés seulement le 21/04/05 à Eygurande (19-DouA), comparé au 16/01/06 à Montgibaud (19-CelJ). Un chasseur a trouvé deux œufs de bécasse en 2004 à Aix (19-ThoF), et levé un adulte avec trois jeunes en 2004 à Saint-Etienne-aux-Clos (19-ThoF). Un jeune volant est aussi repéré le 02/06/06 à Meymac (19-DouA).

Migration pré-nuptiale :

- 1 ind. le 02/02/05 à Châlus (87-CouC),
- 1 ind. le 07/02/06 au lac de Neuvic (19-GfeE),
- 1 ind. le 31/03/05 au lac de Neuvic (19-BarJ),
- 2 ind. le 06/04/06 au lac de Neuvic (87-DubY).

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

● Deux citations au passage automnal : 1 ind. le 10/10/04 à l'étang de Landes (23-SauJ) et 1 ind. le 14/08/05 à Saint-Martin-le-Mault (87-VirA).

Un individu est vu en plein hiver le 21/12/04 au lac de Vassivière (23-AudA).

L'arlequin est plus fréquent à la remontée :

- 1 ind. le 19/03/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR),
- 1 ind. le 26/03/05 à l'étang de Landes (23-VinS),
- 1 ind. le 19/04/05 à Lizières (23-MerC),
- 5 ind. le 09/05/05 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 24/06/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

● Les premiers mouvements sont signalés le 08/09/04 à l'étang de Lavaud avec l'observation d'un oiseau (87-BusR), 2 ind. le 17/09/05 à Azat-le-Ris (87-CavP) et 3 ind. le 04/08/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Un oiseau est encore de passage le 24/11/05 à Javerdat (87-RogJ), tandis qu'une mention hivernale est rapportée le 31/01/06 à Saint-Dizier-Leyrenne (23-DesJe).

Au printemps, les gambettes font de nouveau halte au bord de nos étangs le 01/04/05 à Azat-le-Ris (87-SotJ) et 10 ind. le 20/03/06 à Flayat (23-GilB) pour les premiers. Un oiseau est encore vu le 18/05/05 aux Cars (87-PreP) et le 14/04/06 à l'étang de Landes (23-VirA).

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)


● Pour la migration post-nuptiale, les dates extrêmes de passage sont :

- 1 ind. le 13/08/05 à Saint-Loup (23-DubG),
- 1 ind. le 08/10/05 à l'étang de Landes (23-VirA),
- 7 ind. le 20/11/04 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Un oiseau traînait déjà le 12/07/05 à Saint-Loup (23-DubG), sans doute le même que celui revu en août. Deux individus prennent en chasse un Faucon pèlerin, jusqu'à ce que celui-là parte, le 23/08/05 à Azat-le-Ris (87-VirA).

On revoit l'espèce au printemps : 1 ind. le 19/03/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 1 ind. le 14/04/06 à l'étang de Landes (23-PalG) et jusqu'au 16/05/05 avec 1 ind. à Azat-le-Ris (87-CavP). 22 individus sont dénombrés le 26/04/05 à Neuvic (19-BarJ).

La carte ci-dessous récapitule les effectifs cumulés par commune des quatre espèces du genre *Tringa*.



Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

- L'espèce peut être observée toute l'année en Limousin. Signalons les groupes les plus nombreux :
 - 5 ind. le 16/12/05 à Cieux (87-BouH),
 - 5 ind. le 14/08/05 à Azat-le-Ris (87-VirA),
 - 7 ind. le 02/12/04 à Azat-le-Ris (87-CavP) et toujours le même nombre le 15/01/05 (87-MerC),
 - 11 ind. le 14/08/06 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

- Les mouvements postnuptiaux commencent dès juillet : 2 ind. le 20/07/05 au Dorat (87-BouH). Viennent ensuite : 1 ind. le 28/08/05 à l'étang de Landes (23-MerC) et 1 ind. le 02/09/05 à Saint-Léger-Magnazeix (87-MerC). La remontée printanière débute avec l'observation d'un oiseau le 19/04/05 à Seilhac (19-SouPi) et 1 ind. le 08/04/06 à Bonnefond (19-BouH). 2 individus sont détectés le 25/04/05 à Aubazine (19-MarP) et 7 ind. le 09/05/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).


Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)

● L'espèce est observée toute l'année en Limousin avec deux afflux correspondants aux passages migratoires (cf. graphique). Il est difficile de dater les observations des premiers migrateurs postnuptiaux étant donné la présence d'estivants en petit nombre. Notons toutefois 6 ind. le 17/08/04 au Lac du Causse (19-MerC), 7 ind. le 11/09/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR), 4 ind. le 31/07/05 à l'étang de Landes (23-DupE), 7 ind. le 02/09/05 à l'étang de Murat (87-MerC) et 12 ind. le 27/07/06 à l'étang de Landes (23-BurS).

L'hivernage concerne essentiellement la Haute-Vienne (80 % des citations d'octobre à mars), avec notamment 3 ind. le 02/12/04 et 5 ind. le 16/01/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Le passage prénuptial est concentré sur les mois d'avril et mai. Citons 4 ind. le 19/04/05 à Seilhac (19-SouPi), 14 ind. le 08/05/05 à Meymac (ChaG), 12 ind. le 18/05/06 à l'étang de Landes (23-BurS). Un groupe exceptionnel de 43 ind. est noté le 26/04/05 sur les bords de Vienne à Limoges (87-LanJ).

Aucune preuve ni suspicion de reproduction n'a été observée. La plupart des observations comprises dans la période théorique de reproduction de l'espèce ont d'ailleurs lieu en bord d'étang, alors que l'espèce se reproduit typiquement près des cours d'eau. Une observation d'un individu le 15/06/05 au bord de la Tardes à Evaux-Bains (23-DubP) est intéressante mais il ne manifestait pas de comportements territoriaux.



Tournepipier à collier (*Arenaria interpres*)

● Une seule mention limousine pour cet hivernant du littoral : un ind. le 24/04/05 à l'étang de Bournazel (19-ChaJ), probablement égaré lors de sa remontée printanière. (cf. Bécasseau sanderling)

Mouette pygmée (*Larus minutus*)

● Peu d'observations de l'espèce sur cette période comparée à la période 2002-2004. 4 données provenant exclusivement de l'étang de Landes et portant sur des individus isolés. 2 données en période hivernale, 1 donnée de migration postnuptiale et une donnée de migration prénuptiale :

- 1 ind. le 19/10/04 (23-DesF),
- 1 ind. le 29/12/04 (23-DupE),
- 1 ind. le 12/01/06 (23-RobS),
- 1 ind. le 20/04/06 (23-PalG).

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

● Contactée tout au long de l'année. 44 % des données proviennent de la Creuse, 42 % de la Haute-Vienne et 14 % de la Corrèze. Les étangs du Bassin de Gouzon apportent 71 données.

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés dès la fin août avec 1 ind. observé le 29/08/05 sur les Bords de Vienne (87-MerC). Par la suite, quelques rares observations d'individus en migration active sont rapportées :

- 4 ind. le 26/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 16 ind. le 21/11/05 à Aix-sur-Vienne (87-TetA),
- 2 ind. le 25/11/05 à Flavignac (87-PreP).

Des rassemblements importants sont notés à l'étang de Landes durant l'automne :

- 30 ind. le 19/09/04 (23-DubG),
- 47 ind. le 04/10/04 (23-DubG),
- 60 ind. le 22/08/05 (23-DubG),
- 57 ind. le 30/08/05 (23-DupE),
- 50 ind. le 10/09/05 (23-DubG).

Quelques groupes sont également observés en Corrèze ainsi qu'en Haute-Vienne :

- 48 ind. le 31/10/04 au lac du Causse (19-FauB),
- 10 ind. le 05/09/04 sur les Bords de Vienne à Limoges (87-EyrO).

Durant l'hiver, des groupes sont notés dans les trois départements :

- 74 ind. le 20/12/04, à l'étang de la Vierge (23-DupE),
- 13 ind. le 20/12/04 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- 5 ind. le 20/12/04 au lac d'Uzurat (87-GauR),
- 8 ind. le 13/12/05 au lac de Neuvic (19-DubY),
- 8 ind. le 18/12/05 au lac de Bournazel (19-SouP).

Les premiers migrateurs prénuptiaux sont 2 ind. observés le 15/02/06 à Ambazac (87-LanJ). Par la suite seront notés :

- 8 ind. le 18/03/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- 28 ind. le 19/03/05 à l'étang de Lavaud (87-BusR),
- 6 ind. le 28/03/05 à Cieux (87-HubP).

Les groupes les plus importants sont notés durant le printemps. L'étang de Landes accueille un bel effectif à cette saison avec un groupe dépassant les 200 oiseaux, noté le 28/03/05 (23-VirA). Le site peut accueillir jusqu'à 260 ind. comme le 12/04/05 (23-MerC).

Le nombre d'individus présents durant le printemps 2006 à l'étang de Landes est beaucoup plus faible, avec seulement 20 oiseaux observés le 11/04/06 (23-BurS).

Aucune reproduction n'a été observée malgré la présence d'individus adultes sur des sites propices durant toute la saison de reproduction :

- 25 ind. le 28/05/05 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 4 ind. le 18/06/05 au lac de Vassivière (23-RobS),
- 9 ind. le 01/05/06 à l'étang de Landes (23-Pral).

Goéland cendré (*Larus canus*)

● 4 données rapportées en période hivernale :

- 1 imm. le 24/12/04 à l'étang de Landes (23-BarJ et SotJ),
- 5 imm. et 2 ad. le 30/01/05 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 1 ind. le 14/12/05 puis revu le 20/12/05 à Budelière (23-DubP),
- 1 ind. le 11/02/06 au lac de Bort-les-Orgues (19-GfeE).

Goéland brun (*Larus fuscus*)

● Espèce d'apparition rare en Limousin. Deux citations sont apportées :

- 1 ind. le 02/01/06 au lac de Saint-Pardoux (87-HubP),
- 1 ind. le 05/04/06 puis revu le 06/04/06 au lac de Neuvic (19-MorB et *al.*)

Goéland leucophée (*Larus cachinnans*)

● L'essentiel des données proviennent des gorges de la Dordogne et de ses lacs de barrage. Le bassin de Gouzon ainsi que des lacs haut-viennois apportent les données restantes.

Quelques petits rassemblements sont notés en hiver au lac de Neuvic : 4 ind. le 26/11/05 (19-DubY), 5 ind. le 17/01/06 (19-GfeE) et 9 ind. le 22/01/06 (19-BouH). Ce dernier groupe constitue le plus gros rassemblement observé sur la période considérée. En Haute-Vienne et en Creuse, 1 ind. est observé le 04/12/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR) et le 20/12/04 à l'étang de Landes (23-DupE).

La migration prénuptiale est plus marquée par de nombreuses observations dans les gorges de la Dordogne durant la première quinzaine de mars. Entre autres :

- 4 ind. le 01/03/06 à Sérandon (19-BouC),
- 4 ind. le 04/03/06 au lac de Neuvic (19-DubY),
- 2 ind. le 09/03/06 au lac de Neuvic (19-GfeE),
- 3 ind. le 12/03/06 à Ligniac (19-GfeE).


En Haute-Vienne, 1 ind. est observé le 06/04/06 à Limoges (87-MerC).

Durant la période estivale, l'espèce est contactée ponctuellement dans les trois départements sans que la reproduction ne soit constatée :

- 3 ind. le 04/06/06 à Bort-les-Orgues (19-Sepol),
- 4 ind. le 03/07/06 à l'étang de la Pouge (87-ChaG),
- 1 ind. le 04/07/06 à l'étang de Landes (23-ChaG),
- 1 ind. le 15/07/05 à l'étang de Landes (23-VirA).

La migration postnuptiale semble peu marquée dans notre région. L'espèce est observée en migration active en octobre : un oiseau les 17/10/04 et 24/10/04 à Moissanes (87-BarJ).

Aucune reproduction n'a encore été prouvée en Limousin, mais l'espèce se reproduit depuis plusieurs années dans le Cantal et depuis peu dans le Puy-de-dôme. La reproduction de l'espèce dans un futur proche est envisageable.



Goéland marin (*Larus marinus*)

• Une seule et unique citation pour cette espèce d'apparition exceptionnelle en Limousin avec l'observation d'un oiseau le 19/09/04 à l'étang de Landes (23-DubG).

Guifette noire (*Chlidonias niger*)

● L'espèce est observée en halte migratoire sur nos étangs limousins. A l'automne, on la voit à partir de fin août : 2 ind. le 25/08/04 à l'étang de Landes (23-DupE), 20 ind. le 24/08/05 sur le même site (23-NorT) et jusqu'en septembre avec 3 ind. le 14/09/05 à Saint-Martin-le-Mault (87-MerC).

Elles survolent à nouveau notre département dès avril : 1 ind. le 24/04/05 à l'étang de Lavaud (87-RayA) et 4 ind. le 16/04/06 à l'étang de Landes (23-DubG). Les dernières sont vues le 10/06/05 avec 2 ind. à l'étang de Landes (23-MerC) et 1 ind. le 06/06/06 au lac de Neuvic (23-Sepol).

Guifette leucoptère (*Chlidonias leucopterus*)

● Une seule mention : observation d'un juvénile le 15/09/05 à l'étang de Landes (23-MerC).



COLUMBIDÉS

Pigeon biset (*Columba livia*)

● A noter un individu, avec un plumage sauvage typique, posé sur une falaise le 11/04/05 à Donzenac (19-LabB).

Pigeon colombin (*Columba oenas*)

● Migrations postnuptiales :

En 2004, le premier vol de 5 oiseaux est noté le 25/09 à Flavignac (87-PreP).

En 2005, un groupe de 17 migrateurs est aperçu le 08/10 à Saint-Setiers (19-AlbD) et 76 oiseaux comptabilisés le même jour à Flavignac (87-PreP).

Pour les deux années, les oiseaux sont très souvent vus dans les vols de Pigeons ramiers. Des petits groupes mono spécifiques sont aussi observés en début de saison, inférieurs à 20 individus le plus souvent. L'effectif maximum atteint sur une journée est de 62 oiseaux le 21/10/04 à Flavignac (87-PreP) et le 23/10/05 avec 84 individus à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Les derniers sont notés le 04/11/04 à Dournazac (87-CouC), le 06/11/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et le 01/11/04 à Flavignac (87-PreP).

Hivernages :

Aucune donnée.

Migrations prénuptiales :

Très peu de contacts. L'espèce est souvent vue à Flavignac : 1 puis 9 les 12 et 13/03/05, 2 le 12/02/06, 6 le 02/03/06, 2 le 12/03/06 (87-PreP). Un groupe de 45 est noté le 14/03/06 à Neuvic (19-GfeE).

Nidifications :

Des prospections réalisées en avril 2005 et 2006 à l'Est de la Corrèze par Annick et Christian Doucelin (secteurs d'Eygurande, de Lamazière-Haute, de Laroche-près-Feyt, de Moustier-Merlines) ont permis de trouver une dizaine de sites occupés. Le 19/04/05, deux groupes de 10 et 30 oiseaux sont observés au sol à Eygurande (19-DouA). En 2004, 18 sites de nidification sont répertoriés. Parmi eux, un seul est en Creuse : à Fontanières (23-DubP) et aucun en Haute-Vienne. Le site connu de Moissannes (87) n'a pas dû être prospecté. Hormis l'extrême Est corrézien, citons également la présence de l'espèce à Peyrelevade (19-SegC) et à Saint-Merd-les-Oussines (19-BouH).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*)

● Migration postnuptiale 2004 :

Les premiers migrateurs sont observés le 02/10 à Flavignac (87-PreP). Le 10/10, 70 vols comptabilisant 4 110 pigeons passent à Saint-Setiers (19-AlbD). Dans la deuxième décade d'octobre, le flux semble plus intense sur le nord du plateau de Millevaches que dans le couloir central, centré sur Limoges. Les 11, 12 et 13/10, 9 750 pigeons sont observés à Gentioux (23-AlbD) contre 200 à Flavignac (87-PreP). Notons également les 1 120 pigeons vus le 13/10 à Liginac, au sud-est de la Corrèze (19-BarJ). Les 18 et 20/10, ce sont 44 810 migrateurs qui sont comptabilisés depuis le puy de l'Aiguille à Gentioux (23-AlbD) et depuis Saint-Setiers (19-AlbD), et seulement 5 160 à Flavignac (87-PreP). 6 000 oiseaux sont comptabilisés dans la journée du 20/10 à Eymoutiers, à l'extrême Est de la Haute-Vienne (87-RogJ). De mauvaises conditions météorologiques expliquent sans doute la rétro-migration de 8 000 pigeons le 17/10 à Moissannes (87-BarJ). A signaler aussi un passage relativement timide à l'Est de Brive le 16/10 avec 4 223 pigeons à la Roche-de-Vic (19-ChaJ).

Le rush s'étale sur 3 jours du 21 au 23/10. L'ensemble de la région semble être concerné (à part peut-être l'extrême sud de la Corrèze ?). Voici un tableau des principaux sites suivis pendant ces journées. Les "-" indiquent qu'il n'y a pas eu de suivi.

Sites	21/10/04	22/10/04	23/10/04	Observateurs
Chaillac-sur-Vienne (87)	-	-	1 177	BusR
Flavignac (87)	28 049	76 596	75 506	PreP et al.
Janaillat (23)	57 933	-	-	RogJ
St-Yrieix-la-Perche (87)	-	-	21 502	CelJ
Gentioux-Pigerolles (23)	-	70 140	38 220	AlbD
St-Merd-les-Oussines (19)	29 660	-	-	AlbD

Le lendemain du rush, le passage devient moins intense avec 13 535 oiseaux à Flavignac (87-PreP), 8 775 à Moissannes (87-BarJ) ou encore 3 671 à Saint-Martin-Château (23-FleL). Peu d'oiseaux sont observés les jours suivants. Il faut attendre le 30/10 pour avoir un total supérieur à 6 000 oiseaux sur le plateau de Millevaches (19-AlbD), puis environ 4 000 le 06/11 à Flavignac (87-PreP). Le dernier vol en migration active est noté le 12/11 à Aix-sur-Vienne avec 21 pigeons (87-PreP).

Bilan de la saison 2004 : 210 000 pigeons ramiers ont été comptés depuis le site de Flavignac (87-PreP et al.) et environ 550 000 (sans doubles comptes) sur l'ensemble du Limousin. Environ 80 % des effectifs sont notés durant les 3 jours du rush. Un premier pic migratoire a été noté le 18/10 sur la montagne limousine mais il n'a pas été repéré ailleurs. Très peu de données nous sont parvenues du sud corrézien.

Migration postnuptiale 2005 :

Les premiers groupes sont notés le 19/09 à Naves (19-ChaJ), puis le 07/10 avec 200 pigeons (19-SouP). La migration devient plus sensible les 8, 9 et 10/10 avec 8 200 oiseaux sur les 3 jours à Gentioux (23-AlbD) et 4 665 à Flavignac (87-PreP et VirA). Plus de 3 000 sont également vus le 09/10 à la Roche-l'Abeille (87-DumA).

Le premier pic survient les 14, 15 et 17 octobre. Les conditions météorologiques n'étaient pas favorables le 16/10.

Voici les principaux sites suivis :

Sites	14/10/05	15/10/05	16/10/05	17/10/05	Observateurs
Chaillac-sur-Vienne (87)	-	5 234	877	-	BusR
Flavignac (87)	38 625	33 998	1 075	47 023	PreP et al.
Plateau de Millevaches	69 400	32 350	270	310	AlbD
Albussac (19)	-	-	4 223	-	ChaJ

La semaine suivante est très calme, le passage est quasi nul. Les journées à plus de 1 000 pigeons sont rares jusqu'au 24/10. 1 000 oiseaux le 20/10 à Meymac (19-AlbD) et 758 le 23/10 à Villeneuve (87-LabB).

Le second pic est aussi assez étalé dans le temps : les 24, 25 et 26/10.

Sites	24/10/05	25/10/05	26/10/05	Observateurs
Flavignac (87)	56 612	14 971	61 345	PreP et al.
Plateau de Millevaches (Gentioux (23) et Meymac (19))	2 800	6 000	40 000	AlbD

Les conditions météorologiques semblent avoir énormément influencé la migration. Le passage est dense dans le couloir central mais faible sur le plateau de Millevaches les deux premiers jours.

La migration est encore importante les 27 et 28/10 avec 27 595 oiseaux à Flavignac (87-PreP) mais décline les jours suivants. Le millier est atteint (1 389 exactement) le 06/11 à Flavignac (87-PreP et NauD). Les derniers migrateurs sont repérés le 20/11 à Compreignac (87-LanJ).

Bilan de la saison 2005 : cette saison a pris une tournure assez originale avec un premier pic migratoire très précoce entre le 14 et le 17/10 inclus. Il représente 48 % de l'ensemble des pigeons observés sur la période. Après consultation des dernières centrales, il semble que le passage si tôt et d'effectifs aussi importants soit une première. Le deuxième pic du 24 au 26/10 représente seulement 33 % des migrateurs de la saison. Enfin, nous n'avons pas eu de véritable rush mais un étalement du flux migratoire, le plus intense sur au moins 5 jours.

300 164 pigeons ont été observés à Flavignac soit 55 % de l'ensemble des effectifs comptabilisés. Le total, sans double compte, atteint 550 000 oiseaux. Les deux secteurs, les mieux suivis après Flavignac, sont ceux de Gentioux-Pigerolles et Meymac qui représentent 35 % de l'estimation totale.

Hivernage 2004/2005 :

Aucun gros rassemblement n'est noté. Le plus important est de 400 pigeons le 15/01/05 à Saint-Junien-les-Combes (87-GayJ). Le 09/01, 200 oiseaux sont observés à Saint-Robert (19-GauR) et 200 à Coussac-Bonneval (87-BurJ). Quelques groupes sont présents à des altitudes plus élevées, par exemple 60 à Meymac (19-AlbD) et autant le 05/12/04 à Royère-de-Vassivière (23-MerC). Le plus souvent, les groupes ne dépassent pas la centaine d'oiseaux en Limousin. Le dernier groupe (17 oiseaux) est vu le 17/04/05 à Saint-Pierre-de-Bost (23-NorT).

Hivernage 2005/2006 :

Il semble plus conséquent que l'hiver précédent. Un groupe de 200 est vu le 09/12 à Laurière (87-VinM). L'observation depuis la butte de Frochet le 12/12 permet de repérer 4 vols rejoignant leur dortoir, soit 2 100 pigeons (87-LabB). Ce même jour, un groupe supérieur au millier est aussi noté à Montrol-Sénard ainsi que 600 à Saint-Junien (87-LabB). 1 000 oiseaux sont au dortoir le 18/12 à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP).

Le mois de janvier nous donne le maximum d'observations. La présence des hivernants dans le nord de la Haute-Vienne est confirmée : 2 790 en 6 vols le 01/01 autour de Saint-Martial-sur-Isop (87-LabB) ; 21 500 sont comptabilisés en différents vols dans la soirée du 02/01 depuis la butte de Frochet (87-LabB).

Des vols plus petits de l'ordre de 200 sont présents à Saint-Junien, à Saint-Auvent, à Séreilhac (87-DouA et LabB). Des dortoirs de quelques centaines voire milliers sont trouvés ici et là en Haute-Vienne : 250 à Limoges (87-HubP), à Château-Chervix (87-MorS), 1 000 à Cieux (87-VirA), 700 à Videix (87-BusR), 1 500 à Saint-Léger-Magnazeix (87-CouR), 8 000 à Saint-Auvent (87-LabB) etc.

Moins de groupes sont contactés en février. La migration est déjà entamée, des vols ont déjà quitté le Limousin. Retenons tout de même les 1 500 au dortoir le 17/02 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) ou encore 3 100 le 27/02 à Rilhac-Lastours (87-DumA). Les observations sud corréziennes sont rares, peu de pigeons paraissent y stationner. 100 sont vus le 19/02 à Branceilles (19-Blal).

En mars, de petits vols proches de la centaine sont notés ici et là dans de nombreux sites haut-viennois et quelques effectifs plus importants en Corrèze : 1 200 le 14/03 à Neuvic (19-GfeE), 1 500 en 6 vols à le 25/03 Aubazine (19-MarP). Les derniers groupes sont vus le 02/04 avec 40 pigeons à Flavignac (87-LabB) puis 10 le 03/04 à Boussac-Bourg (23-NorT).

Nous avons très peu d'informations sur l'hivernage en Creuse, peu d'observateurs fréquentent ce département en hiver.

Nidification 2005 :

Premier chant le 03/01 à la tourbière des Dauges (87-GueK). Les chanteurs sont fréquents en mars ; parade observée le 28/03 à Lussat (23-VirA) ; première couvaison découverte le 30/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Des groupes se forment à nouveau en mai comme au Pescher où 10 individus se sont rassemblés (19-CorA). Durant l'été, ce phénomène se poursuit. Un groupe de 45 est posé dans un champ près de Limoges (87-VirA) et 88 autres le 09/08 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). La reproduction continue en août : un accouplement est mentionné le 24 à Ambazac (87-LanJ). Le dernier « couveur » est trouvé le 03/10 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Nidification 2006 :

Rien de très particulier n'est à signaler.

Premières parades le 03/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).

Premier chant le 14/01 à Châteauneuf (87-HubP).

Chants simultanés le 04/01 à Flavignac (87-LabB).

Premier nid en construction le 26/01 à Limoges (87-GauR).

Mars apparaît comme le mois où les chants et parades se multiplient. Des nids sont trouvés en avril (87-BusR) et en juillet (23-DubP).

Migration prénuptiale 2005 :

Des mouvements migratoires apparaissent tôt, dès le mois de janvier : 60 le 23/01 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). 200 passent le 25/02 vers le nord à Ayen (19-LafM). C'est à la mi-mars que la migration est plus régulièrement notée : 553 le 12/03 à Flavignac (87-PreP), 200 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ), 1 113 le 13/03 à Flavignac (87-PreP) ou encore 850 le 14/03 à Neuvic (19-BarJ). 362 passent encore le 20/03 à Flavignac (87-PreP) et la dernière donnée de migrants (80) date du 23/03 à Gorre (87-HubP).

Migration prénuptiale 2006 :

Des vols en migration active passent dès le mois de janvier, avec notamment 120 oiseaux le 15/01 à Beynac (87-PreP). Les journées qui totalisent le plus de migrants sont :

- 11 et 12 février : 6 444 ind. à Flavignac (87-PreP).
- 11 et 12 mars : 670 ind. à Aubazine (19-MarP) et 1 026 à Flavignac (87-PreP).

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

● Un rassemblement postnuptial de 22 ind. est noté le 17/08/04 à Chasteaux (19-EyrO). Les groupes forment des dortoirs hivernaux comme au Dorat le 07/01/05 avec 35 oiseaux (87-CavP) ou encore à Chambon-sur-Voueize le 20/12/05 (23-DubP). Le premier chant est noté le 10/01/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) puis le 14/01 à Ayen (19-CreD). Les premières parades apparaissent le 16/01 à Limoges (87-VirA) et la première construction d'un nid est établi le 20/01 à Ambazac (87-LanJ). Un chant est noté le 20/04 à Merline, à l'Est de la Corrèze (19-DouA). 2 jeunes sont au nid le 21/09 à Flavignac (87-PreP). Un oiseau chante le 20/12 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). En 2006, des comportements territoriaux sont signalés le 03/01 à Aix-sur-Vienne (87-PreP).

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

● Une bande importante a été suivie à Flavignac à partir du 28/08/04. Elle compte alors 40 oiseaux puis atteint 72 le 15/09 (87-PreP). Elle n'est plus observée après cette date, les oiseaux partent en migration.

Le retour est constaté :

- le 20/04/05 à Lavaufanche (23-NorT),
- le 24/04 à Oradour-sur-Vayres (87-BouL),
- le 28/04 à Vars-sur-Roseix (19-CreD).

Les chanteurs se manifestent au fur et à mesure des arrivées en mai et les premières couvaisons sont constatées le 21/05/05 à Flavignac. Un nid garni de 2 jeunes est découvert le 26/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et le 28/05 (87-PreP). En 2005, un groupe a atteint 114 ind. le 21/08 à Flavignac (87-PreP).

Le retour printanier est attesté le 25/03/06 à Aubazine (19-MarP), le 13/04/06 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) et le 16/04 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-LanJ). Un nid est en construction le 08/05 au Dorat (87-CavP) et des oeufs sont trouvés le 04/06 à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP).

CUCULIDÉS

Coucou gris (*Cuculus canorus*)

- Les derniers contacts sont :
 - 1 juvénile le 17/09/04 à Videix (87-BusR),
 - 1 chant entendu le 28/06/05 au Palais-sur-Vienne (87-GauR),
 - 1 ind. le 29/06/06 à Ambazac (87-LanJ).

Passée la dernière décade de juin, l'espèce devient très discrète. Elle est l'objet de seulement deux autres citations :

- 1 ind. posé sur un arbre le 21/08/04 à Lussat (23-DubG),
- 1 ind. le 01/09/04 à Moissannes (87-BarJ).

Les premiers « coucoulements » sont entendus le 14/03/05 à Saint-Priest-Taurion (87-LanJ) et le 14/03/06 à Turenne (19-DauR). Notons ici la similitude des dates.

Seuls deux indices de nidification certaine sont relevés :

- nicheur certain (sans précision) le 03/05/06 au Vigen (87-HipS),
- un jeune nourri par un couple de Rougegorges le 16/05/06 à Aubazine (19-MarP).

Une femelle rousse est observée le 03/04/05 à Ladapeyre (23-NorT), et une seconde le 27/04/06 à Saint-Julien-près-Bort (19-NorT).

Les opérations de comptages (EPS ou sites) sont à l'origine des 2/3 des citations (n=1053). En résumé, l'espèce est contactée généralement de mi-mars à fin juin, seulement 3 mentions étant en dehors de cette période (n > 1500).

TYTONIDÉS

Effraie des clochers (*Tyto alba*)

- Elle est signalée tout au long de l'année, mais le nombre de données relevées est plus important au cours de l'hiver et au début du printemps. 15 % des citations font mention de collision de l'espèce contre des véhicules. Seulement 6 personnes ont transmis ce type de données, alors que nombreuses sont les données de cadavres vus sur les routes. Ce pourcentage devrait donc être plus important que celui indiqué précédemment. Un individu « aventurier » est resté coincé dans un conduit de cheminée le 18/01/06 à Veyrac (87-LanJ). Signalons également les restes d'une effraie, apparemment plumée par un Grand-Duc, retrouvés le 13/03/05 à Sérandon (19-BarJ).

Les données recueillies en période de reproduction représentent 20 % des citations, et peu nombreux sont les indices indiquant une reproduction certaine. Deux observations répertoriées concernent des nids garnis d'œufs : 5 œufs le 19/05/05 à Châlus (87-CouC) et 6 œufs le 22/05/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). 5 jeunes au nid sont découverts le 19/05/05 à Bussière-Galant (87-CouC), et d'autres sont également vus les 06/05/06 à Ambazac (87-BouP) et 12/08/06 à Royères (87-LoIN). Si certains jeunes sont encore au nid au mois d'août, d'autres ont déjà pris leur envol, notamment 1 jeune posé sur une toiture d'habitation le 16/08/04 à Ambazac (87-LanJ). 4 jeunes volants sont aperçus le 15/09/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).

Grand-Duc d'Europe (*Bubo bubo*)

● Très localisé en Limousin, il est principalement contacté dans les gorges de la Dordogne. Aucune donnée récoltée durant l'hiver 2005/2006.

- 1 ind. le 09/09/04 et le 05/11/04 à Sainte-Marie-Lapanouze (19-BarJ),
- 1 ind. le 17/03/05 à Sérandon (19-BarJ),
- 1 ind. le 04/04/05 à Soursac (19-BarJ).

La reproduction est certifiée sur plusieurs sites dans l'est de la Creuse. Les naissances sont relevées entre le 15 mars et 10 avril (YveJ). Sur 7 sites suivis en 2006, trois couples ont produit respectivement 2, 1 et 2 jeunes à l'envol (YveJ). Trois autres sites, ont quand eux, étaient désertés alors que l'année passée, ils étaient occupés (YveJ). Deux cas de reproduction sont relevés en Corrèze (19-BarJ).



Grand-duc d'Europe, Creuse (23), mai 2006 (Jérôme Yvernault)

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

● Les données montrent nettement un déséquilibre dans la répartition géographique de l'espèce, puisque 79 % des données proviennent de la Haute-Vienne, 18 % de la Corrèze et 3 % de la Creuse.

L'espèce est régulièrement entendue de janvier à août, avec une fréquence maximum en mars et un second en juin. De septembre à décembre, les contacts deviennent plus rares.

L'espèce chante quasiment tout au long de l'année, avec un maximum courant mars.

La première observation d'un couple est effectuée le 12/03/05 à Ambazac (87-LanJ). Des chants simultanés sont entendus comme le 19/03/05 à Saint-Auvent (87-DouA) et le 01/04/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Trois œufs, malheureusement clairs, sont découverts le 17/05/05 à Châlus (87-CouC). Le premier jeune est observé le 04/06/05 à Saint-Martin-le-Vieux (87-CouC), et le dernier nourrissage est noté le 22/07/06 avec 5 juvéniles à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Malheureusement, plusieurs cas de mort par choc avec un véhicule sont rapportés, comme cet individu trouvé sur la route le 14/03/05 à Verneuil-sur-Vienne (87-LanJ).



Chevêche d'Athena, Videix (87), janvier 2008 (Raphaël Bussière)

Chouette hulotte (*Strix aluco*)

● Sur 1 269 données, 63 % proviennent de la Haute-Vienne, 22 % de la Corrèze et 15 % de la Creuse.

Elle est souvent repérée grâce à son chant et plus rarement vue sur son gîte diurne, ou lorsqu'elle se fait houspiller par des corvidés comme cet oiseau le 03/06/06 à Limoges (87-JofP).

Les chants se font entendre toute l'année, avec une légère diminution des émissions vocales durant la période d'élevage des jeunes et au début de l'automne. Des chants simultanés se font entendre le 03/01/06 à Ambazac (87-LanJ) ainsi que le 17/01/06 à Limoges (87-SchO). Un couple paradant est observé le 25/01/06 à Limoges (87-VirA). 3 œufs sont découverts dans un nichoir le 15/03/05 à Châlus (87-CouC). Un nid est occupé le 17/03/05 à Sérandon (19-BarJ). Les premiers jeunes non volants sont observés le 17/04/05 dans un nichoir à Châlus (87-CouC). Les premiers juvéniles volants sont notés le 02/05/05 à Pageas (87-CouC) et le 28/05/06 à Limoges (87-VirA).

7 cas de collision avec véhicule sont enregistrés, comme le 26/04/05 à Isle (87-GauR) ou encore le 27/10/04 à Lussat (23-VirA).

Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

● L'espèce est, comme beaucoup de strigidés, particulièrement discrète, et est assez peu contactée en dehors de la période de reproduction. Elle semble équitablement représentée dans les trois départements et fréquente les basses comme les hautes altitudes, comme par exemple cet oiseau observé le 08/04/06 à Saint-Merd-les-Oussines (19-DhaG).

L'automne offre peu d'observations de l'espèce. Quelques données d'individus en vol sont rapportées :

- 1 ind. le 04/11/04 à Neuvic (19-BarJ),
- 1 ind. le 26/11/04 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).

Une seule donnée d'individus en dortoir hivernal est notée : 4 ind. posés dans un arbre le 01/12/05 à Boisseuil (87-CelJ).

Les premiers mâles chanteurs sont contactés le 11/03/06 à Flavignac (87-LabB) et le 14/03/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Les premières parades sont notées le 31/03/06 à Turenne (19-DauR). La couvaison est constatée durant la première semaine de mai, avec notamment :

- 1 femelle couve dans un ancien nid de corneille le 01/05/05 à Flavignac (87-PreP),
- 1 femelle couve le 05/05/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Les premiers jeunes non volants sont observés le 11/06/05 à Flavignac (87-PreP) ainsi que le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP). Un jeune est encore entendu le 30/08/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Une seule donnée porte sur un oiseau victime du trafic trouvé écrasé le 14/04/06 à Linards (87-LabG).

Hibou des marais (*Asio flammeus*)

● La migration postnuptiale est marquée par l'observation de quelques individus durant le mois d'octobre :

- 1 ind. le 19/10/04 à l'étang de Landes (23-DesF),
- 1 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-PreP et al.),
- 1 ind. le 20/10/05 à Flavignac (87-PreP).

Aucune donnée certaine d'hivernage n'a été rapportée pour la période considérée.

Deux observations printanières tardives laissent espérer une éventuelle reproduction bien qu'elle n'ait pu être prouvée :

- 1 ind. le 20/04/06 à l'étang de Landes (23-PalG),
- 2 ind. le 14/05/05 à Lamazière-Haute (19-VirA et DouA).

Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)

● Seulement une donnée pour cette espèce nocturne discrète et rare dans notre région : 1 mâle chanteur, assez tardif, le 25/04/06 sur le Mont-Bessou (19-BouH). Aucune donnée de reproduction.

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)

Le département de la Creuse est toujours sous prospecté avec une seule donnée. La dernière mention de l'espèce est notée le 18/09/04 à Bussière-Galant (87-EyrO et al.). Premier retour le 24/04/06 à Peyrissac (19-DouA) avec des chanteurs simultanés déjà à l'ouvrage, puis plus sûrement courant mai sur des sites connus pour accueillir l'espèce (landes, tourbières). Quatre couples sont cantonnés le 24/06/06 à Rilhac-Lastours (87-HubP et al.) et un nid contenant deux œufs est découvert le 01/06/06 à Neuvic (19-GfeE).

APOPIDÉS

Martinet noir (*Apus apus*)

Dès les premiers jours de juillet, les martinets entament leur migration vers leurs quartiers d'hivernage. Les groupes les plus importants, notés en migration active, concernent 325 ind. le 04/07/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et 172 ind. le 19/07/06 à Limoges (87-VirA). Les données se font de plus en plus rares de la fin juillet à mi-août, mais certains oiseaux s'attardent : 3 ind. le 02/09/04 à Flavignac (87-PreP) et 2 ind. le 04/09/05 à Magnac-Bourg (87-TuLY).

Dans la région, son retour printanier est noté lors de la première quinzaine d'avril. Les « éclaireurs » sont aperçus le 11/04/05 à Allasac (19-LabB) et le 14/04/06 à Tulle (19-SaulP). Le « gros » des troupes arrive massivement durant la dernière quinzaine d'avril, représentant 16 % des citations. A cette période, les données portent majoritairement sur des oiseaux vus en groupe : 40 ind. le 24/04/05 à Lussat (23-DupE) et 134 ind. le 18/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP). Le dernier groupe en migration active répertorié date du 26/04/06 avec 35 ind. à Ligniac (19-CavP).

Dès leur arrivée printanière sur les sites de nidification, les parades nuptiales sont notées ici et là, avec les premiers individus paradant le 26/04/06 à Ligniac (19-CavP), et ce jusqu'à la fin du mois de mai, notamment le 21/05/06 à Saint-Junien-la-Bregère (23-BouP). Le transport de nourriture débute le 28/05/06 à Rochechouart (87-BusR) et le dernier nourrissage au nid est relevé le 16/07/06 à Ambazac (87-LanJ). C'est au mois de juin que la majorité des citations répertoriées mentionne « Nid garni avec poussins » : le 21/06/05 à Pierre-Buffière (87-LanJ) et le 10/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Martinet à ventre blanc (*Apus melba*)

Cette espèce, rarissime dans la région limousine, est contactée à Neuvic avec l'observation de 2 individus en vol le 12/05/06 (19-DubY).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)

● L'espèce est observée tout au long de l'année dans notre région, les adultes étant principalement sédentaires. La répartition des données est relativement homogène, la moitié des observations provenant de Haute-Vienne, traduisant un nombre d'observateurs plus important dans ce département, et l'autre moitié se répartissant à parts égales entre la Creuse et la Corrèze.

Les éventuels passages migratoires de jeunes oiseaux ou d'individus nordiques ne donnent lieu à aucune augmentation des observations. En hiver, l'espèce est plus régulièrement contactée que lors des autres saisons. Mais cela tient en grande partie au fait que les plans d'eau sont plus fréquentés par les observateurs à cette saison. Ainsi, le comptage Wetlands correspond chaque année à un pic du nombre d'observations de Martins-pêcheurs. De plus, la période des parades commence tôt, au cœur de l'hiver, les individus étant alors moins discrets que le reste de l'année.

La reproduction est établie à 4 reprises au cours de la période considérée. C'est peu, et l'espèce mériterait un effort de prospection plus important. Le 01/06/05, 3 jeunes volants sont nourris par un adulte à Droux (87-CavP). Le 14/08/05, 4 individus sont observés ensemble, en famille, à l'étang de Murat (87-VirA). Ce jour là 6 individus fréquentent le site, plus gros effectif observé au cours de la période. Le 21/04/06, un nid occupé est découvert à Saint-Dizier-Leyrenne (23-CSP 23). Enfin le 31/05/06, un adulte transportant de la nourriture est observé à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Des indices de reproduction probable sont obtenus en Corrèze, mais aucun indice certain.

MÉROPIDÉS

Guépier d'Europe (*Merops apiaster*)

- Les dernières citations sont :
- 2 ind. posés sur un fil électrique le 29/08/04 à Perpezac-le-Blanc (19-CreD),
 - 45 ind. en migration active vers le sud-ouest le 05/09/05 à Meymac (19-RafB).

Pour 2005, les premiers contacts sont :

- 5 ind. en vol le 27/04/05 à Neuvic (19-DelA),
- 10 ind. posés le 04/05/05 Perpezac-le-Blanc (19-CreD),
- 10 ind. en migration le 12/05/05 à Orliac-de-Bar (19-ChaJm),
- 3 ind. posés sur un fil électrique le 15/05/05 à Mansac (19-GauR).

En 2006, la première citation est de 2 ind. posés le 10/05/06 à Perpezac-le-Blanc (19-CreD).

En 2005, 3 cas de nidification sont relevés ; 2 « certains » et 1 « probable » :

- 2 ind. s'envolent du nid le 26/05/05 à Perpezac-le-Blanc (19-CreD),
- 1 adulte nourrit un jeune le 10/07/05 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-MerC),
- 1 cavité vide découverte le 09/07/05 à Argentat (19-NorT).

Pour 2006, 3 couples transportant de la nourriture le 31/07/06 à Perpezac-le-Blanc (19-LabD) sont les seuls nicheurs certains contactés dans la région. On notera aussi deux groupes d'une dizaine d'oiseaux le 24/08/04 à Perpezac-le-Blanc (19-PloA) et 36 individus posés sur un fil électrique le 06/08/06 à Mansac (19-GauR).

L'espèce a été contactée dans 7 communes différentes. 64 % des citations sont réalisées en 2005 (n=25). La répartition des cas de nidification, rares et isolés, est liée aux affinités méridionales et thermophiles de l'espèce, ainsi qu'à la présence nécessaire de talus de sable pour creuser le terrier abritant le nid.

UPUPIDÉS

Huppe fasciée (*Upupa epops*)

● Les dernières observations de l'espèce sont le 09/09/04 à La Souterraine (23-GilD) et Saint-Maurice-la-Souterraine (23-GilD) et le 10/09/05 à Flavignac (87-PreP).

Les premiers contacts printaniers ont lieu dès le mois de mars : 1 ind. 14/03/05 à Coussac-Bonneval (87-FauFr) et 1 ind. le 02/03/06 à Flavignac (87-Pral).

Les premiers chants sont entendus le 20/03/05 à Brive-la-Gaillarde (19-BerF) et le 02/03/06 à Flavignac (87-Pral). Le premier nid occupé par un individu couvant est observé le 05/05/05 à Châlus (87-CouC) et le 14/05/06 avec un individu entrant dans nid à Saint-Martin-le-Vieux (87-LabB). La première éclosion a lieu le 22/05/05 à Châlus (87-CouC) et au 01/06/05, le nid est garni de 4 poussins et 2 œufs clairs (87-CouC). Les premières familles sont observées le 08/06/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et le 18/06/06 à Cublac (19-GauR). Concernant la couvée de Châlus en 2005, l'envol des jeunes est échelonné : le 16/06 pour le 1^{er}, le 17 pour le 2^{ème}, le 19 pour le 3^{ème} et le 22 pour le 4^{ème}.

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

● L'espèce n'est quasiment pas contactée en Creuse (5 % des données). La Corrèze fournit 50 % des données et la Haute-Vienne, les 45% restants.

2 données font état d'individus en halte migratoire postnuptiale :

- 1 ind. le 26/08/05 à Limoges (87-VirA),
- 1 ind. le 06/09/04 à Limoges (87-HubP).

Les premiers migrateurs arrivent dans notre région peu de temps après le début du printemps :

- 1 ind. précoce le 29/03/05 à Voutezac (19-Chal),
- 1 ind. le 22/04/05 à Bonnac-la-Côte (87-SotJ),
- 1 ind. le 30/04/05 à Compreignac (87-SotJ).

À peine arrivés, les mâles commencent à chanter :

- 1 chanteur le 24/04/05 à Bonnac-la-Côte (87-SotJ),
- 1 chant entendu le 28/04/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Des chants simultanés sont entendus le 27/04/06 à Meymac (19-VirA) ainsi que le 01/05/06 à Saint-Frejoux (19-VarC). Le dernier chanteur est contacté le 26/06/05 à Château-Chervix (87-Sepol).

La seule donnée de reproduction certaine concerne une nichée ayant vu le jour le 03/06/06 dans un nichoir à Saint-Viance (19-GauMi).

Pic cendré (*Picus canus*)

● 2 observations pour cette espèce très rare en Limousin :

- 1 ind. le 18/04/06 à Veyrac (87-GenC),
- 1 ind. entendu le 01/05/06 à Noailles (19-CreD).

Peut-être les prémices d'une recolonisation de certains milieux...

Pic vert (*Picus viridis*)

● L'espèce est fréquente voire abondante sur l'ensemble de la région. 1 299 données ont été récoltées. 48 % nous arrivent de Haute-Vienne, 39 % de Corrèze et 13 % de Creuse.

L'espèce est entendue de début janvier à fin juillet. Les premiers chanteurs sont notés le 29/12/04 et le 02/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), ainsi que le 16/01/05 à Oradour-sur-Vayre (87-DouA). Un peu plus tard dans la saison, son rire tonitruant retentit dans toute la région :

- 1 ind. le 01/03/05 à Turenne (19-DauR),
- 1 ind. le 06/03/05 à Limoges (87-GauR),

- 1 ind. le 15/03/06 à Saint-Merd-les-Oussines (19-VirA),
- 1 ind. le 17/04/06 à Saint-Martin-Château (23-FleL).

Des chants simultanés sont également notés :

- 2 chanteurs le 05/04/05 à Boussac (23-NorT),
- 2 chanteurs le 19/04/06 à la Chapelle-aux-Saints (19-GauR).

14 reproductions ont été prouvées. Parmi celles-là, le premier nid avec poussins est découvert le 20/05/06 à Chaillac-sur-Vienne où l'observateur assiste à des nourris-sages (87-BusR). Le lendemain, des jeunes sont entendus dans une loge à Objat (19-LafJ). Les premiers jeunes volants sont observés le 11/06/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) puis le 12/06/06 à Limoges (87-JofP). La plus grosse nichée observée a vu s'envoler 4 juvéniles le 13/06/06 à Objat (19-LafJ). Les derniers jeunes non émancipés sont 2 juv. vus le 04/07/06 à Limoges (87-VirA).

Bien qu'il soit moins assidu à la mangeoire que son cousin l'épeiche, il y est vu parfois comme cet individu observé en train de s'y nourrir le 18/12/05 à Limoges (87-VirA).

Pic noir (*Dryocopus martius*)

Signalé toute l'année dans une bonne partie de la région. Il reste tout de même relativement peu abondant en Haute-Vienne, en Basse Corrèze ainsi que dans le Nord de la Creuse. En revanche, il est très présent sur le plateau de Millevaches et ses contreforts.

On l'entend chanter du mois de décembre au mois de juin, par exemple le 03/12/04 à Cieux (87-NauD) et le 29/12/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), ou encore le 16/03/06 à Pionnat (23-NorT) et le 04/05/05 à Meymac (19-NauD).

Des tambourinages sont entendus de janvier à mai : 1 ind. le 03/01/06 à Nieul (87-LanJ) et le 23/04/06 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP).

Des loges sont découvertes, exclusivement dans des hêtres :

- 1 ind. fore une loge le 31/03/06 à Bugeat (19-VirA),
- 1 loge découverte le 06/04/05 à Leyrat (23-NorT),
- plusieurs loges découvertes sur la commune de Peyrelevade dont une le 25/04/06 (19-SegS) et une autre le 04/05/06 (19-DesG).

Quelques données de reproduction sont rapportées :


- juvéniles le 12/06/05 à Peyrelevade (19-CorP),
- poussin trouvé mort au pied de l'arbre le 12/06/05 à la Souterraine (23-GueK).

Pic épeiche (*Dendrocops major*)

48 % des données proviennent de la Haute-Vienne, 37 % de la Corrèze et 15 % de la Creuse. L'espèce est bien représentée dans toute la région limousine et à toute altitude.

Une seule donnée de migrateurs est enregistrée avec l'observation de 3 ind. comptabilisés le 14/10/05 à Flavignac (87-PreP).

Le tambourinage est entendu de décembre à juin. Les premiers se font entendre le 12/12/04 à Juillac (19-CorA) et le 18/12/04 à Ambazac (87-LanJ).



31 reproductions ont été recueillies. Une loge est occupée le 19/03/06 à Neuviç (19-BouH). Des parades nuptiales sont notées le 23/04/06 à Limoges (87-GenC). Les premiers poussins sont visibles le 17/05/06 à Aubazine (19-MarP), le 21/05/05 à Châlus (87-CouC) et le 23/05/06 à Ambazac (87-LanJ). Des juvéniles volants sont vus le 04/06/06 à Saint-Robert (19-GauR) ainsi que le 25/06/06 à Segonzac (19-GauR).

Il existe de nombreux cas de collision avec des véhicules ainsi qu'avec des vitres, le premier cas étant souvent plus grave que le second. Un oiseau s'assomme contre une vitre le 12/01/05 à Peyrilhac (87-BouP) tandis qu'un autre est trouvé mort sur la route le 26/05/05 à Saint-Exupéry-la-Roche (19-ThoF). L'espèce fréquente également les mangeoires durant l'hiver : 1 ind. le 26/12/05 à Tulle (19-SouP) ainsi qu'un 1 ind. observé sur une boule de graisse le 30/01/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-HagM).



Pic épeiche, Pierre-Buffière (87), décembre 2006 (Aurélien Audevard)

Pic mar (*Dendrocopos medius*)

● La Corrèze fournit près de la moitié des données, la Haute-Vienne 38 % et la Creuse 16 %. Aucune donnée de migration active n'a été rapportée sur la période considérée.

Le chant retentit de début janvier à fin avril avec une donnée extrême en début juin. Ainsi, il est entendu dès le 07/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et le 01/02/06 à Turenne (19-GauR). Il est également relevé en Creuse où un chanteur est noté le 15/04/05 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT). Il retentit pour la dernière fois le 04/06/06 à Saint-Julien-près-Bort (19-Sepol). Deux oiseaux chantent simultanément le 11/03/05 à Châteauneuf-la-forêt (87-MorS).

Des couples sont observés assez tôt dans la saison, notamment le 19/01/05 à Saint-Junien (87-DouA) et le 13/02/06 à Aubazine (19-MarP).

3 données de reproduction recueillies :

- un nid découvert le 08/05/05 à Cussac (87-CouC). Un poussin y sera vu le 24/05/05 (87-CouC),
- un juvénile non volant le 22/06/06 à Aubazine (19-MarP),
- un transport de nourriture le 01/07/06 à Beynat (19-MarP).

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

● L'espèce, bien qu'elle ne soit pas abondante, semble correctement occuper les zones qui lui sont favorables. Elle est d'ailleurs complètement absente de la Montagne limousine. Aucune donnée de migration active n'a été enregistrée.

Le chant peut être entendu quasiment toute l'année, avec une activité vocale maximale en avril et une légère trêve en novembre. Ainsi, il est entendu dès le 20/12/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) puis 1 mâle chanteur tambourine le 14/01/05 à Saint-Pardoux (87-GauR). Le chant peut être relevé dans les trois départements :

- 1 ind. le 18/04/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP),
- 1 ind. le 23/04/05 à Guéret (23-RobS),
- 1 ind. le 25/06/06 à Bussière-Galant (87-Pral).

Des chants simultanés sont signalés le 13/04/05 à Fontanières (23-DupE). Une loge est découverte le 09/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Des couples sont observés à plusieurs reprises, comme le 03/04/06 à Saint-Junien (87-DouA) ou encore le 03/05/05 à Compreignac (87-SotJ).

2 données de reproduction sont rapportées :

- nourrissage de jeunes au nid le 05/06/05 à Glandon (87-CelJ),
- juvénile le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

Migrations postnuptiales :

Les 2 premières migratrices sont contactées le 25/09/04 à Flavignac (87-PreP). De petits groupes très majoritairement inférieurs à 5 individus sont notés durant le mois d'octobre. Les totaux les plus importants sont réalisés à :

- Flavignac le 16/10 avec 106 ind. (87-PreP)
- Flavignac le 17/10 avec 102 ind. (87-PreP),
- Chaillac-sur-Vienne le 23/10 avec 128 ind. (87-BusR),
- Saint-Léger-la-Montagne le 27/10 avec 92 ind. (87-NauD).

Le plus gros groupe observé est constitué de 61 alouettes le 27/10 aux Combes (87-NauD). Le dernier oiseau en migration active est vu le 05/11 à Flavignac (87-PreP).

Au total 689 « lulus » ont été comptabilisées pour l'ensemble du Limousin dont 321 sur le site de Flavignac (87-PreP et VarJ).

En 2005, la première donnée de migration date du 01/10 à Flavignac (87-PreP). Un groupe de 20 oiseaux passe le 14/10 sur ce même site (87-VarJ) et le dernier vol est noté le 01/11 (87-PreP). Les 49 individus notés le 11/10 à Flavignac constituent l'effectif maximum pour une journée.

La migration semble avoir été moins bien suivie sur le Limousin cette année, sauf à Flavignac. Le cumul pour la saison est de seulement 268 alouettes dont 240 à Flavignac (87-PreP, VarJ et VirA).

Hivernages :

Peu de données. Quelques groupes supérieurs à 20 individus sont notés :

- 44 ind. le 21/11/04 à Videix (87-BusR),
- 20 ind. le 11/12/04 à Leyrat (23-NorT),
- 22 ind. le 20/12/04 à Bétête (23-MorD),
- 70 ind. le 19/02/05 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

L'hivernage 2005/2006 n'est guère mieux renseigné. 3 groupes de plus de 20 oiseaux sont repérés : 24 ind. le 25/01/05 à Budelière, 25 ind le 21/11/05 à Châlus (87-CouC) et 24 ind. le 14/01/06 à Videix (87-BusR).

Migrations prénuptiales :

Le phénomène nous échappe largement. Un groupe de 12 passe en migration le 10/03/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 3 le 12/03/06 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).

Chants et nidifications :

Les chants sont entendus dès le mois de septembre pour les deux années. Des migrants profitent de leurs haltes pour se faire entendre. Durant l'hiver, une « lulu » est entendue le 02/01/05 à Saint-Méard (87-MorS) et aussi quotidiennement les 15 derniers jours de janvier 2006 à Saint-Laurent-sur-Gorre (87), à Oradour-Saint-Genest (87), à Budelière (23) (DouA, CavP, DubP), en février également avec 3 chanteurs simultanés le 16/02/06 à Meyrignac-l'Eglise (19-MorS). Les manifestations vocales se multiplient en mars.

Les contacts réguliers n'apportent pas de nouveautés sur la répartition.

Quelques preuves de nidifications ont été rapportées :

- transport de nourriture le 23/04/05 à Louignac (19-GauR),
- famille à Saint-Germain-les-Belles le 06/07/05 (87-MorS),
- transport de nourriture à Soudaine-Lavinadière le 24/07/05 (19-HubP).

Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

Migrations postnuptiales :

En 2004, les premiers migrateurs sont contactés le 04/10 à Lussat (23-DubG). Les vols de faible effectif totalisent 132 alouettes le 09/10 à Flavignac (87-PreP). Le 10/10, des vols de plusieurs dizaines passent à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). La migration s'amplifie la deuxième décade d'octobre avec des vols repérés en Corrèze (19-ChaJ) et en Haute-Vienne, de Bussière-Boffy à l'ouest (87-DouA) jusqu'à Moissannes à l'est (87-BarJ), et certains dépassent la centaine à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Le 18/10, 2 447 sont comptées à Flavignac (87-PreP). Le rush a lieu le 21/10 avec plus de 6 000 alouettes à Flavignac (87-PreP). Le plateau de Millevaches est aussi survolé : 220 le 21/10 à Saint-Merd-les-Oussines (19-AlbD). Cette forte activité migratoire se prolonge jusqu'au 23/10 avec toutefois une baisse d'intensité : 1 753 passent le 23/10 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Le dernier vol, en migration active, est noté le 10/11 à Limoges (87-ChaG).

En 2005, le 06/10 marque le début de la migration à Flavignac (87-PreP). Comme l'année précédente, c'est le 10/10 que l'on remarque une accélération du phénomène avec 540 oiseaux à Flavignac (87-PreP et VirA). Plus de 800 le 15/10 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) puis l'effectif maximum de la saison est atteint le 23/10 à Flavignac avec 2 265 oiseaux (87-PreP). Les dernières migratrices passent le 11/11 à Flavignac (87-PreP). Le passage a été moins spectaculaire en 2005 qu'en 2004, sans véritable rush.

Hivernages :

Peu de données sont centralisées, seulement 35 citations pour les deux années entre la mi-novembre et la mi-février lorsque les premiers vols en direction du nord sont repérés. Voici les groupes les plus importants : 200 ind. le 25/12/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ) et 100 le 06/02 à Flavignac (87-PreP). De petits groupes stationnent ici et là :

- 20 ind. le 16/01/05 à Saint-Maurice-la-Souterraine (23-GauR),
- 40 ind. le 31/01/05 à Ambazac (87-LanJ),
- 17 ind. le 13/02/05 à la Roche-l'Abeille (87-DumA),
- 30 ind. le 11/12/05 à Folles (87-VinS),
- 24 ind. le 08/01/06 à Coussac-Bonneval (87-CelJ),
- 60 ind. le 05/02/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP).

Aucune donnée ne nous est parvenue des hauteurs corrésiennes ou creusoises, pas plus de la basse Corrèze d'ailleurs.

Migrations prénuptiales :

Le 15/02/05, un vol en migration active est repéré à Aix-sur-Vienne (87-PreP). 284 passent le 24/02 à Flavignac (87-PreP) et 500 sont posées le 28/02 à Saint-Etienne-de-Fursac (23-GueK). Un groupe de 200 individus fait une halte le 13/03 à Mourioux-Vieilleville (23-SotJ).

En 2006, des petits vols sont notés le 11/02 à Flavignac (87-PreP). Le 24/02, 2 vols (247 oiseaux) sont observés à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Un groupe de 150 stationne le 11/03 à Flavignac et 200 à Folles (23-VinS). Les dernières en migration active sont vues le 17/03 à Mézières-sur-Issoire (87-RogJ).


Nidifications :

Plusieurs chanteurs sont entendus dès la fin mars : le 16/03/05 à Flavignac (87-PreP), le 25/03/06 à Beynat (19-MarP). Au mois d'avril, les chants sont plus fréquents : le 02/04/05 à Arnac-la-Poste (87-GauR) et à Leyrat (23-NorT). Les bastions traditionnels de l'espèce fournissent le maximum de données : 6 chanteurs simultanés le 19/04/06 à Peyrelevade (19-SegC et DesG), 10 au Moulin de Chabannes (19-DesG), plusieurs couples dans le bassin de Gouzon (23-PalG), 3 le 18/05 à Gajoubert (87-LabB) et 10 simultanément le 18/06 à Bessines (87-HubP). D'autres alouettes sont signalées en juillet à Gouilles (19-DitM) et à Saint-Yrieix-la-Perche (87-RoyM).

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

Des quatre hirondelles observées en Limousin, l'Hirondelle de rivage est la plus rare si l'on se fie au nombre de données. La répartition des observations mois par mois, en considérant le nombre total d'individus, est présentée dans le graphique ci-dessous.



En Limousin, l'Hirondelle de rivage est principalement observée lors des passages migratoires.

C'est la migration postnuptiale qui donne lieu au maximum d'observations. Le pic du passage a lieu en août. Environ 300 individus sont ainsi signalés le 12/08/06 sur l'étang de Landes (23-BarJ). La donnée la plus tardive est datée du 27/09/04, avec 17 individus à Sérandon (19-BarG). Le premier retour est noté le 13/03/06, avec 1 indi-

vidu en migration active à Laurière (87-VinS). Les données de migration prénuptiale sont diffuses et témoignent d'un passage moins marqué. De manière générale, les observations en période de migration concernent principalement des individus en vol au-dessus de plans d'eau ou bien en migration active. Les données sont plus nombreuses sur les secteurs de la région les plus bas en altitude et les plus riches en étangs, cette hirondelle étant une espèce de plaine inféodée à l'eau. Mais les migrants sont susceptibles d'être observés n'importe où en Limousin.

La reproduction reste rare dans notre région, et mérite d'être signalée systématiquement. Au cours de la période considérée, elle est prouvée sur 5 sites :

- Une colonie avec nourrissage de jeunes (46 trous mais pas tous occupés) le 21/05/05 aux sablières des Séguines à Saint-Brice-sur-Vienne (87-MerC). L'année suivante, 20 nids sont notés le 04/07/06 (LabB).
- Une colonie avec 10 nids occupés le 01/06/06 à Gouzon (23-CSP 23).
- Présence de nid occupé (sans précision de nombre) le 03/06/06 à Mansac (19-GauR), le 02/07/06 à Altillac (19-GauR) et le 09/08/06 à Saint-Viance (19-GauR).

On recherchera l'espèce le long des grandes rivières et dans les quelques carrières de sable de la région.

Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)

● L'espèce reste relativement peu observée dans notre région, avec un total de 73 données. 75 % des données sont de Corrèze (n=55), 14 % de Creuse (n=10) et 11 % de Haute-Vienne (n=8). Notons qu'aucune donnée ne concerne des individus observés en migration active. Cela n'est pas étonnant, étant donné le faible nombre de couples limousins et l'absence de populations nicheuses plus au Nord.

En 2004, un groupe de 10 oiseaux est repéré le 15/10 à Argenta (19-TeuJ). Cette observation constitue la mention la plus tardive. L'année suivante, c'est le 08/10/05 que les 2 dernières Hirondelles de rochers sont observées à Evaux-les-Bains (23-VirA). Contrairement aux autres espèces d'hirondelles, qui hivernent en Afrique tropicale, elle hiverne dans le bassin méditerranéen et notamment dans le Sud de la France. De fait, elle peut être observée jusqu'en novembre dans notre région.

En 2005, les 2 premières sont signalées le 12/03 à Soursac (19-BarJ), tandis qu'en 2006 un oiseau est noté dès le 13/02 à Neuville (19-GfE).

Une seule donnée de reproduction est rapportée : des adultes au nid le 03/05/06 à Beynat (19-MarP). Des cas probables de reproduction sont relevés sur les communes de Sérandon (19-BarJ), Saint-Martin-la-Méanne (19-CavP), Bort-les-Orgues (19-CavP et NorT), Ligniac (19-CavP), Evaux-les-Bains (23-VirA), Aubusson (23-PalG et BouP), et enfin Saint-Julien-le-Petit, en Haute-Vienne, où des nicheurs sont à nouveau présents en 2005 (87-VirA). Les indices relevés sont généralement l'observation de couples, ou d'individus construisant un nid. Le groupe le plus important est noté le 12/10/04 à Bort-les-Orgues avec 20 individus (19-BarJ).

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

● Bien que présente une partie de l'année seulement, l'espèce fait partie des oiseaux communs de notre région, et fait l'objet de très nombreuses données (n=3 237).

En 2004, l'espèce est encore largement observée pendant tout le mois d'octobre, notamment sur les sites suivis pour la migration. La toute dernière est signalée le 27/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-NauD). En 2005, les observations se font rares après la mi-octobre. La dernière migratrice est observée le 24/10/05 à Flavignac (87-PreP). Chaque année, l'observation de la première hirondelle, annonciatrice du printemps, est l'objet d'une petite compétition entre les observateurs. Deux haut-viennois se partagent la palme le 12/03/05, avec 2 individus notées à Saint-Martin-le-Vieux (87-Pral) et 1 ind. à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). L'espèce est signalée dès le lendemain en Corrèze, à Lissac-sur-Couze (19-GauR), et il faut attendre le 16/03/05 pour que 3 individus soient observés en Creuse, à Saint-Priest-la-Feuille (23-GueK). L'année suivante, c'est en Corrèze que l'espèce apparaît en premier, avec 1 individu le 08/03/06 à Sarroux (19-BesM), tandis que la première donnée creusoise est du 13/03/06 à Lussat (23-DesN).

Des rassemblements importants ont lieu en période de migration prénuptiale et postnuptiale, souvent sur les étangs riches en nourriture. Des effectifs importants sont régulièrement présents à l'étang de Landes atteignant 500 individus le 16/04/06 (23-DubG). Le plus gros rassemblement est de 530 individus le 26/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

La reproduction est logiquement notée sur l'ensemble de la région. Un nid occupé est signalé dès le 04/04/06 à Saint-Pierre-de-Fursac (23-GauR). Des poussins sont encore bagués au nid le 04/09/05 à Mautes (23-LerJ). Ces dates témoignent de l'amplitude de la période de reproduction. Notons un cas de nidification sous un pont, découvert le 05/07/05 à Lavaufranche (23-NorT). Enfin, pour l'anecdote, un mâle avec deux plumes blanches sur les couvertures de l'aile gauche est observé le 10/04/05 à Roziers-Saint-Georges (87-MorS).



Hirondelle rustique, Chaillac-sur-Vienne (87), mai 2005 (Raphaël Bussi re)

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

● La migration postnuptiale s'étend d'août à mi-octobre. En 2004, la dernière observation a lieu le 18/10, avec 9 individus en migration à Flavignac (87-PreP). La migration postnuptiale 2005 se termine le 22/10 par l'observation d'une migratrice à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Comme pour l'Hirondelle rustique, les périodes de migration peuvent donner lieu à d'importants rassemblements. L'effectif maximum est relevé le 24/09/05, avec 350 individus posés sur des fils électriques à Dournazac (87-CouC).

Les retours sont classiquement notés aux alentours de la mi-mars. En 2005, le premier oiseau est découvert le 20/03 à Seilhac (19-SouPi). En 2006, c'est le 19/03 que se montre le premier individu à Ambazac (87-LanJ).

Le premier nid occupé est découvert le 07/04/05 à Ahun (23-RobS). Des adultes nourrissent dès le 09/05/05 à Saint-Viance (19-CreD). Enfin, un jeune tardif est encore observé au nid le 26/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Plusieurs colonies, allant de quelques couples à plus d'une trentaine, sont signalées. Notons ainsi une colonie de 34 nids le 19/05/06 à Jourgnac (87-HubP). Des rassemblements peuvent être observés à proximité des colonies. Ainsi, 178 hirondelles chassaient au-dessus de la Dordogne le 11/07/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP).



MOTACILLIDÉS

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

● Des oiseaux en migration active sont vus entre août et octobre, avec pour les extrêmes :

- 2 ind. le 28/04/04 à Flavignac (87-PreP) et 2 ind. le 19/08/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),

- 1 le 10/10/04 à Flavignac (87-PreP) et 1 ind. le 16/10/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Au printemps, un groupe de 203 individus en migration est recensé le 17/03/06 à Flavignac (NauD).

Le chant de ce pipit se fait entendre dès le 28/03/05 à Ajain (23-NorT) et le 26/03/06 à Cieux (87-RogJ). Des transports de nourriture sont aperçus le 17/06/05 à Cieux (87-BouH), le 18/05/06 à Saint-Martial-sur-Isop (87-LabB) et encore le 15/07/06 à Palazinges (19-MarP).

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

● C'est la migration postnuptiale qui fournit le plus de citations pour cette espèce. Les premiers groupes sont observés fin août : 12 ind. le 21/08/04 à Saint-Merd-les-Oussines (19-EyrO) et 10 ind. le 13/08/04 sur la même commune (19-Sepol). Mais la migration bat son plein en octobre. En 2004, plusieurs vols de plus d'une centaine d'individus sont observés ; notamment 1 000 ind. le 13/10/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO), 200 ind. le 16/10/04 à Saint-Auvent (87-ChaG), 134 ind. le 24/10/04 à Moissanes (87-BarJ). Curieusement, l'année 2005 ne fournit aucun groupe dépassant la centaine avec pour maximum 80 ind. le 20/11/05 à Gorre (87-NauD).

L'hivernage s'observe dans les trois départements, avec quelques rassemblements remarquables : 100 ind. le 11/12/04 à Château-Chervix (87-MorS), 100 ind. le 01/01/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), 50 ind. le 18/12/05 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-DouA) et 50 ind. le 19/02/06 à Saint-Pardoux (87-SotJ).

La migration prénuptiale est beaucoup moins marquée. Citons 23 ind. le 10/03/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 50 ind. le 17/04/05 à Laroche-près-Feyt (19-DouA), 24 ind. le 12/03/06 à Saint-Sylvestre (87-LanJ), 80 ind. le 07/04/06 à Flavignac (87-LabB).

Les indices de reproduction proviennent uniquement du plateau de Millevaches et principalement au Moulin de Chabannes à Saint-Merd-les-Oussines avec des chanteurs simultanés le 09/05/06 et encore le 04/07/06 (19-Sepol). Côte Creuse, deux chanteurs simultanés ont également été entendus le 20/05/06 à Saint-Pardoux-Mortierolles (23-BouP). Les groupes observés en août sur le plateau correspondent peut-être donc à des rassemblements d'oiseaux locaux, avant la réelle migration d'automne.

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

● C'est pour nous le « pipit d'hiver », la plupart du temps détecté près des étangs, des lacs et autres milieux humides. Les plus précoces sont observés le 07/11/04 à Ligniac (19-BarJ) et le 05/11/05 à Aubazine (19-MarP), et les plus tardifs le 21/04/05 à Lizières (23-MerC) et le 23/03/06 à Saint-Mathieu (87-HubP). Les rassemblements les plus importants concernent 100 ind. le 03/03/06 à Dompierre-les-Eglises (87-CreN), 60 ind. le 31/12/04 à l'étang de Landes (23-ChaG) et 50 ind. le 03/03/06 à Magnac-Laval (87-CreN).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

● En route vers le sud, 20 ind. sont vus le 21/08/04 et 20 ind. le 13/08/05 à l'étang de Landes (23-DubG). Les groupes les plus importants rassemblent 57 ind. le 12/10/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 100 ind. le 24/08/05 à l'étang de Landes (23-NorT) et 100 ind. le 02/09/05 à Saint-Martin-le-Mault (87-MerC).

Les premiers migrateurs de printemps sont enregistrés avec l'observation d'un individu le 15/03/05 à Aubazine (19-MarP) et le 01/04/06 à Saint-Bonnet-Briance (87-MorS et al.).

La reproduction est suspectée à plusieurs endroits où des individus sont vus tardivement :

- le 21/05/05 à Mailhac (87-PreP),
- le 29/05/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- le 27/06/05 et le 27/05/06 à Leyrat (23-NorT),
- le 07/07/05 à Lussat (23-DubG),
- le 13/06/06 à Solignac (87-HipS).

Bergeronnette printanière d'Italie (*Motacilla flava cinereocapilla*)

- Un individu est observé le 06/05/05 à l'étang de Landes (23-SotJ).

Bergeronnette printanière flavéole (*Motacilla flava flavissima*)

- Cinq mentions, uniquement lors de la migration pré-nuptiale pour cette sous-espèce britannique :


- 1 ind. le 12/04/05 à l'étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 21/04/05 à Lizières (23-MerC),
- 1 ind. le 26/04/05 à Neuvic (19-BarJ),
- 1 ind. le 14/04/06 à l'étang de Landes (23-VirA),
- 3 ind. le 17/04/06 à Oradour-sur-Glane (87-GenC).

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

- La migration débute avec 1 ind. le 02/10/04 et 7 ind. le 25/09/05 à Flavignac (87-PreP), et est encore observée avec 26 ind. le 24/10/04 à Albussac (19-ChJe) et 4 ind. le 20/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En hiver, l'espèce est généralement vue à l'unité mais signalons un regroupement en dortoir de 7 ind. le 28/12/04 aux Cars (87-CouC) et 6 ind. le 10/12/05 au Palais-sur-Vienne (87-LanJ).

Les premiers chants sont entendus le 10/04/05 à Saint-Sétier (19-DouA) et le 24/02/06 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Six poussins sont nourris le 13/04/05 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP) et les parents ravitaillent aussi le 29/04/06 à Meymac (19-DouA). Des nids contiennent encore des œufs lors de la première décade de mai et des jeunes jusqu'à la deuxième décade de ce mois (cf. graphique).



Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

Des premiers vols en direction du sud : 2 ind. le 25/09/04 et 15 ind. le 01/10/05 à Flavignac (87-PreP). Des bergeronnettes passent encore le 31/10/04 à Saint-Loup (23-DubG) et le 06/11/05 à Flavignac (87-NauD). Les journées « record » sont le 17/10/04 avec près de 320 ind. et le 23/10/05 avec plus de 270 ind. (87-PreP).

En hiver, quelques rassemblements importants : 70 ind. le 05/11/04 à Oradour-sur-Glane (87-NauD), 60 ind. le 05/12/04 à Saint-Robert (19-GauR), 60 ind. le 03/02/05 à Guéret (23-RobS) et 53 ind. le 09/12/05 à Cieux (87-NauD).

Un chanteur se fait entendre le 20/03/05 à Limoges (87-VirA) et le 01/04/06 à Châteauneuf-la-Forêt (87-MorS). Un nid contient 5 œufs le 20/04/05 à Lavaufanche (23-NorT) et un autre avec 6 œufs le 05/05/05 à Flavignac (87-PreP). Les naissances sont prouvées avec un transport de nourriture le 10/04/05 à Flavignac (87-LabB) et le 01/05/06 à Glanges (87-MorS). Des jeunes sont sortis le 09/05/05 à Saint-Junien (87-DouA) et le 12/05/06 à Limoges (87-VirA).

Un regroupement postnuptial de 292 ind. est dénombré le 30/08/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP).



Bergeronnette grise, Budelière (23), mars 2006 (Pascal Duboc)

Bergeronnette de Yarrell (*Motacilla alba yarrellii*)

Cette sous-espèce britannique est peu fréquente en Limousin et il s'agit d'individus hivernants isolés, avec trois mentions pour l'hiver 2006 uniquement :

- le 15/01/06 à Magnac-Laval (87-CavP),
- le 08/03/06 à Neuville (19-GfeE),
- le 11/03/06 à Soursac (19-GfeE).

BOMBYCILLIDÉS

Jaseur boréal (*Bombycilla garrulus*)

● Dans le contexte d'un afflux exceptionnel de l'espèce en France lors de l'hiver 2004-2005, le Limousin a aussi accueilli l'espèce avec 4 données pour un total de 13 individus :

- 9 ind. mangeant du gui le 01/03/05 à Châlus (87-CouC),
- 2 ind. mangeant des pommes le 02/03/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- 1 ind. le 04/03/05 à Ambrugeat (19-PaiE),
- 1 ind. en vol le 11/03/05 à Neuville (GfeE).

L'afflux de l'espèce en France s'est étalé d'octobre 2004 à juillet 2005, et concernait plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux (Paul et Oliosio 2006). Les jaseurs ont surtout été contactés dans la moitié Est du pays. S'il est probable que d'autres individus aient atteint le Limousin, la région n'a cependant pas connu d'afflux massif comme en Auvergne par exemple. Les observations limousines sont datées de début mars, ce qui correspond globalement au pic d'extension vers l'Ouest des jaseurs cet hiver là.

Paul J.-P. et Oliosio G., 2006. Afflux mémorable de Jaseurs boréaux *Bombycilla garrulus* en France dans l'hiver 2004-2005. *Ornithos* 13-1 : 2-11.

CINCLIDÉS

Cincle plongeur (*Cinclus cinclus*)

● L'espèce est observée sur plusieurs rivières de la région durant l'automne et l'hiver 2004/2005 avec 1 ou 2 oiseaux. Par exemple sur la Vienne à Saint-Junien le 10/09/04 (87-DouA), à Aix-sur-Vienne le 03/12/04 (87-PreP), à Limoges le 01/01/05 (87-GauR). En Corrèze notamment à Châteaux le 11/12/04 (87-GauR), à Lissac sur Couze où 2 ind. sont signalés le 19/12/04 (19-FauB) et à Voutezac le 16/01/05. Pour la période automnale 2005 et l'hiver 2005/2006, beaucoup de données en provenance des 3 départements avec une répartition assez homogène des observations.

Reproduction : 50 données de nidification certaine ont été répertoriées sur 2005 et 2006. La progression de ces observations est due à l'enquête cincle que la SEPOL a lancé en fin d'année 2004. Le cincle niche précocement. Les constructions de nid et les couvaisons peuvent débuter en février, avec notamment un nid en construction noté le 27/02/05 à Donzenac (19-CorP).

En Creuse, les sites de reproduction de la montagne limousine sont confirmés avec notamment l'observation d'un nourrissage de jeunes le 08/05/05 à Faux-la-Montagne (23-MorS) et un nid occupé le 08/04/06 à la cascade des Jarrauds, commune de Saint-Martin-Château (23-MorS). Sur l'est du département, un nid avec des jeunes prêts à l'envol est découvert le 01/06/05 dans les gorges de la Voueize (23-DubP) et, le même jour, des adultes nourrissent des jeunes à Fontanières (23-DubP). Au nord-ouest du département, des jeunes sont nourris le 04/05/05 sur la commune de Bétête (23-PioJ).

Pour la Corrèze, 32 nidifications certaines sont relevées dont la plus précoce est notée 19/02/06 à Donzenac avec la découverte d'un nid fraîchement détruit (19-CorP). Tous les sites traditionnels du plateau sont occupés.

En Haute-Vienne, 8 nidifications certaines sont trouvées avec, en particulier, un nid garni de 6 jeunes le 16/04/05 à Flavignac (87-PreP). Une nidification tardive est découverte avec des jeunes volants le 21/07/05 à Coussac-Bonneval (87-BurJ).

Les données, bien que plus nombreuses que les années précédentes, restent trop éparses pour donner une idée précise de la situation des populations.

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

On peut l'entendre chanter toute l'année, avec des reprises de chants à l'automne, le 29/09/04 à Eymoutiers (87-RogJ) et le 09/10/05 à la Roche-l'Abeille (87-DumA).

Les premiers transports de matériaux sont décelés le 28/03/05 à Lupersat (23-ColD) et le 25/03/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Des nids avec œufs sont découverts le 29/04/05 à Lupersat (23-ColD) et le 07/05/06 à la Chapelle-Montbrandeix (87-LabB et al.). Six œufs n'ont pas encore éclos le 27/05/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP), et un nid est encore garni le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Des jeunes sont au nid le 05/05/05 à Lupersat (23-ColD) et une famille est sortie le 30/05/05 à Bessines-sur-Gartempe (87-GauR). Quelques lieux adoptés pour la nidification :

- un nid d'hirondelle rustique le 26/05/06 à Eygurande (19-DouA),
- sous un pont le 03/04/05 à Saint-Bonnet-la-Rivière (19-CreD),
- dans un parasol le 25/03/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).



Troglodyte mignon, Tulle (19), février 2009 (Pierre Soulier)

PRUNELLIDÉS

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

● Après la période de reproduction, les chants reprennent le 13/09/04 à Limoges (87-HubP) et le 03/10/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Ils continuent même au cours de l'hiver, le 01/12/04 et le 12/12/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et deviennent plus fréquents en janvier-février.

Un nid garni est découvert le 19/03/05 à Peyrilhac (87-BouP), un autre contient encore des œufs le 01/06/05 à Sannat (23-DubP) et des adultes transportent de la nourriture le 21/03/06 à Aubazine (19-MarP) et le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Des jeunes sont volants le 04/06/05 à Limoges (87-GauR) et le 12/05/06 à Flavignac (87-LabB).

Accenteur alpin (*Prunella collaris*)

● Trois données pour ce montagnard hivernant occasionnellement chez nous, seulement au barrage de l'Aigle : 1 ind. le 29/01/05 (19-BarJ), 2 ind. le 18/12/05 (19-ChaJp) et 1 ind. le 07/01/06 (19-BouH).

TURDIDÉS

Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)

● Cette espèce est présente toute l'année. En hiver, l'oiseau devient familier. Il fréquente les mangeoires et s'approche de l'homme : 1 ind. vient manger dans la main le 19/01/05 à Nieul (87-RouA).

Malgré de nombreuses citations ($n > 3000$), l'espèce est considérée nicheuse certaine seulement 32 fois. Le premier nid contenant des œufs est découvert le 19/03/05 à Peyrilhac (87-BouP). Le premier transport de nourriture est constaté le 06/05/05 à Chateaux (19-GauR) et le 26/04/06 à Beynat (19-MarP). Le premier jeune volant est observé le 23/05/05 à Masseret (19-GauR), et le 25/05/06 à Guéret (23-RobS). Enfin, le dernier jeune volant pour l'année est noté le 10/07/05 à Cublac (19-GauR) et le 26/07/06 à Saint-Sétières (19-BouH).



Rougegorge familier, Chaillac-sur-Vienne (87), mai 2005 (Raphaël Bussière)

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

Les derniers contacts sont un ind. contacté le 22/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et un autre posé sur un fil téléphonique le 11/09/05 à Mourioux-Vieilleville (23-SotJ).

Les premiers chants sont entendus le 04/04/05 au Dorat (87-CavP) et le 02/04/06 à Lagraulière (19-ChaJ).

L'espèce est trouvée nicheuse à 5 reprises :

- 1 nid garni avec 1 œuf le 08/05/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 2 nids avec 2 et 4 œufs découverts le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 transport de nourriture le 17/04/06 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 jeune non volant le 24/06/06 à Cublac (19-GauR).

Les STOC-EPS fournissent 72 % des citations pour cette espèce, qui est absente de la montagne limousine.

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)

Une seule citation avec l'observation d'un individu le 02/04/06 à Saint-Hilaire-Peyroux (19-ReyA), en période de migration pré-nuptiale.

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochrurus*)

● Cette espèce est présente en Limousin tout au long de l'année, mais moins de 2% des observations (n=1450) sont réalisées entre le 1^{er} décembre et la mi-février. Les oiseaux hivernent essentiellement à l'ouest et au sud de la région. Cependant, quatre citations dérogent à cette règle :

- 1 mâle le 29/01/05 à Soursac (19-BarJ),
- 1 ind. le 20/12/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP),
- 1 ind. le 28/12/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP),
- 1 ind. le 05/02/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP).

Les premiers chants sont entendus le 11/03/05 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA) et le 15/03/06 à Peyrilhac (87-BouP). Les premiers indices de nidification certaine sont un nid occupé le 29/04/05 à Saint-Amand-Magnazeix (87-GauR), et un transport de nourriture le 17/04/06 à Saint-Basile-de-la-Roche (CorA). Les dernières observations relatives à la reproduction sont le nourrissage d'un jeune le 28/07/05 à Saint-Robert (19-GauR) et un nichoir toujours occupé le 05/08/06 à Naves (19-ChaJm). On notera une seconde couvée le 14/07/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP).



Rougequeue noir, Chaillac-sur-Vienne (87), juillet 2004 (Raphaël Bussi re)

Rougequeue   front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

● Les derniers oiseaux sont observ s le 25/10/04   Flavignac (87-PreP) et le 09/09/05   Limoges (87-VirA). Les premi res mentions sont un chanteur le 28/03/05   Billac (19-GauR) et 3 ind. pos s le 29/03/06   Limoges (87-VirA).

Les premiers nourrissages sont constat s le 31/05/05   Aix-sur-Vienne (87-PreP) et le 05/05/06   Oradour-Saint-Gen s (87-CavP). On notera un transport de nourriture tardif le 22/07/06   Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).   Limoges, un nichoir est occup  les 2 ann es. En 2005, il voit 4 jeunes   l'envol le 11/06/05 (87-VirA) et deux pontes successives sont constat es en 2006 avec 5 jeunes pour le premier envol le 29/05/06, et un second envol le 04/07/06 (87-VirA).

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

Les premières observations postnuptiales concernent 2 oiseaux notés le 16/08/04 à Flavignac (87-PreP), et 1 le 13/08/05 à Saint-Merd-les-Oussines (19-ProP). La période postnuptiale se termine avec 1 ind. le 20/10/05 à Flavignac (87-PreP) et le 26/09/06 à Limoges (VirA). Les groupes les plus importants sont 7 ind. le 30/08/04 à Flavignac (87-PreP) et le 09/09/04 à Fontanières (23-DupE), puis 9 ind. le 20/08/05 à Flavignac (87-PreP).

Les premiers contacts printaniers sont décelés dans la dernière décade d'avril, avec notamment l'observation d'un oiseau le 23/04/05 à Monceaux-sur-Dordogne (19-NorT) et le 25/03/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-BusR).

En période de reproduction, des familles sont observées le 30/06/06 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SegC et *al.*), ainsi qu'une famille de 5 ind. le 04/07/06 à Tarnac (19-BouH). Hors plateau de Millevaches où se concentre l'essentiel des nicheurs, l'espèce a été contactée une dizaine de fois.



Tarier des prés, Chaillac-sur-Vienne (87), avril 2006 (Raphaël Bussière)

Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*)

Les mois de novembre à février regroupent 7,5 % des citations ($n = 1194$), essentiellement localisées dans l'ouest de la région. Un groupe de 3 individus est observé le 24/12/05 à Videix (87-BusR), et 1 ind. le 11/12/05 à Flavignac (87-PreP). Pour déroger à la règle, 1 ind. est présent le 21/11/04 à Mourioux-Vieilleville (23-SotJ).

Un chanteur est entendu dès le 11/01/05 à Ambazac (87-LanJ). Plus généralement, les premiers chanteurs se font entendre en mars : 2 chants simultanés le 17/03/05 à Flavignac (87-LabB), 1 chanteur le 16/03/06 à Nexon (87-DumA). On constate des transports de nourriture le 17/04/05 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-PreP) et le 27/04/06 à La Geneytouse (87-FleL). Les premières familles sont observées le 06/05/05 à Rougnat (23-Sepol) et le 15/05/06 à Beynat (19-MarP). Parmi les nicheurs tardifs, on notera un transport de nourriture le 10/07/05 à Cublac (19-GauR), ainsi que le nourrissage d'un jeune le 08/08/06 à Royère-de-Vassivière (23-MorS).

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

● La migration postnuptiale débute par des citations d'oiseaux vus à l'unité, avec notamment le 16/08/04 à Flavignac (87-PreP) et le 15/08/05 à Peyrelevade (19-ProP). Les groupes les plus importants sont de 7 ind. le 13/09/04 à Evaux-les-Bains (23-DupE) et de 13 ind. le 18/09/05 à Flavignac (87-PreP). Les derniers migrateurs sont notés à l'unité le 22/10/04 à Flavignac (87-EyrO) et à Gentioux-Pigerolles (23-RogJ), puis le 26/10/05 à Flavignac (87-PreP).

Le premier migrateur pré-nuptial pour 2005 est celle d'un oiseau posé sur une clôture le 15/03 à Flavignac (87-PreP). L'année suivante, il est observé le 20/02/06 à Saint-Gence (87-GueK). Les groupes les plus importants sont de 4 ind. le 01/05/05 à Blond (87-BouH) et le 07/05/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK), et, l'année suivante, 5 ind. posés sur une clôture le 13/05/06 à Palazinges (19-MarP). Pour la migration pré-nuptiale, les derniers oiseaux sont observés le 29/05/05 à Oradour-sur-Glane (87-GenC) et le 15/05/06 à Gorre (87-CouC).

Aucune observation n'est mentionnée en dehors des périodes migratoires.

Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

● Cette espèce est observée lors de ses migrations.

Lors des passages vers ses quartiers d'hivernage, l'espèce est observée à 4 reprises :

- 3 ind. le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 3 ind. le 18/10/04 à La Jonchère-Saint-Maurice (87-DesF),
- 1 ind. le 05/11/05 à Tarnac (19-DouA),

et une donnée remarquable d'un individu posé sur un fil, peut-être un hivernant, le 06/01/06 à Chamboulive (19-BesM).

En migration pré-nuptiale, l'espèce est contactée à 3 reprises :

- 1 ind. le 17/04/05 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT),
- 7 ind. le 23/04/05 à Meymac (19-DupE et BusR),
- 1 ind. le 31/03/06 à La-Roche-l'Abeille (87-LabA).

Merle noir (*Turdus merula*)

● Pour l'année 2004, seulement 5 mentions concernent des oiseaux en migration postnuptiale active avec notamment un groupe de 8 ind. les 17/10 et 24/10/04 à Moissannes (87-BarJ). En 2006, le suivi de la migration voit le passage de 38 ind. les 15/10 et 16/10/06 à Flavignac (87-PreP).

Des chants sont entendus tous les mois de l'année. Le premier en 2005 est entendu le 01/01 à Limoges (87-HubP). En 2006, un oiseau chante dès le 15/01/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Les premières nidifications concernent 2 nids avec 3 et 4 oeufs découverts le 30/03/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). L'année suivante, un nid est occupé le 18/03/06 à Guéret (23-RobS), et un jeune non émancipé est découvert le 18/03/06 à Ajain (23-NorT). Les données tardives concernent le nourrissage de

3 jeunes le 07/08/05 à Ambazac (87-LanJ), ainsi qu'un nid garni le 31/07/06 sur cette même commune (87-LanJ). Les cas de nidification font l'objet de 147 citations en 2005 et 127 en 2006. La taille des pontes varie de 3 à 5 œufs, celle des nichées de 3 à 4 poussins.

Le maximum d'oiseaux observés ensemble en un même lieu est de 22 ind. le 05/03/06 à Glandon (87-CelJ et al.). Un cas d'albinisme est mentionné le 13/04/06 à Puy-Malsignat (23-LibC). Des cas d'albinisme partiel sont également notés le 02/05/06 à Glandon (87-LanJ) et le 26/05/06 à Limoges (87-HubP). Du 21/11/04 au 31/07/06, un observateur a comptabilisé à lui seul en Haute-Vienne 27 individus tués suite à un choc avec un véhicule (87-LanJ).



Merle noir, Chaillac-sur-Vienne (87), décembre 2005 (Raphaël Bussière)

Grive litorne (*Turdus pilaris*)

● Les premiers passages concernent 7 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-EyrO et al.) et le 10/10/06 à Aubazine (19-MarP).

De mi-novembre 2004 à fin février 2005, l'espèce fait l'objet de 100 citations. L'effectif le plus élevé est signalé le 05/02/05 à Laurière (87-VinS), avec l'observation de 300 oiseaux. De mi-novembre 2005 à fin février 2006, l'espèce est citée 99 fois. L'effectif le plus élevé est à nouveau de 300 oiseaux notés le 06/01/06 à Saint-Ybard (19-MorS). Les données les plus tardives sont 2 ind. notés le 13/04/05 à Boussac-Bourg (23-NorT) et 15 ind. en migration vers le Nord le 25/03/06 à Flavignac (87-LabB).

Les deux groupes les plus importants comprennent 500 ind. le 10/03/05 à Châlus (87-CouC) et 400 en migration le 04/03/05 à Limoges (87-MerC).

Grive musicienne (*Turdus philomelos*)

● La migration postnuptiale débute par l'observation de 5 vols totalisant 17 ind. le 02/10/04 à Flavignac (87-PreP), et 1 ind. le 01/10/05 sur la même commune (87-PreP). Les vols les plus importants regroupent 64 ind. le 17/10/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et 48 ind. le 11/10/05 à Flavignac (87-VirA).

En hivernage, un groupe réunit 40 ind. au dortoir le 24/12/04 à Cieux (87-VirA).

En migration prénuptiale, le groupe le plus important compte 100 ind. en migration active le 11/03/06 à Flavignac (87-LabB). La migration se termine par l'observation de 7 ind. en halte le 13/03/05 à Limoges (87-VirA), ainsi que 17 ind. se dirigeant vers le nord le 18/03/06 à Oradour-sur-Glane (87-NauD).

Un chanteur est entendu dès le 02/12/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), les suivants étant entendus le 08/01/05 à Meuzac (19-BurJ) et le 17/01/06 à Ussac (19-CoqM). Les cas de nidification certaine débutent par la découverte d'un nid dans un houx garni de 4 œufs le 09/04/05 à Flavignac (87-PreP), ainsi qu'un transport de nourriture le 08/05/06 à Ambazac (87-LanJ). La période de reproduction se termine par des transports de nourriture le 15/06/05 à Lépaud (23-DubP) et le 25/06/06 à Lussat (23-BusR).

La Grive musicienne montre ses talents d'imitatrice en contrefaisant le Merle noir, le Pic épeichette, la Buse variable, la Sittelle torchepot, le Choucas des tours, le Rougegorge familier, et diverses mésanges le 24/05/06 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-VirA), ou encore la Caille des blés le 14/06/06 à Sauviat-sur-Vige (HubP).

Grive mauvis (*Turdus iliacus*)

● La migration automnale débute le 13/10/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO) et le 06/10/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK). Les derniers vols sont de 8 ind. le 01/11/04 à Flavignac (87-PreP), et 2 ind. en migration nocturne le 09/12/05 à Bessines-sur-Gartempe (87-VirA).

Seulement 5 groupes atteignent ou dépassent la centaine d'oiseaux :

- 100 ind. le 17/02/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- 100 ind. le 19/02/06 à Branceilles (19-Blal),
- 300 ind. en vol vers le Nord le 06/03/06 à Oradour-sur-Glane (87-NauD),
- 100 ind. le 16/03/06 à Pionnat (23-NorT),
- 200 ind. le 17/03/06 à Sainte-Feyre (23-NorT).

La période d'hivernage se termine avec l'observation d'un oiseau vu en vol le 03/04/05 à Mézières-sur-Issoire (87-DouA), et par l'observation de 10 ind. posés dans un pré le 23/03/06 à Séréilhac (87-HubP).

Grive draine (*Turdus viscivorus*)

• Les premières données en migration postnuptiale concernent 2 ind. en migration active le 29/09/04 et le 25/09/05 à Flavignac (87-PreP). Une seule citation chiffrée en migration prénuptiale : 4 ind. pour la journée du 13/03/05 à Flavignac (87-PreP). En période migratoire, les effectifs maximaux relevés sont de 35 ind. le 08/10/04 à Saint-Goussaud (23-EyrO) et de 22 ind. le 06/03/05 à Isle (87-BasP).

Pour cette espèce citée toute l'année, les premiers chants sont entendus le 19/12/04 à Montgibaud (87-MorS), et le 20/12/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Les premiers cas de nidification certaine sont des transports de nourriture le 04/05/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et le 24/04/06 à Meymac (19-BouH). Les derniers indices de reproduction sont un transport de nourriture le 15/06/05 à Lépaud (23-DubP) et le nourrissage d'un jeune le 23/07/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Hors période migratoire, c'est en août que sont observés les groupes les plus importants : 20 ind. le 16/08/05 à Saint-Merd-les-Oussines (19-ProP) et 25 ind. posés dans un pré le 11/08/06 à Palazinges (19-MarP).



SYLVIIDÉS

Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)

• Espèce rare de l'avifaune limousine. Deux individus sont observés le 08/10/05 à l'étang de Landes (23-VirA) et un mâle chanteur isolé est entendu le 14/01/06 à l'étang de la Ganetorte (19-BesM).

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)

• L'espèce est sporadique. Elle est surtout contactée dans l'Ouest de la Haute-Vienne (68% des citations), et en période internuptiale (68% des citations). L'éclosion de deux poussins est constatée le 14/08/06 à l'étang de la Ramade (23-LerT). Cette donnée constitue le seul indice certain de reproduction. Malheureusement, la nichée sera détruite quinze jours plus tard, piétinée par des bovins.

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)

• Les observations s'étalent de mi-avril à début juillet. Les premiers migrants sont de retour le 10/04/06 à Boussac-Bourg (23-NorT) et se signalent par leur chant. Des chants simultanés sont entendus le 26/06/05 à la lande de la Flotte à Château-Chervix (87-Sepol), mais la reproduction certaine n'est pas prouvée. Un individu est bagué le 03/07/05 à Leyrat (23-LerJ).

Locustelle lusciniöide (*Locustella luscinioides*)

● Une seule observation : un individu en halte migratoire le 09/04/06 à Bussière-Boffy fait entendre son phrasé à de fins connaisseurs (87-DouA).

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

● Deux observations concernent des individus en halte migratoire dont un trouvé mort le 10/08/06 à Isle (87-BouP). Deux autres observations proviennent de l'étang de Landes où un couple est observé le 05/06/06 (23-PalG).

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

● Un individu est encore observé en halte migratoire le 18/10/04 à Limoges (87-MerC). Les premiers migrateurs sont entendus le 21/04/04 à Treignac (19-DouA) et le 10/04/05 à Azat-le-Ris (87-CavP). Les mois d'avril et mai fournissent l'essentiel des observations avec des individus chantant en halte migratoire. Les seuls reproducteurs probables sont observés dans les roselières de l'étang de Landes.

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

● Le dernier individu est noté le 22/08/05 à Lussat (23-DubG). Retours classiques en avril, dès le 06/04/06 à Bessines-sur-Gartempe (87-SotJ). La reproduction certaine n'échappe cependant pas à quelques sépoliens qui observent transports de nourritures et jeunes volants de juin à août sur 12 communes de Haute-Vienne, 1 de Creuse et 1 de Corrèze. L'espèce peut se montrer belliqueuse comme cet individu poursuivant une femelle Pie-grièche écorcheur le 20/06/06 à Vars-sur-Roseix (19-CreD).



Hypolaïs polyglotte, Evaux-les-Bains (23), juillet 2006 (Pascal Duboc)

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

Les derniers chants sont entendus le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA) et le 02/09/05 à Ambazac (87-LanJ). L'hivernage est rare (cf. tableau). Signalons cet individu se nourrissant de pommes pourries en compagnie de merles noirs et de grives musiciennes le 12/12/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) ou encore ce maximum de trois individus fréquentant une mangeoire le 18/02/05 à Objat (19-LafJ). Les premiers chants sont notés le 13/03/05 à Peyrilhac (87-BouP) et le 14/03/06 à Voutezac (19-FacP). La première parade est observée le 08/04/06 à Peyrat-le-Château (87-BouP). D'après les données de Patrick Précigout et al., l'espèce choisit toute sorte de support végétal entre 30 cm et 2 m pour nicher : aubépine, buis, chèvrefeuille, épine noire, laurier, ronce, troène... Parmi les nombreux indices de reproduction, citons le premier nid garni trouvé le 12/04/05 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), avec des jeunes volants dès le 18/05/05 (PreP).

Nombre de citations de Fauvette à tête noire en période hivernale en Limousin (total sur la période 2004-2006)

	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars
Corrèze	6	5	0	1	2	3	25
Creuse	2	1	0	2	0	1	9
Haute-Vienne	25	6	1	2	1	3	44
TOTAL	33	12	1	5	3	7	78

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

La dispersion postnuptiale est bien difficile à mettre en évidence. Très peu d'observations en août ; la plus tardive étant datée le 20/08/05 à Guéret (23-RobS). Les premières mentions printanières se concentrent sur la 2^{ième} décade d'avril, avec notamment le 10/04/05 à Azat-le-Ris et au Dorat (87-CavP). En revanche, celle observée le 18/03/06 à Ajain (23-NorT) est bien précoce. La majorité des données recueillies porte sur l'écoute de mâles chanteurs. Quelques indices de reproduction sont signalés comme ce transport de nourriture ou de sacs fécaux le 31/05/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et ces jeunes fraîchement envolés le 01/06/05 à Palazinges (19-MarP).

Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

● Derniers individus notés le 14/10/04 à Limoges (87-EyrO) et le 02/09/05 à Flavignac où des jeunes sont encore nourris (87-PreP). Les retours sont classiques début avril, avec les premiers chants entendus le 04/04/05 à Flavignac (87-Pral) et le 01/04/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). L'espèce semble commune à l'échelle régionale, mais seulement 14 indices de reproduction certaine sont rapportés. Les premiers transports de nourriture sont constatés le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-CavP), Fontanières et Sannat (23-DubP) et le 28/05/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Des jeunes volants sont observés à partir du 23/07/06 à Palazinges (19-MarP). L'espèce se laisse prendre lors des sessions de bagage organisées en juin et juillet 2005 à Leyrat (LerJ).

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)

● Seulement 3 citations (contre 29 pour la centrale 2002-2004). Un individu est entendu le 20/11/04 à la Butte de Frochet à Bussière-Boffy (87-DouA), et un autre le 31/10/05 et le 28/12/05 à Folles (87-VinS).

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)

● Cette espèce héliophile affectionne les zones de basse altitude de l'Ouest limousin, fréquentant landes et bois clairs. Les premiers chants sont entendus le 28/03/05 à Billac (19-GauR) et le 01/04/06 à Turenne (19-DauR) et Aubazine (19-MarP). Peu d'indices probants de reproduction à part ce transport de matériaux le 16/04/05 à Saint-Priest-sous-Aixe (87-VirA). Signalons la présence régulière de l'espèce à la tourbière des Dauges de Saint-Léger-la-Montagne (87), site remarquable pour la reproduction des quatre espèces de pouillots.

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)

● Aucune observation en période postnuptiale. Le retour des migrateurs est d'abord constaté sur la frange sud-ouest de la région, comme ce chanteur isolé le 03/04/05 à Saint-Cyr-la-Roche (19-CreD) et cet individu le 13/04/06 à Sainte-Fortunade (19-MarP). Les chants se généralisent ensuite dans l'ensemble de la région. Des parades sont observées le 19/05/06 à Saint-Marc-à-Loubaud (23-BouP) et le 03/06/06 à Jabreilles-Bordes (87-BouP). Un transport de nourriture est noté le 04/06/06 à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP).

Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*)

● Un mâle chanteur est entendu les 20/06/06 et 05/07/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-DouA). Il s'agit de la seconde mention limousine !

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

● L'espèce est encore bien présente un peu partout au cours de la deuxième quinzaine d'août. La migration a lieu en septembre-octobre avec notamment un individu noté en migration active le 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ), alors que les derniers chants sont entendus le 05/11/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-NauD) et le 10/11/05 à Ussac (19-CoqM). Peu de cas d'hivernage sont rapportés (cf. tableau). C'est en février que les premiers chants peuvent être entendus comme le 07/02/06 à Chaptelat (87-CoqM). Une montée en puissance du nombre de citations en mars signe une recolonisation de la région par l'Ouest alors que d'autres individus sont observés en halte migratoire. Espèce très commune, sa reproduction certaine a été peu mise en évidence. Citons des nids garnis trouvés le 06/05/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP), et un transport de nourriture le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP).

Nombre de citations de Pouillot véloce en période hivernale en Limousin (total sur la période 2004-2006)

	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars
Corrèze	6	10	1	0	0	1	56
Creuse	5	6	0	2	0	0	13
Haute-Vienne	29	15	9	3	3	3	83
TOTAL	40	31	10	5	3	4	152

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

● La très grande majorité des citations concerne des individus en migration prénuptiale. La migration postnuptiale est constatée le 04/09/05 à Bussière-Boffy (87-EyrO) et Limoges (87-VirA), puis le 07/09/04 à Ligniac (19-BarJ). Une dernière observation est faite le 11/09/05 au Pescher (19-Blal). L'espèce est de retour le 26/03/05 à Flavignac (87-PreP) et le 26/03/06 à Videix (87-BusR). Les chants entendus signalent surtout des individus en halte migratoire en avril-mai, les observations devenant rares par la suite. La reproduction est suspectée à Lépaud (23-DubP) et à la tourbière des Dauges de Saint-Léger-la-Montagne (87-TeuJ et al.).

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

● Bien que présente sur l'ensemble de la région, l'espèce est surtout contactée sur les zones d'altitude (Montagne limousine, Monts d'Ambazac) où les peuplements de résineux sont les plus nombreux. Deux groupes internuptiaux d'une dizaine d'individus sont notés le 21/11/05 à Saint-Pardoux (87-EyrO) et Châtelus-le-Marcheix (23-EyrO). Les premiers chants sont entendus le 08/01/05 à Limoges (87-HubP) et seulement le 18/03/06 à Ajain (23-NorT). Les premiers chants simultanés sont notés le 11/04/05 à Meymac (19-DouA) et le 22/04/06 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-DouA). La reproduction n'est pas prouvée.

Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapillus*)

● L'espèce est présente sur l'ensemble de la région. Il n'a pas été noté de groupes importants en période internuptiale. Le maximum est de 5 individus le 25/09/04 à Ambazac (87-LanJ). Les premiers chants sont entendus le 01/01/05 à la Jonchère-Saint-Maurice (87-LanJ), puis plus classiquement, le 07/02/05 à Limoges (87-DumA) et le 14/02/06 à Darnac (19-CreN). De nombreux indices de chants simultanés et de couples sont rapportés. Les constructions de nids débutent le 24/03/05 à Limoges (87-DumA). Les indices de reproduction certaine sont peu nombreux. Une couvaison est constatée le 12/06/06 à Limoges (87-VirA) dans une branche de conifère à 2,50m du sol. Des transports de nourriture sont observés en mai-juin à Aix-sur-Vienne (87-GauR), Cublac (19-GauR) et Rochechouart (87-BusR). Deux jeunes volants sont observés à Ambrugeat (19-BouH).



Roitelet à triple bandeau, Chaillac-sur-Vienne (87), mars 2007
(Raphaël Bussière)


Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Les derniers individus sont observés le 09/09/04 à Limoges (87-ChaG) et le 05/09/05 à l'étang de la Pougé (87-HubP).

Les retours s'amorcent le 11/04/05 à Palazanges (19-MarP) et le 18/04/06 à Ajain (23-NorT). L'espèce est assez discrète en période de reproduction, notons un nourrissage de jeunes le 17/06/05 à Verneuil-Sur-Vienne (87-NauD), un jeune volant le 08/07/05 à Mailhac-sur-Benaize (87-GauR), 4 jeunes le 18/07/06 à Aubazine (19-MarP), un nourrissage de jeunes le 05/08/06 à Beaulieu-sur-Dordogne (19-GauR), une famille le 05/08/06 à Branceilles (19-GauR), 3 jeunes volants le 07/08/06 à Beynat (19-MarP) et un nourrissage de jeunes le 12/08/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

La migration postnuptiale débute véritablement mi-août et se termine en septembre, totalisant 93 citations avec un fort passage début septembre.



Les maxima nous indiquent 10 oiseaux le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 19 ind. le 11/09/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR) et 20 ind. le 31/08/05 à Aubazine (19-MarP).

Les passages les plus tardifs ont lieu le 03/10/05 à la tourbière des Dauges (87-GueK) et le 08/10/05 à Vars-sur-Roseix (19-CreD).

Les données relatives au passage prénuptial sont toujours très restreintes (au total 14 citations). Les citations, qui s'étalent d'avril à fin mai, ne concernent que des individus isolés. Le 27/05/06 fut le dernier contact avec cette espèce et il a concerné un mâle sur la commune d'Azat-le-Ris (87-CavP).

AEGITHALIDÉS

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

● Durant les hivers 2004-2005 et 2005-2006, la taille moyenne des groupes atteint près de 6 individus (5,85 de moyenne, $n = 97$ durant les mois de novembre, décembre, janvier et février).

Les plus grosses bandes sont surtout observées en octobre et décembre :

- 28 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 18 ind. en vol le 24/12/05 à Lussat (23-DupE),
- 16 ind. en vol le 06/12/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 17 ind. posés sur un fil électrique le 16/10/04 à Saint-Auvent (87-ChaG).

La nidification commence le 19/03/05 avec un individu transportant des matériaux à Nexon (87-DumA). La première construction de nid est observée le 25/03/05 à Pionnat (23-NorT). Un nid est achevé le 28/03/05 à Oradour-sur-Glane (87-NauD). Les premiers jeunes volants sont observés le 18/05/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Au mois de juin les indices de nidification se généralisent. Des bandes de plus de 15 individus sont également notées en mai et en août, ce qui correspond sûrement à des groupements familiaux.

PARIDÉS

Mésange nonnette (*Parus palustris*)

● Conformément à sa réputation de farouche sédentaire, jamais cette mésange n'est signalée en migration. Les chants en janvier ne sont pas rares (DouA, DumA, GueK, MorS et VirA), mais c'est à partir de la fin mars et durant tout le mois d'avril que la Nonnette se fait vraiment entendre. De nouveau, des chants sont mentionnés fin mai (LanJ, MarP et RouRo) et jusqu'à la fin juin (LabB et Pral) comme marquant une reprise d'activité pour une deuxième nichée. Ce comportement est connu quoique considéré comme assez rare (Joachim 1994). Le nid garni de 5 œufs le 04/06/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) ou ces creusements de cavité le 01/06/05 à Fontannières et à Sannat (23-DubP) confirment cette interprétation. 6 autres cas de reproduction certaine sont rapportés de fin avril à début juin (BouP, DouA, HubP, MarP et PreP).

Joachim J. in Yeatman-Berthelot D. et Jarry G., 1994. Mésange nonnette. *Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France – 1985-1989*. Société Ornithologique de France.

Mésange boréale (*Parus montanus*)

● Certainement la plus rare de nos Mésanges, sans doute assez discrète, et représentée en Limousin par la Mésange des saules, cette population ne dément pas son appellation. Elle se rencontre essentiellement dans les saulaies d'altitude.

Les chants et les couples sont signalés en avril/mai. Un creusement de cavité est repéré le 26/04/06 à Neuviç (19-BarJ). Ce comportement est réputé systématique pour cette espèce alors qu'il n'est que facultatif pour la Mésange nonnette (Spitz 1994). Peu de données concernent l'hivernage.

Spitz F. in Yeatman-Berthelot D. et Jarry G., 1994. Mésange boréale. *Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France* - 1985-1989. Société Ornithologique de France.

Mésange huppée (*Parus cristatus*)

● Bien que la période de chant soit très resserrée sur le mois d'avril, l'espèce se manifeste tout de même sporadiquement l'hiver par son chant, en particulier le 10/12/04 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-DouA), ou encore le 05/11/05 à Tarnac (19-DouA).

Aucune Mésange huppée n'est notée en migration.

4 informations de reproductions certaines sont enregistrées (BouH, DerG et HipS). Une famille, encore soudée, est notée le 27/07/05 à Toulx-Sainte-Croix (23-DerG).

Mésange noire (*Parus ater*)

● L'espèce est notée en migration active à Flavignac du 14/10/05 au 29/10/05 (87-PreP). Des chants sont entendus quasiment tout l'hiver (03/10/05 DouA ; ou encore en novembre BarG, EyrO). A partir du mois de janvier, les chants deviennent plus réguliers.

8 cas de reproduction certaine sont archivés (BouH, DubP, HubP, LabG, MorS et NauD). Parmi eux, les nourrissages de jeunes sont constatés du 5 mai au 8 août.



Mésange noire, Pierre-Buffière (87), décembre 2005 (Aurélien Audevard)

Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

● La migration postnuptiale est notée de fin septembre à la première quinzaine de novembre. Patrick Précigout à Flavignac (87) fournit la très grande majorité des données et notamment ce record de 115 individus notés en migration active pour la seule journée du 14/10/05.

Après une pause de juillet à novembre, les chants sont entendus pratiquement tous les mois d'hiver. Cette activité ne reprend cependant vraiment qu'à compter de janvier pour culminer en avril.

Le nourrissage des jeunes s'étend de la deuxième quinzaine d'avril à début juin (BusR, CavP, CoqM, CreD, DouA, GauR, HubP, MorS, Pral et VirA). La dernière famille se promène encore unie le 22/0705 (CreN).

Mésange charbonnière (*Parus major*)

● La migration postnuptiale est régulièrement constatée au cours du mois d'octobre de chaque année sur les communes suivantes : Albussac (19-ChaJ), Blond (87-BouH), Bussière-Boffy (87-DouA), Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et à Flavignac (87-PreP)

A l'exclusion des mois de juillet et d'août, le chant a été entendu chaque mois de l'année au moins une fois, mais la véritable reprise de cette activité a lieu en janvier, quoique très timide - de nombreux individus sont alors rassemblés près des mangeoires et n'occupent alors pas leur territoire - et bat son plein début mars. Les couples sont observés pour l'essentiel à partir de la fin mars. Les premières pontes sont constatées à partir de la deuxième quinzaine d'avril. Des pontes en juin sont à nouveau relevées (04/05/06 CavP et 17/06/05 CouC) et correspondent probablement à une deuxième nichée pour ces couples. Un record de 9 jeunes au nid est établi le 03/06/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). L'envol est constaté de la fin mai à la fin juillet.

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)

● Cette espèce est observée toute l'année sur l'ensemble du Limousin. La défense du territoire semble avoir lieu tout au long de l'année. Ainsi, 2 mâles chantent simultanément le 03/01/05 à Donzenac (19-CoqM). Le 14/02/06 à Darnac, ce sont 5 couples qui, à grand renfort de chants, se disputent les arbres creux propices à la nidification (19-LabG).

Dès mars, les sittelles sont à l'ouvrage comme le montre cette observation faite le 22/03/05 à Limoges, de 2 mâles chantant simultanément pendant qu'une femelle maçonne l'entrée de sa cavité (87-VirA). La sittelle occupe souvent des nichoirs mais s'installe aussi dans d'anciennes loges de pics. 1 oiseau maçonne l'entrée d'une loge de Pic noir le 19/04/05 à Saint-Martin-Château (23-FleL).

La première couvaison est observée dans un nichoir le 05/05/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Ce même nichoir, contrôlé le 13/05/05, contient alors des poussins. Les premiers jeunes volants sont vus le 19/05/06 à Limoges (87-VirA). Mai et juin fournissent toutes les données de jeunes volants et de familles. La dernière fratrie est contactée le 25/06/06 à Chamboulive (19-MorS).



Sittelle torchepot, Pierre-Buffière (87), décembre 2006 (Aurélien Audevard)

TICHODROMADIDÉS

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)

Toutes les observations, à l'exception d'une seule, concernent des individus isolés en hivernage. Huit communes se partagent les 37 données de cette espèce rupestre et montagnarde : Bort-les-Orgues (19), Châteaux (19), Ligniac (19), Rancon (87), Royères (87), Saint-Robert (19), Soursac (19) et Vignols (19).

La donnée d'hivernage la plus précoce concerne un individu observé le 06/11/05 dans une carrière à Royères (87-LebA). La plus tardive est l'observation d'un individu le 22/03/05 à Ligniac (19-BouH).

Une observation sort de l'ordinaire puisqu'elle concerne 2 individus vus ensemble le 22/06/06 sur le barrage de l'Aigle à Bort-les-Orgues (19-GfeE), faisant passer le statut du tichodrome en Limousin « d'hivernant » à « nicheur possible ».

CERTHIIDÉS

Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)

115 données sur cette période 2004/2006 ! C'est considérable au regard des seulement 7 lors de la centrale 2002/2004. 60 données proviennent d'une étude SEPOL réalisée par Clément SEGELLE, alors étudiant en BTS GPN à Neuvic (19). L'augmentation du nombre de données est donc liée à l'augmentation de l'effort de prospection et vraisemblablement pas à une augmentation de la population de cette espèce.

100 données proviennent de Corrèze, 11 de Creuse, et 4 de Haute-Vienne. Les observations sont faites entre 540 m et 830 m d'altitude. L'espèce demeure donc inféodée aux boisements, notamment de vieux hêtres, les plus élevés de notre région.

La saison de reproduction commence tôt comme le montrent ces observations :

- 1 couple vient « à la repasse » le 01/03/06 à Neuvic (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 02/03/06 à Neuvic (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 22/03/06 à Lamazière-Basse (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 18/04/06 à Saint-Pardoux-le-Vieux (19-SegC),
- 1 ind. transporte de la nourriture le 26/04/06 à Saint-Angel (19-ThoF).

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)

● Cette espèce est contactée toute l'année. Le dernier chant de 2004 est entendu le 23/12 à Seilhac (19-MorS) et les premiers de 2005 le 02/01 à Saint-Méard (87-MorS) et à Limoges (87-CoqM). En 2006, le premier chant est entendu le 03/01 à Donzenac (19-CoqM).

Concernant la nidification, 1 ind. transporte des matériaux le 24/03/05 à Brive-la-Gaillarde (19-CorP). Un transport de la nourriture est noté le 05/05/05 à Crocq (23-Sepol). Des nids contenant des jeunes sont découverts :

- le 10/05/05 à Turenne (19-DauR),
- le 17/05/05 à Aubazine (19-MarP),
- le 20/05/06 à Chaillac-sur-Vienne, à 40 cm du sol sous l'écorce d'un chêne (87-BusR),
- le 28/05/05 à Flavignac, à 1,7 m de hauteur entre un tronc de chêne et du lierre, contenant 5 jeunes (87-PreP).

4 jeunes et 2 adultes sont observés ensemble le 07/08/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).



Grimpereaux des jardins, Chaillac-sur-Vienne (87), décembre 2003 (Raphaël Bussière)

ORIOIDÉS

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

● Cette espèce quitte nos contrées au mois d'août. Pour l'année 2004, le dernier individu est contacté le 18/08 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA). La migration postnuptiale 2005 s'achève avec l'observation de 2 ind. en migration active le 11/09/05 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Ce type d'observation reste rare car le loriot migre préférentiellement la nuit.

Les premiers loriot nous reviennent en avril. Un individu est observé le 12/04/06 à Albignac (19-MarP). Le premier chant, parfois imité par l'étourneau, est entendu le 14/04/05 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). C'est sur cette même commune que 2 ind. nourrissent des jeunes le 26/05/06 (87-BusR). D'autres données de reproduction marquent cette centrale :

- un accouplement et un nid sont vus le 10/05/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- un jeune juste volant est observé le 01/06/05 à Limoges (87-JofP),
- un nid découvert le 01/06/05 à Pandrignes (19-MarP), constituant un indice de reproduction au dessus de 500 m d'altitude, ce qui est rare chez cette espèce,
- 2 jeunes quittent le nid le 15/06/05 à Bussière-Galant (87-CouC),
- 2 ind. nourrissent des jeunes le 23/07/05 à Saint-Laurent-les-Eglises (87-VirA).

Des groupes, sans doute en partie « familiaux », sont observés en juillet avant les départs en migration postnuptiale. Par exemple, 10 ind. sont posés ensemble le 25/07/06 à Boisseuil (87-CelJ).

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

● Le dernier individu observé en fin de saison est un juvénile le 17/09/04 à Videix (87-BusR) ainsi que le 15/09/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP).

Les premiers retours printaniers sont décelés le 21/04/05 à Saint-Sulpice-le-Guérétois (23-BieJ) et le 12/04/06 à Turenne (19-DauR).

Le premier indice de reproduction est noté le 18/05/05 à Aix-sur-Vienne avec un nid garni de 3 œufs découvert dans un buisson épineux (87-PreP), et le 06/05/06 à Chaillac-sur-Vienne avec un nid garni d'un premier œuf (87-BusR). 11 familles avec jeunes ont été recensées le 13/07/05 autour de Folles et Laurière (87-VinS). Il n'est pas rare d'observer de fin juin à août, jusqu'à quatre jeunes volants par famille : c'est le cas à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), à Beynat (19-MarP) et à Aubazine (19-MarP).

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

● L'hivernage est signalé de novembre à janvier sur seulement quatre communes en 2004 : Meymac (19-CouG), Tarnac (19-MerC), Saint-Merd-les-Oussines (19-BarJ) et Lussat (23-MerC et DupE).

En 2005, le suivi s'est intensifié de décembre à février. Elle est trouvée en hivernage sur 4 communes creusoises : Evaux-les-bains, Royère-de-Vassivière, La Saunière et Lussat (DubP, RobS, GauR) ; en Haute-Vienne, à Folles (87-VinS) ; et dans 6 communes corrésiennes : Aubazine, Neuviç, Peyrelavade, Saint-Merd-les-Oussines, Tarnac et Viam (MarP, BesM, GfeE, LabD, BouH, VarC).

Pour ce qui est de la nidification en 2005, de fin avril à fin juillet, seules 11 données possibles et 1 probable sont notées dans la région (19-DouA et BarJ) (23-DubP, BouP, DubG) (87-VinS).

En 2006, nous disposons de plus d'informations sur la nidification de l'espèce. De mi-mars à fin juillet, 24 données possibles, 6 probables et 4 certaines sont comptabilisées en Creuse et en Corrèze (VirA, BouH, HubP, SegC, ThoF, BouP, LabA, TarE).

Une observation remarquable de 5 jeunes fraîchement envolés le 01/06/06 à Saint-Setiers (19-BouH). Sinon plusieurs familles sont contactées à Peyrelevalde le 07/06/06 (19-DesG).

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)

● L'espèce est contactée pour la dernière fois le 24/09/04, avec un juvénile noté à Flavignac (87-PreP) et le 02/09/05 à Jouac (87-MerC).

Elle nous revient dès le 16/04/04 à Flavignac (87-PreP et Pral) et le 29/04/05 à Saint-Merd-les-Oussines (19-LabA). Le premier signe de reproduction est signalé le 25/06/05 à Flavignac (87-PreP) et le 17/06/06 à Azat-le-Ris (87-CavP). Un maximum de 4 jeunes volants sont contactés le 21/07/05 à Flavignac (87-Pral) et une famille avec 3 juvéniles le 30/07/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

Sur l'ensemble des données collectées, 51 % proviennent du suivi temporel des oiseaux communs (STOC). En période hivernale, l'espèce est peu notée et représente 11 % des citations.

Peu nombreuses sont les preuves certaines de nidification ($n = 16$). Un nid avec un jeune est découvert le 23/04/05 à Pageas (87-PreP). Certains individus sont en pleine construction de nid, notamment le 29/04/05 à Saint-Sornin-Leulac (87-GauR). Les transports de nourriture sont notés le 23/04/05 à Nexon (87-DumA), le 07/05/06 à Pensol (87-LabB et PreP) et ce jusqu'au 25/06/06 à Persac (23-BusR). Notons l'observation de jeunes volants les 02/07/06 à Altiliac (19-GauR) et 12/08/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Quelques observations relatent des oiseaux en groupe :

- 13 ind. le 27/03/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-NauD),
- 15 ind. le 11/04/06 à Flavignac (87-LabB),
- 11 ind. le 14/05/06 à La Roche-L'Abeille (87-CelJ).



Geai des chênes, Tulle (19), octobre 2008 (Pierre Soulier)

Pie bavarde (*Pica Pica*)

● En période hivernale, l'espèce peut se rassembler en dortoir. Le plus gros effectif pour l'hiver 2004-2005 est de 82 individus observés le 05/12/04 à Saint-Yreix-la-Perche (87-CeIJ) et 60 individus le 20/12/05 au même endroit pour l'hiver 2005-2006 (87-CeIJ).

La période de nidification commence au mois de janvier avec des constructions de nid le 06/01/05 à Isle (87-CeIJ) et le 03/01/06 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). La nidification se poursuit avec les premières couvaisons au mois d'avril le 10/04/05 à Flavignac (87-LabB) et deux données simultanées pour 2006, le 18/04/06 à Nantiat (87-LanJ) et à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Un adulte nourrit un jeune non émancipé le 20/05/05 à Limoges (87-DumA) et un jeune volant le 20/05/06 à Monestier-Merlines (19-DouA). Le nid peut être placé dans une grande variété d'essences d'arbres : peuplier, haie, pin parasol, bouleau. Notons cette attitude originale d'une pie bavarde posée sur un mouton le 11/12/05 à Journac (87-LanJ).

Choucas des tours (*Corvus monedula*)

● La migration postnuptiale débute au mois d'octobre : le 17/10/04 à Flavignac avec 6 individus (87-PreP) et à Moissannes avec 4 individus (87-BarJ) pour l'année 2004. Le plus gros effectif est observé le 22/10/04 avec 100 individus à Lacelle (19-ThoF). Pour l'année 2005, elle débute le 11/10/04 à Flavignac avec 2 individus (87-VirA). L'effectif maximal relevé est l'observation de 5 oiseaux le 29/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En période d'hivernage, les plus gros effectifs sont observés au mois de février :

- 150 ind. le 22/02/05 à Châlus (87-CouC),
- 120 ind. le 24/02/05 à Saint-Gence (87-VirA),
- 130 ind. le 03/02/06 à Lignignac (19-SegC).

Uniquement deux données relevées lors de la migration prénuptiale :

- 1 ind. le 13/03/05 à Flavignac (87-PreP),
- 6 ind. le 14/03/06 à Limoges (87-VirA).

Les premiers transports de matériaux sont observés le 06/01/05 à Ambazac (87-LanJ) et le 27/03/06 à Fromental (87-GauR). Les premières occupations de nids le 13/03/05 au Vigen (87-GauR) et le 02/04/06 à la Jonchère-Saint-Maurice (87-GauR). Un couple niche dans une cheminée le 04/06/05 à Treignac (19-HubP). Un nid avec œuf est découvert le 08/05/06 au Dorat (87-CavP). Les premiers jeunes sont observés le 15/06/05 à Magnac-Laval (87-GauR) et le 12/07/06 à Guéret (23-RobS).

Notons cette donnée originale : un Choucas des Tours 1/4 à 1/3 albinos à Limoges le 01/07/05 (87-RogJ).


Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

● L'espèce poursuit son expansion depuis le Nord de notre région, en direction du Sud, par les vallées. Le nombre de colonies recensées atteint 28 en 2006, dont 2 en Creuse mais aucune encore en Corrèze. Seules 2 colonies étaient connues dans le Nord de la Haute-Vienne en 2000 !

En 2005, la reproduction est constatée sur 4 communes, avec des colonies allant de 2 à 64 nids. Plusieurs colonies sont recensées à Limoges ; les nouvelles résultent probablement de l'éclatement des plus anciennes (87-MerC et al.). Dans le Nord de la Haute-Vienne, 4 colonies sont signalées à Bellac (87-GauR) et 2 à Blanzac (87-GauR). Enfin, une colonie comptant 64 nids est notée à La Souterraine (23-RogJ et MerC).

En 2006, la reproduction est constatée sur 5 communes de Haute-Vienne : Limoges (GauR et al.), Le Dorat (ONC 87 et al.), La Croix-sur-Gartempe (CavP et al.), Bellac (GauR) et Saint-Junien (DouA). Les 2 nids découverts sur cette dernière commune témoignent de l'expansion de l'espèce vers l'Ouest, en suivant les vallées. La reproduction est également constatée en Creuse dans le bourg d'Evaux-les-Bains avec 13 nids (DubP). L'observateur signale une première colonie sur le site une dizaine d'années auparavant, mais sans autre tentative de reproduction connue jusqu'à 2006. Cette dernière donnée montre que l'expansion englobe toute la largeur du Limousin, des limites occidentales aux limites orientales de la région. Le département de la Corrèze demeure le seul sans cas de reproduction connu, mais la situation pourrait changer si l'expansion vers le Sud se poursuit.

Au cours de la période considérée, les premières constructions de nids sont signalées dès le 19/02/06 à Evaux-les-Bains (23-DubP), et se poursuivent pendant tout le mois de mars. La couvaison débute fin mars. Elle est signalée le 30/03/05 à Limoges (87-MerC). Enfin, les premiers jeunes sont notés le 14/04/05 à Limoges (87-MerC). L'envol des jeunes peut être assez étalé dans le temps, et des individus peuvent fréquenter les environs de la colonie toute l'année.



Répartition du Corbeau freux en période de reproduction en Limousin

Corneille noire (*Corvus corone*)

● Les plus gros effectifs pour l'hiver 2004-2005 sont observés le 24/02/05 à Saint-Gence comptant 250 individus (87-VirA). Pour l'hiver 2005-2006, 500 individus sont comptabilisés le 15/12/05 et le 15/01/06 à Compreignac (87-VirA).

Les premières constructions de nids débutent le 23/03/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et le 11/03/06 à Neuvis (19-DubY). Un accouplement est observé le 31/03/06 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Les premières couvaisons sont observées le 02/04/05 à Flavignac (87-PreP) et le 01/04/06 à Linards (87-MorS). Les premiers poussins sont observés le 14/05/05 à Meymac (19-DouA et al.) et le 17/05/06 à Limoges (87-VirA). La première famille est notée le 29/05/06 à Ladapeyre (23-NorT).

Notons cette donnée originale d'une Corneille noire consommant des anodontes morts le 16/01/05 à Azat-le-Ris (87-CavP).

Grand corbeau (*Corvus corax*)

- D'importants groupes ont été observés entre le mois d'avril et le mois de juin 2006 :
- 170 ind. le 27/04/06 à Lamazière-Haute (19-DouA),
 - 151 ind. le 26/05/06 à Eygurande (19-DouA),
 - 220 ind. le 04/06/06 à Eygurande (19-DouA).

La période de nidification débute au mois de février avec un nid occupé le 26/02/05 à Saint-Julien-le-Petit (87-MerC). En 2006, un individu est en position de couvaison le 17/02/06 à Saint-Léonard-de-Noblat (87-MorS). La première couvaison est observée le 14/04/06 à Aubusson (23-PalG). Les premiers poussins sont notés le 13/04/05 à Saint-Priest-Taurion avec 3 poussins au nid (87-MerC). Les premiers jeunes à l'envol sont vus le 16/05/05 à Saint-Priest-Taurion (87-MerC) et le 22/05/06 à Aubusson (23-CSP 23).

Nous pouvons relever ces données insolites d'un Grand corbeau construisant son nid dans un douglas (40-45m) le 05/04/06 à Meymac (19-BouH) et d'un grand corbeau mangeant un œuf blanc le 21/05/05 à Compreignac (87-MerC).

STURNIDÉS

Étourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

◆ Après l'émancipation des jeunes, les étourneaux ont tendance à se regrouper, formant ainsi des rassemblements post-nuptiaux, le plus souvent notés dans les villes. Cependant, ces derniers semblent négligés par les observateurs. Seules deux données sont répertoriées : 2 000 ind. le 08/10/05 à Limoges (87-DumA) et 650 ind. le 27/07/06 à Limoges (87-VirA). Les premiers signes de la migration post-nuptiale débutent le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et le 16/08/05 à Peyrissac (19-HubP). Le passage est plus intense de la mi-octobre à la mi-novembre, avec notamment :

- 328 ind. le 23/10/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 250 ind. le 26/10/04 à Janaillat (23-RogJ),
- 800 ind. le 02/11/04 à Saint-Setiers (19-AlbD).

Pendant la période hivernale, deux données font mention d'individus en dortoir : 500 le 02/12/05 à Guéret (23-RobS) et 500 le 04/12/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Si certains oiseaux commencent à s'égosiller dès la fin du mois de février, d'autres sont observés en migration, comme ces 584 ind. le 12/03/05 à Flavignac (87-PreP).

Les premiers accouplements sont notés le 14/03/05 à Aix-sur-Vienne (87-GauR) et les parades le 19/03/05 à Ussac (19-CorP). Les signes d'éclosion se traduisent par la découverte des coquilles d'œufs trouvées à même le sol, notamment le 23/04/05 à Pageas (87-PreP) et le 23/04/06 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF). Ces découvertes coïncident avec les observations d'oiseaux adultes vus en vol avec de la nourriture au bec : le 26/04/05 à Cieux (87-DouA) et le 01/04/06 à Albignac (19-MarP). La dernière mention de transport de nourriture est datée du 25/06/06 à Oradour-sur-Glane (87-BouH).

PASSERIDÉS

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

◆ Rien de particulier à son sujet en période hivernale.

En période de reproduction, l'espèce est signalée régulièrement dans les trois départements. Des parents nourrissent encore le 17/08/05 à Janailhac (87-DumA) et le 05/08/06 à Branceilles (19-GauR).

Moineau friquet (*Passer montanus*)

● En hivernage, quelques troupes de 20 à 30 individus sont comptées dans la commune de Flavignac (87-Pral et PreP).

La nidification certaine est seulement notée en Corrèze et en Haute-Vienne.

Pour 2005 : nourrissage de jeunes le 10/04 à Flavignac (87-LabB), nid garni le 23/04 à Segonzac (19-GauR), transport de nourriture le 15/05 à Larche (19-GauR) et des jeunes volants sont observés le 03/07 à Flavignac (87-PreP) et à La-Chapelle-aux-Saints (19-GauR).

Pour 2006 : nid garni le 12/05 à Neuvic (19-SegC), 2 jeunes volants le 10/06/06 à Janailhac (87-Pral), transport de nourriture le 15/06 à Flavignac (87-LabB) et le 17/06 à Cublac (19-GauR) et un nourrissage de jeunes le 08/08 à Objat (19-CreD).

La reproduction de l'espèce est probable sur 4 sites en Creuse.

Moineau souldie (*Petronia petronia*)

● Seule la basse Corrèze continue à être fréquentée. En période de reproduction, elle fournit 5 citations sur 5 communes :

- Billac, avec 3 individus le 28/03/05 (19-GauR),
- Chauffour-sur-Vell, avec 1 chanteur le 06/05/05 (19-GauR),
- Saillac, avec 1 couple le 06/05/05 (19-GauR),
- Végennes, avec 1 individu le 03/07/05 (19-GauR),
- Chasteaux, avec 2 individus le 09/05/06 (19-BouH).

Ils sont souvent grégaires comme cette troupe d'une trentaine d'individus le 17/08/04 à Chasteaux (19-MerC).

Il semble passer l'hiver en basse Corrèze car 3 observations sont mentionnées du 15/01 au 30/01/06 à Aubazine (19-MarP).

FRINGILLIDÉS


Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

● Quatre premiers migrateurs passent le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 9 ind. le 25/09/05 à Flavignac (87-PreP). La migration s'étale jusqu'en novembre avec 3 ind. le 06/11/04 et 85 ind. le 12/11/05 à Flavignac (87-PreP). Notons plus de 27 000 ind. migrateurs pendant la journée du 21/10/04 et plus de 33 000 ind. le 09/10/06 en Limousin.

Les groupes hivernaux les plus importants concernent 200 ind. le 26/12/04 à Treignac (19-HubP) et 100 ind. le 18/11/05 à Saint-Jouvent (87-HubP).

Les chants débutent le 15/02/05 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et le 07/02/06 à Chaptelat (87-CoqM). La phénologie de la reproduction est représentée sur le graphique ci-dessous.

Pour l'anecdote, un individu a été victime d'un faucon pèlerin le 17/11/04 à Sérandon (19-BarJ).



Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)

Ils « débarquent » le 08/10/04 à Saint-Goussaud (23-EyrO) et le 08/10/05 à Saint-Léger-le-Guérétois (23-RobS). Puis, la Haute-Vienne voit passer des migrateurs avec notamment 30 ind. le 23/10/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ) avant que la Corrèze n'enregistre ses premières mentions : 100 ind. le 26/12/04 à Treignac (19-HubP) et 1 ind. le 29/10/05 à Soudaine-la-Vianadière (19-HubP).

En hiver, les rassemblements sont imposants : 500 ind. le 24/02/05 à Saint-Gence (87-VirA), 200 ind. le 10/02/05 à Royère-de-Vassivière (23-RobS), 500 ind. le 11/03/06 à Bonnefond (19-MorS), 200 ind. le 12/02/06 à Saint-Fiel (23-RobS) et encore 200 ind. le 14/03/06 à Neuvic (19-Sepol). Les plus tardifs sont 2 oiseaux le 18/03/05 à Séréilhac (87-DouA) et 1 ind. le 10/04/06 à Limoges (87-JofP).

Serin cini (*Serinus serinus*)

Les mouvements migratoires commencent en octobre, avec 1 individu le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA) et 2 ind. le 08/10/05 à Flavignac (87-PreP).

Durant la mauvaise saison, très peu de serins sont observés :

- 1 ind. le 07/11/04 à Videix (87-EyrO),
- 1 ind. le 13/02/05 à Boisseuil (19-LanJ),
- 1 ind. le 21/01/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Déserteraient-ils en forte proportion notre région ?

Mars signe les premiers chants : le 14/03/05 à Aix-sur-Vienne (87-GauR) et le 25/03/06 à Flavignac (87-LabB). Un nid contenant 2 œufs est trouvé dans un sapin à

3 m de haut le 27/05/05 à Flavignac (87-PreP), et un autre contient 3 œufs le 07/06/05 puis 5 deux jours plus tard à Flavignac (87-PreP). Les parents nourrissent le 27/05/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et le 12/06/06 à Limoges (87-VirA). Des jeunes sont volants le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).

Après la reproduction, 12 ind. sont regroupés le 12/09/04 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP) et 20 ind. le 10/09/05 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

● L'espèce est notée uniquement lors de la migration postnuptiale :

- 2 ind. le 17/10/04 à Flavignac (87-PreP),
- 3 ind. le 11/10/05 à Flavignac (87-VirA),
- 15 ind. le 23/10/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

En hivernage, on notera 100 ind. posés dans un champ au Buis (87-SotJ) et 50 ind. le 26/12/05 à Objat (19-LafJ).

Malgré quelques chants à l'arrière saison, le verdier s'égosille de manière marquée à partir du 07/01/05 à Limoges (87-HubP) et du 16/01/06 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Des adultes transportent de la nourriture le 15/06/05 à Evaux-les-Bains (23-DubP), le 11/04/06 à Aix-sur-Vienne (87-GauR) et encore le 11/07/06 à Monceaux-sur-Dordogne (19-CavP), tandis que des jeunes étaient déjà sortis le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).



Verdier d'europe, Chaillac-sur-Vienne (87), janvier 2006 (Raphaël Bussière)

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

La migration postnuptiale s'amorce avec 12 ind. le 05/09/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 4 ind. le 08/10/05 à Flavignac (87-PreP). Lors des comptages migration, de nombreux groupes plus ou moins importants sont recensés dont 617 ind. le 23/10/04 et 724 le 24/10/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) ainsi que 80 ind. le 01/11/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-VinS). La migration représente les deux tiers des effectifs totaux de chardonnerets comptabilisés lors de la période considérée.

Les rassemblements hivernaux les plus remarquables proviennent du barrage de Lavaud, avec 250 ind. le 30/01/05 (87-RayA), et 80 ind. le 14/01/06 (87-BusR).


Un premier chant se fait entendre le 08/01/05 à Limoges (87-HubP) mais seulement le 02/03/06 à Treignac (19-DouA). Des jeunes sont envolés le 01/06/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP), tandis que d'autres se font toujours nourrir le 31/08/05 à Ambazac (87-LanJ).

Tarin des aulnes (*Carduelis spinus*)

L'espèce commence à survoler notre région à l'automne : 20 ind. le 08/10/04 à Saint-Goussaud (23-EyrO) et 55 ind. le 08/10/06 à Flavignac (87-PreP). 263 migrateurs passent le 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ) et 102 le 01/11/05 à Saint-Léger-la-Montagne (VinS).

Les rassemblements sont parfois importants en hiver : 112 ind. le 12/12/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 200 ind. le 24/02/05 à Limoges (87-VirA), 100 ind. le 19/01/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-DouA). Les tarins traînent jusqu'en avril, avec 2 ind. le 22/04/05 à Meymac (19-DouA) et 2 ind. le 26/04/06 à Ligniac (19-CavP). Deux cas d'estivage (ou d'individus très tardifs ou très précoces) se manifestent : 2 ind. le 25/05/06 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et le 03/08/06 à Saint-Léger-la-Montagne (87-CreN).

La carte ci-dessous recense par commune les effectifs cumulés de tarins vus en migration et en hivernage, et montre leur abondance relative dans l'ouest de la région.




Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

Les premiers vols migratoires passent à Flavignac : 2 ind. le 25/09/04 (87-PreP) et 16 ind. le 01/10/05 (87-PreP). Quelques groupes nombreux : 150 ind. le 01/10/04 à Folles (87-VinS) et 40 ind. le 09/10/05 à Guéret (23-RobS).

En hivernage, 60 ind. sont vus le 12/12/04 à Flavignac (87-PreP) et 450 ind. le 14/01/06 à Videix (87-BusR). Notons que 80 % des données d'hivernage proviennent de la Haute-Vienne, le reste de Creuse, et rien en Corrèze (altitude et prédominance forestière défavorables pour la recherche de nourriture à cette époque ?).

Les chants débutent en mars (cf. graphique) le 03/04/05 à Sainte-Feyre (23-NorT) et le 25/03/06 à Aubazine (19-MarP). Un nid avec 2 œufs est trouvé dans un sapin le 20/04/05 à Flavignac (87-PreP), un autre avec 4 œufs le 10/05/05 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ). Un transport de nourriture a lieu le 28/04/06 à La Roche-l'Abeille (87-Pral). Des jeunes encore dépendants sont aperçus le 06/07/05 à Saint-Germain-Belles (87-MorS), le 01/06/06 à Saint-Sétier (19-BouH) et encore le 19/07/06 à Millevaches (19-BouH).



Un premier pic de chants s'observe fin mars début avril et un second fin avril début mai, qui peuvent annoncer deux couvées différentes.

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)

Ce rare hivernant a fait l'objet de 3 citations en 2005 et 7 en 2006, totalisant respectivement au moins 20 et 104 individus. Les premiers arrivants sont observés au nombre de 20 ind. le 10/12/05 et 40 ind. le 22/01/06 à Guéret (23-RobS). Si le sizerin niche dans les bétulaies de montagne, il affectionne aussi l'essence en hivernage : 17 ind. occupent un bouleau le 26/01/06 à Sainte-Vitte-sur-Briance (87-MorS) et 10 ind. le 17/03/06 à Sainte-Feyre (23-NorT).

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

● Un rassemblement de 30 ind. est observé le 21/08/04 à Tarnac (19-EyrO). Des groupes migratoires sont dénombrés : 7 ind. le 18/09/04 à Flavignac (87-PreP), 27 ind. le 24/10/04 à Albussac (19-ChaJ), 7 ind. le 01/10/05, et encore 7 ind. le 19/10/05 à Flavignac (87-PreP).

Des becs-croisés sont notés tous les hivers avec quelques troupes nombreuses : 50 ind. le 30/10/04 à Tarnac (19-HubP), 30 ind. le 23/11/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-MerC) et 70 ind. le 14/02/06 à Saint-Léger-le-Guéretois (23-RobS).

Le chant est rarement entendu, et méritent d'être mentionnées les écoutes suivantes : le 03/10/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA), le 16/01/05 à Saint-Merd-les-Oussines (19-LabD) et le 04/05/05 à Meymac (19-NauD). Aucune écoute pour l'année 2006. Un couple parade le 21/12/04 à Royère-de-Vassivière (23-AudA) mais les données de reproduction certaine font défaut.

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

● En 2004, quelques mouvements migratoires automnaux sont perçus : 2 ind. le 17/10/04 à Bussière-Boffy (87-DouA) et 3 ind. le 03/11/04 à Eymoutiers (87-RogJ).

En hiver, rares sont les groupes très importants mais signalons 30 ind. le 09/11/05 à Château-Chervix (87-EyrO).

Un chanteur a été entendu l'hiver le 12/12/04 à Saint-Auvent (87-FleL), mais les chants reprennent essentiellement en mars : le 13/03/05 à Saint-Victurnien (87-DouA) et le 25/03/06 à Beynat (19-MarP).

Seule l'année 2006 fournit des preuves de reproduction pour cette espèce discrète : un transport de nourriture le 25/06/06 à Bussière-Galant (87-Pral) et des jeunes volants le 18/07/06 à Guéret (23-RobS).

Un individu leucique, entièrement blanc avec les rémiges noires, se trouve le 03/12/04 à Neuvic avec quatre autres bouvreuils au plumage type (19-BarJ).

Bouvreuil pivoine trompetteur (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*)

● Il s'agit de bouvreuils pivoines au cri particulier ressemblant à un coup de trompette ou un vieux klaxon. Ils proviennent vraisemblablement de la république des Komis, à l'Ouest des monts Oural en Russie, mais ne sont rattachés à aucune sous-espèce particulière. Un afflux avait eu lieu en France lors de l'hiver 2004-2005, essentiellement dans l'Est, mais c'est lors de l'hiver suivant (2005-2006) que des individus ont été repérés en Limousin. Le premier est signalé le 11/12/05 à Saint-Genest-sur-Roselle (87-MorS), puis 2 ind. le 12/12/05 à Laurière (87-VinS) et 2 autres le 26/12/05 à Saint-Priest-Ligoure (87-AudA). Il est entendu en Corrèze le 17/12/05 à Ussel (19-RayP). En Creuse, il faut attendre le 19/01/06 pour le repérer à la Souterraine (23-GueK), et un autre trompette le 09/02/06 à Sannat (23-DubP). Le dernier est entendu le 24/02/06 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP).


Le contact le plus au sud provient de Sérilhac le 26/12/05 (19-MarP) et le plus à l'ouest de Saint-Junien le 01/02/06 (87-DouA).

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

● A l'automne, 4 ind. le 17/10/04 à Moissanes (87-BarJ) et 2 ind. le 10/09/05 à Flavignac (87-PreP) sont les premiers migrants observés. Notons un total de 62 migrants le 15/10/05 à Flavignac (87-PreP).

En hiver, la taille des groupes est assez variable mais plutôt limitée (cf. graphique). Le maximum pour 2005 concerne seulement 7 ind. le 08/01/05 à Meuzac (87-BurJ) mais 30 ind. le 20/12/05 à Chambon-sur-Voueize (23-DubP).

Il faut attendre mars pour entendre les premiers chanteurs de cet oiseau discret : le 12/03/05 à Argentat (19-NorT) et le 17/03/06 à Sainte-Feyre (23-NorT). La reproduction n'est prouvée que trois fois : une famille le 11/07/05 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT), un nid avec œufs le 04/06/06 à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP) et une autre famille le 17/07/06 à Aubazine (19-MarP).



Grosbec casse-noyaux, Tulle (19), janvier 2009 (Pierre Soulier)

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

● Les premiers mouvements migratoires sont constatés le 16/10/04 et le 08/10/05 à Flavignac (87-PreP). Seul ou en petit groupe, les vols comprennent au maximum 7 ind. le 29/10/04 à Flavignac (87-VirA) et 5 ind. le 14/10/05 au même lieu (87-PreP).

Par contre, l'hivernage donne lieu à des rassemblements plus importants :

- 50 ind. le 18/12/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-SotJ),
- 62 ind. le 22/01/05 à Flavignac (87-PreP),
- 50 ind. le 06/02/05 à Laurière (87-VinS).

Les premiers chants nous parviennent le 10/02/05 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et le 04/03/06 à Flavignac (87-Pral). Un individu transporte de la nourriture le 01/06/05 à Fontanières (23-DubP), un autre le 20/05/06 à Blessac (87-BouP). Des jeunes encore dépendants sont vus le 20/06/05 à Flavignac (87-PreP) et le 31/07/06 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP).

Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)

● L'espèce est rarement observée en migration : 6 ind. le 11/10/05 à Flavignac (87-VirA), 3 ind. le 11/11/05 à Flavignac (87-PreP).

Ils chantent tout au long de l'année, même en fin d'automne : le 11/12/04 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et le 12/11/05 à Meilhac (87-PreP). Des adultes ravitaillent les jeunes le 24/07/05 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP), déjà le 15/04/06 à Condat-sur-Vienne (87-NauD) et encore le 12/08/06 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Des jeunes sont fraîchement sortis les 01/06/05 et 15/06/06 à Aubazine (19-MarP), et le 31/07/06 à Soudaine-la-Vinadière (19-HubP).

Bruant fou (*Emberiza cia*)

● C'est le bruant des zones accidentées et ensoleillées. Un individu est observé le 21/08/04 à Compreignac (87-SotJ) et un couple le 29/08/05 à Laval-sur-Luzège (19-NorT). Sont-ils des nicheurs locaux ou des premiers hivernants ?

En effet, ce bruant est essentiellement observé à la mauvaise saison en Corrèze, notamment dans les gorges de la Dordogne. Un groupe de 40 ind. est recensé au barrage de l'aigle (19-BarJ) et pourrait indiquer l'hivernage de reproducteurs plus lointains.

Fin avril, les premiers chanteurs se manifestent : le 22/04/05 à Meymac (19-DouA) et le 29/04/06 à Aubusson (23-PalG) où la reproduction est prouvée avec un nid occupé le 06/06/06 (23-PalG), tout comme le 25/05/06 à Compreignac (87-HubP). Les deux cas concernent des carrières, donc des sites artificiels. Un couple est également observé en période de nidification le 20/06/06 à Peyrelevade (19-BouH).

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

● Une seule mention, vraisemblablement relative à un oiseau en halte migratoire, le 17/08/05 à Peyrelevade (19-ProP).

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

● La migration postnuptiale active s'échelonne du 17/10/04 à Moissannes (87-BarJ) au 06/11/04 à Flavignac (87-PreP), et du 11/10/05 au 12/11/05 à Flavignac (87-PreP).


Le bruant des roseaux recherche les zones humides pour hiverner : tourbières, étangs, lacs... 30 ind. sont regroupés le 25/12/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ) et 16 ind. le 24/12/05 au même endroit (87-BusR).

En période de reproduction, ce bruant est peu commun. Les premiers chanteurs sont entendus à l'étang de Landes le 28/03/05 (23-VirA) et le 02/04/06 (23-PalG), seul site de chant pour cette centrale. Des individus isolés sont vus en période de reproduction le 14/04/06 à la Tourbière des Dagues (87-GueK) et à l'étang de Lavaud (87-BusR) mais il peut très bien s'agir d'attardés.

Bruant proyer (*Emberiza calandra*)

● Faute de migration observée, on peut indiquer les premiers rassemblements post-nuptiaux : 7 ind. le 28/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 9 ind. le 20/08/05 à Saint-Sornin-la-Marche (87-CavP). Hormis une mention le 09/11/05 à Château-Chervix (87-EyrO), aucune donnée n'a été recueillie pour la période hivernale, l'espèce passant la mauvaise saison ailleurs.

Les plus précoces chantent le 13/04/05 à Leyrat (23-NorT) et le 01/04/06 à Azat-le-Ris (87-CavP), mais la plupart ne chantent qu'en mai ou juin, notamment en Creuse (cf. carte). S'il est difficile de dégager une chronologie particulière vu le faible nombre de données, la carte semble indiquer que les proyers sont détectés plus tardivement en Creuse exception faite de la limite berrichonne. Les derniers se font entendre le 28/06/05 à Saint-Léger-Magnazeix (87-LanJ) et le 04/07/06 à Bessines-sur-Gartempe (87-ChaG). Aucune preuve de reproduction certaine n'est enregistrée sur la période.



Présence du Bruant proyer d'avril à juin en Limousin

ERRATUM

EPOPS 73 / 3-2007

Centrale Ornithologique Limousine Août 2002 – Août 2004

Liste alphabétique des observateurs : p20-33.

Lors de la mise en page du document excel, un tableau contenant 32 observateurs est omis. Voici la liste ci-dessous :

Code	Nom et Prénom	Nbre d'invent.	Nbre de citations
DepM	DEPOUX Monique	2	2
DesF	DESAGE Fabrice	16	52
DeJm	DESBORDES Jean-Marie	1	1
DeJe	DESBRUGERES Jean-Marie	5	6
DeRa	DESCAMPS Raphaël	1	1
DesR	DESCHAMPS Roselyne	1	1
DesN	DESCHAUME Nicole	10	48
DesB	DESHOURTHEAU B.	3	3
DesJ	DESMOULIN Johan	1	1
DeRo	DESPLACES Robert	40	401
Desp	DESPLANCHES	2	2
DesS	DESRIER Sylvie	5	6
Desv	DESVILETTE	58	63
DevF	DEVIGNON Françoise	1	1
DohR	DOHOGNE R.	13	13
DoIt	DOLIVET Thierry	2	3
DouA	DOUCELIN Annick et Christian	600	5 240
DouB	DOUNIEZ Benoit	8	26
DouS	DOURSENAUD Sébastien	8	8
DubP	DUBOC Pascal	2	19
DubG	DUBOIS Gabriel	63	1 730
DubL	DUBOIS Laurent	2	2
Ducl	DUCLASSE	1	1
DucC	DUCOTE Claude	2	2
DufY	DUFFOUR Yvette	1	1
DuCh	DUMAZEAUD Christiane	1	1
DumA	DUMETRE Aurélien	255	2 333
DuCl	DUMETRE Claude	1	1
Dumi	DUMIGNARD	1	1
DupE	DUPOUX Etienne	254	2 875
DupC	DUPUY Christiane	2	2
DuqP	DUQUEROIX Pascal	3	3

Texte Pouillot fitis manquant : p133.

Cette espèce ne figure pas dans la famille des Sylviidés. Le texte s'est égaré... Désolé à Aurélien Dumètre qui avait écrit ce texte.

Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*)

La migration postnuptiale est difficile à déceler, néanmoins des migrateurs actifs sont observés le 29/08/03 à Lussat (23-DubP). Un fitis bagué en juin 2001 en Norvège est trouvé mort le 28/09/03 à Limoges (87-BouP).

Les premiers sont notés le 27/03/03 à Lussat (23-MerC) et le 04/04/04 à Neuvic (19-BarJ) et les chants se font entendre dans la foulée. L'espèce se fait plus discrète à partir de juin et sa reproduction passe inaperçue.

Texte Accenteur mouchet : p124.

Il a été mentionné : « ... ou encore garni de 7 poussins dans un nichoir le 16/05/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP) ». Il ne s'agissait pas de l'Accenteur mouchet mais de la Mésange charbonnière.

Texte Rougegorge familier : p125.

Lire : « ... un nichoir accroché sur un mur contient 4 œufs le 30/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), puis les 4 poussins débarrassés de leur duvet sont toujours présents dans le nichoir le 27/04/03 (87-BusR). » et non « ... un nichoir accroché sur un mur contient neuf œufs le 30/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), puis les 9 poussins débarrassés de leur duvet sont toujours présents dans le nichoir le 27/04/03 (87-BusR). »



Rougegorge familier, Chaillac-sur-Vienne (87), décembre 2005 (Raphaël Bussière)



Direction Régionale de l'Environnement
LIMOUSIN

