

EPOPS

Epops

73 / 3-2007

CENTRALE
ORNITHOLOGIQUE
LIMOUSINE

Août **2002**

Août **2004**



La revue
des naturalistes
du Limousin



SEPOL

DIRECTEUR DE PUBLICATION :
Pascal Boulesteix

RÉDACTEUR EN CHEF :
Askolds Vilks

CONCEPTION GRAPHIQUE :
Atelier Graphique
(imprimerie@ateliergraphique.fr)

PHOTO DE COUVERTURE :
Raphaël Bussière

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO :
BOURDIN Hugo, BUSSIÈRE Raphaël, CAVALLIN Pascal, CÉLÉRIER Jean-Michel,
CHASSAGNARD Gaston, DUMÊTRE Aurélien, DUPOUX Étienne, FLEYTOU
Ludovic, GUERBAA Karim, LABIDOIRE Bruno, MARQUET Quentin, MARTHON
Pierre, NAUDON David, PALLIER Gilles, PRADIER Isabelle, ROGER Jérôme,
SCHILTZ Olivier, VIRONDEAU Anthony.

EPOPS

la revue des naturalistes du Limousin

Bulletin de la **S**ociété pour l'**E**tude
et la **P**rotection des **O**iseaux en **L**imousin

SIÈGE SOCIAL :
11, rue Jauvion
87000 Limoges.
TÉL : 05 55 32 20 23
FAX : 05 55 32 77 46

INTERNET :
www.sepol.asso.fr
sepol@sepol.asso.fr

INFORMATIONS ORNITHOLOGIQUES :
05 55 34 12 48

COTISATIONS ET ABONNEMENTS :
Membres bienfaiteurs : 50 €
Membres actifs : 18 € + 14 € d'abonnement.
Conjoint : 11 €
Scolaires : 5 € + 14 € d'abonnement.
Abonnement seul : 16 €
Prix du numéro : 5 €

AVIS AUX LECTEURS
EPOPS ne publiant que des articles signés,
les auteurs conserveront l'entière respon-
sabilité des opinions qu'ils auront émises.

Revue éditée à 650 exemplaires
Dépôt légal à parution - ISSN 1148-4500
Numéro de Commission Paritaire 72482

CENTRALE **ORNITHOLOGIQUE** **LIMOUSINE**

Chronique des observations effectuées

entre le 16 août **2002** et le 15 août **2004**

AVANT-PROPOS

C'est dans son utilisation quotidienne que ce recueil d'observations trouve sa raison d'être. Parce qu'il est utile à chacun des observateurs, et à chacune des personnes désireuses de mieux connaître la dynamique des oiseaux de sa région, il est devenu peu à peu la bible de l'ornithologue local.

Je tiens à remercier les personnes ayant pris en charge la coordination des précédentes centrales ornithologiques, sans lesquelles, ce travail n'aurait pu voir le jour. C'est pour cette raison que j'ai voulu, à mon tour, poursuivre cet effort entrepris.

Toutefois, rien ne serait possible sans la participation des nombreux observateurs, qu'il convient d'ailleurs de remercier, puisque ce sont eux, en transmettant leurs données à la SEPOL, qui fournissent la matière première indispensable à la réalisation de cette synthèse.

Il est nécessaire de citer également chacun des différents rédacteurs pour leur patient travail accompli.

Cet ouvrage, qui contient un peu de tous, est une œuvre commune de passionnés.

Pour encore plein de belles observations...

Raphaël BUSSIÈRE



Raphaël Bussière

SOMMAIRE

■ MÉTHODE	p.5
CHIFFRES ET STATISTIQUES	p.5
LISTE DES 10 ESPÈCES OBSERVÉES LE PLUS FRÉQUEMMENT.....	p.10
LISTE DES 38 ESPÈCES ET 4 SOUS-ESPÈCES OBSERVÉES MOINS DE 5 FOIS	p.10

LISTE DES 228 ESPÈCES ET 4 SOUS-ESPÈCES OBSERVÉES EN LIMOUSIN.....	p.12
LISTE ALPHABÉTIQUE DES OBSERVATEURS.....	p.20
LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX ÉTANGS DU LIMOUSIN.....	p.34
CHRONIQUE RÉALISÉE PAR.....	p.35
LISTE DES AUTEURS	p.35

■ LISTE DES ESPÈCES OBSERVÉES	p.37
Gaviidés.....	p.38
Podicipédidés.....	p.38
Sulidés.....	p.40
Phalacrocoracidés	p.41
Ardéidés	p.42
Ciconiidés.....	p.45
Threskiornithidés.....	p.47
Anatidés	p.47
Accipitridés	p.57
Pandionidés	p.67
Falconidés	p.68
Phasianidés.....	p.70
Rallidés	p.71
Gruidés.....	p.73
Curvirostridés.....	p.76
Burhinidés	p.77
Charadriidés	p.77
Scolopacidés.....	p.81
Stercorariidés.....	p.89
Laridés	p.89
Sternidés	p.92
Columbidés.....	p.95
Cuculidés.....	p.102
Tytonidés	p.103
Strigidés	p.104

Caprimulgidés.....	p.106
Apodidés	p.107
Alcedinidés.....	p.108
Méropidés	p.108
Upupidés	p.108
Picidés.....	p.109
Alaudidés	p.111
Hirundinidés	p.113
Motacillidés	p.117
Cinclidés	p.122
Troglodytidés	p.123
Prunellidés	p.124
Turdidés	p.125
Sylviidés.....	p.133
Muscicapidés	p.138
Aegithalidés	p.139
Paridés	p.139
Sittidés.....	p.142
Tichodromadidés.....	p.142
Certhiidés	p.143
Oriolidés	p.143
Laniidés	p.144
Corvidés	p.146
Sturnidés	p.149
Passéridés	p.150
Fringillidés.....	p.152
Emberizidés.....	p.156

Méthode

Cette chronique traite des observations effectuées entre le 16/08/02 et le 15/08/04 soit deux migrations postnuptiales, deux hivernages, deux migrations prénuptiales et deux saisons de nidification.

Lors de chaque occasion d'observation, l'ornithologue remplit une fiche appelée inventaire. Chaque espèce mentionnée dans un inventaire (quel que soit l'effectif concerné) constitue une citation.

Les observations sont de l'entière responsabilité de leurs auteurs.

Cette centrale synthétise :

	Inventaires	Citations
2002/2003	8 608	48 416
2003/2004	9 367	50 924



Chiffres et Statistiques

● Prospection par département



Durant cette période, parmi les 751 communes que compte le Limousin, 590 ont reçu au moins une fois la visite d'un ornithologue. Le tableau ci-dessous illustre l'intensité de la prospection pour chaque département du Limousin.

Départements	Nbre de communes dans dépt.	Nbre de communes prospectées	Nbre d'inventaires	Nbre de citations	Nbre d'espèces
Corrèze (19)	287	217	3 305	18 512	200
Creuse (23)	261	180	3 044	22 236	233
Haute-Vienne (87)	203	193	11 626	58 592	233

● **Carte de répartition du nombre de fiches par km² entre le 16/08/02 et le 15/08/04.**



● **Histogrammes du nombre d'inventaires
et de citations entre le 16/08/02 et le 15/08/04.**




- **Les 10 jours durant lesquels fut effectué le plus grand nombre d'inventaires.**


Date	Nbre d'inventaires	Date	Nbre d'inventaires
19/10/03	399	09/03/03	121
20/10/02	348	24/04/04	118
21/04/04	154	11/01/03	115
15/10/03	153	25/04/04	113
12/01/03	125	18/01/04	111

- **Les 10 journées les plus riches en nombre d'espèces.**

Date	Nbre d'espèces	Date	Nbre d'espèces
20/04/03	116	04/04/04	105
02/05/04	114	18/05/03	100
27/04/03	112	09/03/03	100
21/04/04	110	12/04/04	99
24/04/04	106	11/04/04	98

- **Répartition de la pression d'observation au cours de la semaine avec le nombre d'inventaires et le nombre de citations.**





● **Liste des 15 communes où plus de 90 espèces d'oiseaux ont été observées durant la période considérée.**

Dépt.	Commune	Nbre d'espèces
23	Lussat	190
87	Flavignac	132
87	Limoges	118
19	Neuvic	112
87	Videix	109
87	St-Léger-la-Montagne	101
87	Oradour-Saint-Genest	101
87	Cieux	100

Dépt.	Commune	Nbre d'espèces
87	Azat-le-Ris	100
87	Saint-Yrieix-la-Perche	98
23	Le Grand-Bourg	97
19	Meymac	94
87	St-Germain-les-Belles	93
87	La Roche-l'Abeille	93
87	Aixe-sur-Vienne	93

● **Répartition du nombre d'espèces observées par commune.**

Nbre Espèces	Nbre Communes
1-5	194
6-10	55
11-25	105
26-50	137

Nbre Espèces	Nbre Communes
51-75	62
76-100	28
101-150	8
>= 151	1

**Liste des 10 espèces observées le plus fréquemment
du 16/08/02 au 15/08/04**

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de reproduction
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	7 769	Certain
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	7 759	Certain
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3 858	Certain
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3 226	Certain
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2 687	Certain
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	2 610	Certain
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2 517	Certain
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	2 422	Certain
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2 362	Certain
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2 265	Certain

**Liste des 38 espèces et 4 sous-espèces
observées 5 fois et moins**

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	1
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	1
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	1
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	1

Suite p11

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	1
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	1
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	1
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	2
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	2
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	2
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	2
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	2
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	2
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	2
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	2
Bergeronnette de Yarrell	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	2
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	2
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	3
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	3
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	3
Bergeronnette printanière flavissima	<i>Motacilla flava flavissima</i>	3
Bergeronnette printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	3
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	3
Pouillot véloce ibérique	<i>Phylloscopus collybita brehmii</i>	3
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	3
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	4
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	4
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	4
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	4
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	4
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	4
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	4
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	4
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	4

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	4
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	4
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	5
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	5
Vanneau sociable	<i>Chettusia gregaria</i>	5
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	5
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	5

**Liste des 228 espèces et 4 sous-espèces observées
du 16/08/02 au 15/08/04**

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	1	
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	4	
Plongeon imbrin	<i>Gavia immer</i>	3	
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	274	Certain
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	933	Certain
Grèbe esclavon	<i>Podiceps auritus</i>	4	
Grèbe à cou noir	<i>Podiceps nigricollis</i>	35	Probable
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	1	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1 206	Probable
Butor étoilé	<i>Botaurus stellaris</i>	4	Possible
Bihoreau gris	<i>Nycticorax nycticorax</i>	69	Certain
Héron garde-boeufs	<i>Bubulcus ibis</i>	12	
Aigrette garzette	<i>Egretta garzetta</i>	97	Certain
Grande Aigrette	<i>Casmerodius albus</i>	290	
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1 299	Certain
Héron pourpré	<i>Ardea purpurea</i>	103	Certain
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	60	Possible
Cigogne blanche	<i>Ciconia ciconia</i>	60	Possible

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Ibis sacré	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	9	
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	159	Certain
Oie cendrée	<i>Anser anser</i>	36	
Bernache du Canada	<i>Branta canadensis</i>	6	
Ouette d'Égypte	<i>Alopochen aegyptiacus</i>	11	
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	7	
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	36	
Canard mandarin	<i>Aix galericulata</i>	9	
Canard siffleur	<i>Anas penelope</i>	161	Possible
Canard chipeau	<i>Anas strepera</i>	176	Certain
Sarcelle d'hiver	<i>Anas crecca</i>	326	Probable
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	1 582	Certain
Canard pilet	<i>Anas acuta</i>	49	
Sarcelle d'été	<i>Anas querquedula</i>	58	Possible
Canard souchet	<i>Anas clypeata</i>	157	Probable
Nette rousse	<i>Netta rufina</i>	20	
Fuligule milouin	<i>Aythya ferina</i>	349	Certain
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	2	
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	110	Probable
Fuligule milouinan	<i>Aythya marila</i>	4	
Macreuse brune	<i>Melanitta fusca</i>	7	
Garrot à oeil d'or	<i>Bucephala clangula</i>	23	
Harle piette	<i>Mergellus albellus</i>	5	
Harle bièvre	<i>Mergus merganser</i>	26	
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	405	Certain
Milan noir	<i>Milvus migrans</i>	566	Certain
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	801	Certain
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	3	
Circaète Jean-le-blanc	<i>Circaetus gallicus</i>	58	Certain
Busard des roseaux	<i>Circus aeruginosus</i>	98	Probable
Busard Saint-Martin	<i>Circus cyaneus</i>	552	Certain
Busard cendré	<i>Circus pygargus</i>	7	Possible

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Autour des palombes	<i>Accipiter gentilis</i>	39	Certain
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	374	Certain
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1 687	Certain
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	1	
Aigle botté	<i>Aquila pennata</i>	62	Certain
Balbuzard pêcheur	<i>Pandion haliaetus</i>	118	
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	536	Certain
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	6	
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	25	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	155	Certain
Faucon pèlerin	<i>Falco peregrinus</i>	333	Certain
Perdrix rouge	<i>Alectoris rufa</i>	46	Probable
Perdrix grise	<i>Perdix perdix</i>	5	Possible
Caille des blés	<i>Coturnix coturnix</i>	46	Probable
Faisan vénéré	<i>Syrnaticus reevesii</i>	2	
Faisan de Colchide	<i>Phasianus colchicus</i>	242	Certain
Râle d'eau	<i>Rallus aquaticus</i>	29	Possible
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	4	Possible
Râle des genêts	<i>Crex crex</i>	6	Possible
Gallinule poule-d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>	250	Certain
Foulque macroule	<i>Fulica atra</i>	572	Certain
Grue cendrée	<i>Grus grus</i>	1 724	
Echasse blanche	<i>Himantopus himantopus</i>	4	
Avocette élégante	<i>Recurvirostra avosetta</i>	13	
Oedicnème criard	<i>Burhinus oedicnemus</i>	24	Certain
Petit Gravelot	<i>Charadrius dubius</i>	62	Certain
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	11	
Gravelot à collier interrompu	<i>Charadrius alexandrinus</i>	1	
Pluvier doré	<i>Pluvialis apricaria</i>	27	
Pluvier argenté	<i>Pluvialis squatarola</i>	4	
Vanneau sociable	<i>Chettusia gregarius</i>	5	
Vanneau huppé	<i>Vanellus vanellus</i>	542	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Bécasseau maubèche	<i>Calidris canutus</i>	1	
Bécasseau sanderling	<i>Calidris alba</i>	4	
Bécasseau minute	<i>Calidris minuta</i>	5	
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	2	
Bécasseau variable	<i>Calidris alpina</i>	24	
Combattant varié	<i>Philomachus pugnax</i>	32	
Bécassine sourde	<i>Lymnocyrtus minimus</i>	8	
Bécassine des marais	<i>Gallinago gallinago</i>	118	Possible
Bécasse des bois	<i>Scolopax rusticola</i>	242	Probable
Barge à queue noire	<i>Limosa limosa</i>	5	
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	2	
Courlis corlieu	<i>Numenius phaeopus</i>	1	
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	19	
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	13	
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	41	
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	52	
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	142	
Chevalier sylvain	<i>Tringa glareola</i>	19	
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	217	Possible
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	3	
Mouette mélanocéphale	<i>Larus melanocephalus</i>	4	
Mouette pygmée	<i>Larus minutus</i>	9	
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	226	Certain
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	7	
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	2	
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	10	
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	28	
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	2	
Sterne caugek	<i>Sterna sandvicensis</i>	1	
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	8	
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	1	
Guifette moustac	<i>Chlidonias hybrida</i>	36	Possible

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Guifette noire	<i>Chlidonias niger</i>	43	
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	18	
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>	166	Possible
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	7 759	Certain
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	1 136	Certain
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>	549	Certain
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	1 020	Certain
Effraie des clochers	<i>Tyto alba</i>	240	Certain
Grand-duc d'Europe	<i>Bubo bubo</i>	16	Certain
Chevêche d'Athéna	<i>Athene noctua</i>	174	Certain
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	224	Certain
Hibou moyen-duc	<i>Asio otus</i>	62	Certain
Hibou des marais	<i>Asio flammeus</i>	2	
Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>	11	Certain
Engoulevent d'Europe	<i>Caprimulgus europaeus</i>	62	Certain
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	754	Certain
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	317	Certain
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	13	Possible
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	405	Certain
Torcol fourmilier	<i>Jynx torquilla</i>	25	Probable
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	907	Certain
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	199	Certain
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	970	Certain
Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>	58	Probable
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	131	Probable
Alouette lulu	<i>Lullula arborea</i>	826	Certain
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	2 086	Certain
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	78	Certain
Hirondelle de rochers	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	33	Certain
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	2 687	Certain
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	486	Certain
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	522	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	1 627	Certain
Pipit spioncelle	<i>Anthus spinoletta</i>	40	Probable
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	204	Possible
Berg. printanière flavissima	<i>Motacilla flava flavissima</i>	3	
Berg. printanière nordique	<i>Motacilla flava thunbergi</i>	3	
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	297	Certain
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	1 254	Certain
Bergeronnette de Yarrell	<i>Motacilla alba yarrellii</i>	2	
Cincle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>	114	Certain
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	2 265	Certain
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	577	Certain
Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>	4	
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	2 362	Certain
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	829	Certain
Gorgebleue à miroir	<i>Luscinia svecica</i>	4	
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	935	Certain
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	285	Certain
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	118	Probable
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquatus</i>	881	Certain
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	165	Certain
Merle à plastron	<i>Turdus torquatus</i>	24	
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	3 858	Certain
Grive litorne	<i>Turdus pilaris</i>	237	Probable
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>	1 491	Certain
Grive mauvis	<i>Turdus iliacus</i>	236	
Grive draine	<i>Turdus viscivorus</i>	956	Certain
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	39	Certain
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	26	Certain
Rousserolle effarvate	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	34	Probable
Phragmite des joncs	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	3	Possible
Hypolaïs polyglotte	<i>Hippolais polyglotta</i>	320	Certain
Fauvette pitchou	<i>Sylvia undata</i>	29	Probable

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	332	Certain
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	131	Certain
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	3 226	Certain
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	177	Certain
Pouillot siffleur	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	107	Certain
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	2 422	Certain
Pouillot véloce ibérique	<i>Phylloscopus collybita brehmii</i>	3	
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	161	Probable
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	221	Certain
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	313	Probable
Gobemouche gris	<i>Muscicapa striata</i>	78	Certain
Gobemouche noir	<i>Ficedula hypoleuca</i>	110	Possible
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	594	Certain
Mésange nonnette	<i>Parus palustris</i>	327	Certain
Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>	23	Probable
Mésange huppée	<i>Parus cristatus</i>	104	Certain
Mésange noire	<i>Parus ater</i>	133	Certain
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	1 780	Certain
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	2 517	Certain
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	767	Certain
Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>	42	Possible
Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>	9	Possible
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	817	Certain
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	609	Certain
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	338	Certain
Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>	60	Certain
Pie-grièche à tête rousse	<i>Lanius senator</i>	76	Certain
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	1 340	Certain
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	847	Certain
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	264	Certain
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	217	Certain
Corneille noire	<i>Corvus corone</i>	2 621	Certain

Nom français	Nom scientifique	Nbre citations	Statut de repro.
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	138	Certain
Étourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	1 729	Certain
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	1 534	Certain
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	84	Certain
Moineau soulcie	<i>Petronia petronia</i>	6	Certain
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	7 769	Certain
Pinson du Nord	<i>Fringilla montifringilla</i>	282	
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	377	Certain
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	689	Certain
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	1 250	Certain
Tarin des aulnes	<i>Carduelis spinus</i>	283	Possible
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	619	Certain
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>	3	
Bec-croisé des sapins	<i>Loxia curvirostra</i>	88	Possible
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	296	Certain
Grosbec casse-noyaux	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	226	Certain
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	715	Certain
Bruant zizi	<i>Emberiza cirius</i>	362	Certain
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>	36	Probable
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>	2	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>	242	Probable
Bruant proyer	<i>Miliaria calandra</i>	39	Probable

**Liste alphabétique des observateurs
avec les abréviations employées dans les différents textes.**

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
AlaS	ALARY Stéphane	1	1
AlbD	ALBESSARD Dominique	152	461
AliM	ALIPHAT Michèle	1	1
Alix	ALIX	1	1
ArcG	ARCANGELI Geneviève	1	1
Arde	ARDENT	1	1
ArmM	ARMUAD Mireille	2	2
ArnL	ARNAUD Louis	35	105
AthG	ATHENA Gilbert	1	1
AudA	AUDEVARD Aurélien	3	14
AudJ	AUDOUEINEIX Jean-Paul	4	6
BadF	BADEROT Flavier	9	9
BarJ	BARATAUD Julien	440	2 344
BarM	BARATAUD Michel	15	52
BarP	BARBAUD Pierre	42	44
BaMa	BARDINAL Marc	2	18
BarC	BARDINON Catherine	2	2
BarN	BARON Nicolas	2	2
BarV	BARRET Véronique	1	1
BarD	BARRIERE Damien	1	1
BarP	BARRY Philippe	57	63
BarG	BARTHELEMY Gilles	16	48
BasP	BASTHIER Pierre	1	1
Bato	BATOUX	1	1
Baus	BAUSSIAN	1	1
BavA	BAVET André	2	2
BayA	BAYLE Arnaud	4	6
BecM	BECAULT Mélanie	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
Bele	BELIER	1	12
BelC	BELJEAN Christiane	1	1
BelG	BELLOU Ginie	1	1
BerA	BERLIZON Audrey	1	1
BerM	BERNARD Michel	2	2
BerF	BERRUBE François	23	83
BesM	BESLOU Maurice	1	1
Beyn	BEYNOT	1	1
BieJ	BIENVENU Jean-Michel	155	1 797
Blai	BLAIS	1	1
BlaB	BLANCHON Baptiste	1	1
Blal	BLAVIGNAC Isabelle	15	59
BloF	BLONDEAU Francis	1	1
Blon	BLONDIN	1	1
BoiJ	BOIN Jacqueline	2	2
BoiE	BOISSIERE Emmanuel	2	2
BoIJ	BOLLINGER Jean-Claude	1	1
BomV	BOMBEAUX Valérie	1	2
Bonh	BONHOMME	2	9
BonP	BONTEMPS Patrick	2	2
BosG	BOST Guy	4	35
Boul	BOUDARD Isabelle	41	107
BouJ	BOULEAU Jean-Marc	1	1
BouP	BOULESTEIX Pascal et PAILLER Christelle	279	2 329
BouH	BOURDIN Hugo	19	45
BouS	BOURGEOIS Simone	1	1
Bout	BOUTURIE	1	1
BoMI	BOUVIER Marie-Laure et Paule	20	27
BoMc	BOUVIER Marie-Claire	3	15
BouM	BOUVIER Michel	8	118

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
Boye	BOYER	1	1
BoAr	BOYER Armande	1	1
BoAl	BOYRON Alain	2	2
BraS	BRANGE Sébastien	1	1
BraM	BRAVARD Marie-Christine	1	1
Bret	BRETONNOUX	1	1
BriM	BRISSET Mathilde	1	1
BroM	BROUSSE Murielle	2	2
BruB	BRUNET Bernard	3	3
Buis	BUISSON	2	2
BuiM	BUISSON Marcel	6	6
BurJ	BURGUET Jacques et Pascale	46	453
BusP	BUSSER Philippe	1	3
BusR	BUSSIERE Raphaël	431	2 609
ButL	BUTEL Lucile	2	4
Buto	BUTOIS	1	1
CacJ	CACAUD Jean-Claude	1	2
CacM	CACAUD Marylène	2	4
CarS	CARMONA Serge	43	105
CauD	CAUDY Danielle	1	1
CavP	CAVALLIN Pascal	818	3 647
CelJ	CELERIER Jean-Michel	394	1 962
CenS	CENTRE DE SOINS	260	260
CeyF	CEYRAC François	6	7
ChMr	CHABASSIER Marcel	1	1
ChaE	CHABAUD Eliane	1	1
ChaD	CHABROL Daniel	1	1
ChaL	CHABROL Laurent	3	5
ChaA	CHAMBRET Annie	1	1
ChaR	CHAMINADE Roger	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
ChaS	CHARBONNEL S.	6	6
Chal	CHARISSOU Isabelle	64	96
ChaG	CHASSAGNARD Gaston	41	225
ChaF	CHASSAIN Françoise et DESSAGNE Robert	1	1
ChMi	CHASTAGNER Michel	2	2
ChJm	CHASTANET Jean-Marie	49	144
ChJp	CHATEAU Jean-Pierre	2	2
ChSt	CHAULIER Stéphane	21	21
ChMa	CHAUMEIL Jean-Marie	21	66
ChDa	CHAUPRADE Daniel	1	1
Chau	CHAUSSAT	1	1
ChAm	CHAUVIGNAT Anne-Marie	1	1
ChaJ	HAZELAS JM.	1	1
CheM	CHERON Michel	1	1
CheJ	CHEVAINE Jean-Marie	1	3
ChiR	CHILLOU Robert	1	1
Chol	CHOLET	1	1
ChoP	CHOLET Patrice	3	4
CNN	CLUB NATURE DE NEUVIC	83	247
CNG	CLUB NATURE La Genette	13	16
CSGB	Collège de Saint-Germain-les-Belles	6	6
CoID	COLMAN David	105	639
ComP	COMBROUZE Philippe	2	3
ComF	COMMENVILLE François	1	1
CPC	Compagnie des Pays Creusois	1	1
CSP 87	Conseil Supérieur de la Pêche 87	33	33
CREN	CREN du Limousin	15	80
CoqM	COQ Michel et MARTIN Jacqueline	40	334
Cora	CORA	1	3
CorA	CORIVEAU André et PERRIER Solange	301	2 291

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
CorS	CORNILLE Sabine	2	11
CotD	COT Didier	5	5
CouC	COUARTOU Christian et Sylvie	275	772
CouR	COUTANT Régis	149	1 107
CreD	CREMOUX Danielle et Jean-Louis	320	2 068
CrRa	Creuse Randonnée	4	4
DasS	DA SILVA Stéphanie	2	3
DalS	DALLE Serge	1	1
DauR	DAURIAC Roger	88	525
DeBe	DE BELLEFON	2	2
DeVe	DE LAVARDE Véronique	2	2
DeAl	DE REYNAL Alain et Marie-Luce	1	1
DebC	DEBIARD Chantal	3	3
DefP	DEFONTAINES Pierre et Fifaliana	65	106
DelG	DELANIER G.	1	1
Dele	DELEBASSE	2	2
DelP	DELLA VALLE Philippe	18	31
DelS	DELORD Sylvie	3	4
Delp	DELPEYROUX	2	2
DelC	DELSOL Christian	3	3
DemT	DEMAISON Toutou	13	13
Dema	DEMAN	1	1
DemM	DEMAZOIN Michel	1	1
Depa	DEPALLE	13	13
DurC	DURAND Christelle	1	1
DurM	DURAND Mireille	1	1
DurA	DURANEL Arnaud	7	19
DurP	DUREPAIRE Philippe	1	1
DuvJ	DUVAL Jacqueline	2	2
DuvF	DUVOUX F.	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
EyrG	EYRAUD Gérard	6	8
EyrO	EYRAUD Olivier	560	3 178
FacP	FACQUET Philippe et Catherine	114	944
FaiG	FAIVRE Gilles	2	2
FauF	FAUBERT Frédéric	1	1
FauJ	FAUCHIER Jean-Marie	2	2
FauF	FAURE Fernand	2	2
FauB	FAURIE Bernard et Catie	244	1 582
FauC	FAURIE Catherine	1	1
Faye	FAYE	2	2
FeuB	FEUGERE Benoit	18	20
FitV	FITRZYK Véronique	5	7
FIJp	FLEYTOU Jean-Paul et LUDOVIC Viviane	21	295
FleL	FLEYTOU Ludovic	23	252
FloJ	FLOTTES Jacques	1	1
FonR	FONTALBE Robert	2	2
FouD	FOURNET Didier	1	2
FouA	FOURNIER Anne-Cécile	1	2
FouJ	FOURNIER Jean-Claude	5	5
FouR	FOURNIER Robert	1	1
FraP	FRAYSSE Pierre	1	1
GalC	GALLAND Catherine	9	9
GanA	GANDOIS Anne	2	2
Garr	GARRE	1	1
GasB	GASPARD Bernadette	2	2
GauM	GAUTHIER Michel et LALANNE Arlette	7	26
GauR	GAUTHIER Robert	665	2 946
GayJ	GAYAUD Jean-Pierre	30	109
GenC	GENDRE Christian et son fils Nicolas	36	403
GenS	GENEST Sébastien	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
GenG	GENESTE Guillaume	109	649
GerA	GERALD Albert	4	4
GerP	GERBAUD Paul	1	1
GibG	GIBAUD Guy	1	1
Gira	GIRAUD	9	9
GorV	GORCE Vincent	1	1
GorP	GORSIC Pierre	5	6
Gour	GOURDAN	1	1
Graf	GRAFEUILLE	1	1
GraP	GRAVEY Patrick	1	1
GreG	GRENARD Giselle	1	1
Grie	GRIETJE DE BRUIN	2	2
GueK	GUERBAA Karim et MARNIER Sophie	52	227
GuiL	GUIOT Laurent	1	1
GuiV	GUISCHER Valérie	11	46
GuiN	GUISELIN Nicolas	1	1
Guit	GUITTON	2	2
Hadj	HADJADI	1	1
HagM	HAGERMAN Marie-Claire	9	10
HenE	HENNEQUIN Erwan	4	7
HenA	HENRY Alexandre	1	1
HerS	HERVE Samuel	1	16
HipS	HIPPOLYTE Stéphane	1	4
Hira	HIRAT	1	1
Homb	HOMBERGEN	2	2
HorC	HOREAU Christian	1	2
HubC	HUBER Catherine	1	1
HubP	HUBERT Philippe	226	1 742
JalC	JALLAGEAS Cyrille	1	1
JamJ	JAMMET Jean-Paul	2	2

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
JarG	JARRETY Gilberte	1	2
JeaM	JEANDAIN Michel	1	1
JenG	JENIVER Gwendolyn	1	1
JoiM	JOINETEAU Marinette	1	1
JugP	JUGE Pierre	2	2
JuiR	JUILLIARD Romain	14	181
LabB	LABIDOIRE Bruno	1 100	4 400
LabD	LABIDOIRE David	133	253
LabG	LABIDOIRE Guy et CHAMARAT Noëlle	32	760
LabP	LABIDOIRE Patrick	31	227
LabA	LABROUSSE André	1	1
LacF	LACHAUD François	2	6
Laco	LACOMBE	1	1
LacB	LACORRE Benoît	8	40
LafJ	LAFON Jacqueline	7	7
LaJ	LALUQUE Jacques	1	1
LamN	LAMBERT Nicolas	62	566
Lami	LAMIELLE	1	1
LamA	LAMONERIE André	3	3
LaLa	LANDRIN Laurence	11	11
LanJ	LANGENBACH Jean-Claude	683	3 025
LapL	LAPORTE Lucienne	1	1
LapM	LAPRUN Mathias	14	36
LaqE	LAQUET Ewan	4	4
LarR	LARDY Rachel	1	1
Lari	LARIVIERE	1	1
LarG	LAROCHE Guy	1	1
LarM	LAROUDIE Maryse	4	4
LarP	LAROUDIE Pascal	4	4
LasL	LASAT Léa	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
LasM	LASSALLE Marie-Noëlle	2	2
LasS	LASSIALE Simone	1	1
LauF	LAUBIE François	7	7
LauA	LAURENT Amandine	2	2
LauC	LAURENT Christelle	1	2
LaMc	LAVAL Marie-Christine	1	1
LavM	LAVALEE Madelaine	8	12
LavJ	LAVAUD J.P	2	2
Lave	LAVENTURE	1	1
LerJ	Le ROUGERE Jean-Marie	1	1
LerK	LE ROUX Karine	6	12
LebJ	LEBERT Jeannine	6	18
LebF	LEBLANC Frédéric	1	1
LebA	LEBRETON Alexis	7	12
LecE	LECAVELIER Eloi	5	5
LecJ	LECHEVALIER Jacques	1	1
Lefe	LEFEBVRE	1	1
LefP	LEFORT Philippe	26	26
LenA	LENCROZ Amielle	1	4
LerT	LEROY Thierry	3	7
LerJ	LERY Jean-Pierre	96	212
LieB	LIEGEOIS Bernard	1	1
LinJ	LINET Jean-Claude et Cathy	5	5
Lope	LOPEZ	8	8
Lorc	LORCIN	1	1
LouR	LOUIS Roland	1	1
LpoA	LPO Auvergne	3	22
LpoR	LPO Rochefort	1	1
MacA	MACHAT Agnes	1	1
MacG	MACHET Huguette	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
Made	MADEFEIX	1	1
MagJ	MAGNONNEAU Jean-Pierre	1	1
MalB	MALIVERT Brigitte	1	1
MamJ	MAMALET Jacqueline	1	1
Mane	MANEIX	1	1
MarL	MARBOUTIN Lionnel	6	6
MarY	MARBOUTY Yannick	1	1
MarG	MARCELOT Georges	1	1
MarA	MARMONIER Alain	1	1
MarR	MARNEIX Raymond	9	12
MarS	MARNIER Sophie	2	2
MarJ	MARQUET Joel	1	1
MarP	MARQUET Patrick	81	827
MarQ	MARQUET Quentin	101	483
MaPi	MARTHON Pierre	2	7
MaRi	MARTIN Richard	1	1
MasG	MASSARD Guillaume	1	1
MatJ	MATERAC Jean-Jacques	1	1
Maur	MAURICE	1	3
MazS	MAZAUD Serge et CHARISSOU Isabelle	1	1
MenG	MENANT Gilles	1	1
MenA	MENOT Annie	1	1
MerC	MERCIER Christophe	299	782
MerD	MERIGAUD Dominique	1	1
MeCl	MERIGUET Claude	1	1
MetJ	METOUX Justine	3	3
MeuD	MEUNIER David	1	1
MicJ	MICHEL Jérôme	4	4
Mich	MICHINEAU	1	1
Mign	MIGNOT	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
MigF	MIGOT Frédéric	20	40
MilM	MILON Marc	2	2
MorS	MORELON Stéphane et Elodie	263	1 899
MorN	MORON Nicolas	3	6
MorD	MORZYNSKI Dominique	4	4
MosJ	MOSSE Johan	11	28
MouA	MOURNETAS Aubert	1	1
MouE	MOUTON Emilie	1	2
MuP	MULLER Pierre	1	4
NarF	NARDOT Francis	1	1
NauD	NAUDON David	178	1 314
NauM	NAUDON Mathieu	4	11
NauP	NAURON Pascal	82	515
NauF	NAUWYNCK Fabienne	1	1
NedS	NEDELLEC Sébastien	44	229
NicC	NICAUD Camille et Josette	1	1
NicV	NICOLAS Vincent	3	55
Nord	NORDI	4	4
NorT	NORE Thérèse	756	4 128
NutJ	NUTTIN Johnny	5	5
OIJ	OLLIER Jean-Paul	4	7
Page	PAGES	1	1
PaiM	PAILLER Marie	1	1
PalG	PALLIER Gilles	79	882
PatA	PATAUD A.	2	7
PatR	PATAUD Raymond	11	11
PatN	PATUREAU-MIRAND Nicolas	2	2
PeIB	PELLEGRINI Benjamin	1	1
PenD	PENOT D.	1	1
PerJ	PERROCHEAU Joachim	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
PetC	PETIT Christiane	1	1
PezP	PEZANT P.	11	12
Pier	PIERDON	1	1
PieA	PIERRERIE André	1	1
PigH	PIGEYRE Henri	1	1
PinD	PINAUD David	2	9
PinH	PINEAUD Hervé	4	4
PioJ	PIOLLET Jean-Michel	12	14
PlaD	PLANCHON Daniel	1	1
PIDa	PLANQUE David	1	1
PloA	PLOEGER Aidy	9	9
PotG	POTTIER Gilles	1	30
PouG	POUGET Gaëlle	9	9
PraF	PRADEAU Fred	6	6
Pral	PRADIER Isabelle	301	1 133
PreP	PRECIGOUT Patrick	1 824	9 967
PreS	PRESSIGNAC Stéphanie	1	1
Prev	PREVOST	4	16
PriV	PRIMAULT Vincent	7	8
PruG	PRUDENT Georges et Brigitte	19	21
Puyb	PUYBERTIER	1	1
RatE	RATHIER Emmanuel	9	35
RayP	RAYNARD Philippe	1	1
RayA	RAYNAUD André et Solange	142	485
RayG	RAYNAUD Guillaume	4	9
RedB	REDON SARRAZY Baptiste	1	1
ReiG	REIX Gilles	1	1
RenD	RENSON Didier	3	8
ReyG	REYMANN Gisèle	2	2
ReyA	REYNIER Arnaud	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
RicA	RICHARD André	1	1
RioR	RIOLS Romain	1	2
RobS	ROBERT Sylvain	239	1 511
RogJ	ROGER Jérôme	244	1 635
Rose	ROSEMONDE	1	1
Rouf	ROUFFIGNAC	1	1
RouA	ROUMILHAC André	31	33
RouM	ROUSSEAU Madelaine	1	1
RouL	ROUX Laurent	1	1
RoyH	ROYER Huguette	1	1
RoyM	ROYER Michel	1	1
RubB	RUBAGOTTI Bruno	1	1
RuiE	RUIZ Emmanuel	1	1
SanJ	SANCHEZ Jacqueline	3	55
SauJ	SAUTOUR Jean-Christophe et GUISSER Valérie	197	1 887
SauD	SAUVESTRE Denis	1	1
SchO	SCHILTZ Olivier	11	24
SchB	SCHIRMER Bruno	8	19
SchL	SCHMITZ Laurent	8	118
SebE	SEBBAN Eric	1	1
SegB	SEGUY Bruno	25	62
SelP	SELIQUER Pierre	72	159
SEPOL	SEPOL	86	142
SirD	SIRIEIX David	3	3
SmiN	SMITH Nigel	12	24
SolV	Soleil Vert	5	16
SotJ	SOTTIER Jérôme	273	502
SouM	SOULESTIN Marcel	1	1
SouP	SOULIER Pierrick	35	85
Soun	SOUNY	1	1

Code	Nom et prénom	Nbre d'inventaires	Nbre de citations
SouH	SOURISSEAU Huguette	1	1
SpoF	SPONVILLE Françoise	1	1
StaB	STARCK Bruno	1	2
TanD	TANGUY Deville	1	1
TarE	TARAVAUD Eric	226	2 443
TeuJ	TEULIERE Jean-Michel	98	229
TexF	TEXIER Flavier	1	1
TheM	THEVENET Michel	1	1
ThiP	THIBIER Patrick	13	15
ThoF	THOMAS Frédéric	85	446
ThuB	THUAIRE Benoît	27	145
ThuN	THUAIRE Nicolas	71	495
TixJ	TIXIER Jean	1	1
TriG	TRICONE Gérard	1	1
Trou	TROUBAT	1	1
TuIY	TULOUP Yves	63	392
ValJ	VALADE Joëlle	10	11
VarC	VARIERAS Christian	76	638
VerJ	VERINAUD Josselin	1	1
VerP	VERRIER Philippe	1	1
VigY	VIGNANE Yves	32	51
Vign	VIGNERON	1	2
VilA	VILKS Askolds	41	435
VilO	VILLA Olivier	21	963
VinM	VINCENT Michel et Nelly	4	7
VinS	VINCENT Sylvain	167	643
VirA	VIRONDEAU Anthony	183	1 111
VirJ	VIRONDEAU Jean-Pierre	2	2
VonP	VONE Pierre	1	1
WatL	WATTERBLED Laurent	1	1
YveJ	YVERNAULT Jérôme	15	20

Liste alphabétique des plans d'eau du Limousin cités dans les textes.

(Le nom de la commune est écrit en caractères gras)

- Barrage de Chauvant (**87, Saint-Priest-Taurion**)
- Barrage de Marèges (**19, Ligniac**)
- Barrage de l'Aigle (**19, Soursac**)
- Barrage de la Triouzoune (**19, Neuvic**)
- Barrage du Chat Cros (**23, Évaux-les-Bains**)
- Etang Baudy (**87, Saint-Yrieix-la-Perche**)
- Etang de Belle perche (**87, Oradour-Saint-Genest**)
- Etang de Boutilly (**87, Azat-le-Ris**)
- Etang de Cante (**23, Chénérailles**)
- Etang de Chabannes (**19, Tarnac**)
- Etang de Champegaud (**23, Guéret**)
- Etang de Chareneuve (**19, Palisse**)
- Etang de Chavaignac (**87, Peyrilhac**)
- Etang de Cherchaud (**19, Montgibaud**)
- Etang de Cieux (**87, Cieux**)
- Etang de Forge Neuve (**87, Meuzac**)
- Etang de Gouzon (**23, Gouzon**)
- Etang de Labassat (**23, Saint-Junien-la-Brégère**)
- Etang de Landes (**23, Lussat**)
- Etang de Lavaud (**87, Videix**)
- Etang de Lavillemichel (**87, Bessines-sur-Gartempe**)
- Etang de Maubrant (**23, Lizières**)
- Etang de Murat (**87, Saint-Léger-Magnazeix**)
- Etang de Peyranche (**87, Oradour-Saint-Genest**)
- Etang de Peyrelevade (**19, Peyrelevade**)
- Etang de Puycheny (**87, Saint-Hilaire-les-Places**)
- Etang de Poncharal (**87, Vigeois**)
- Etang de Taysse (**19, Espagnac**)
- Etang de Tête de Bœuf (**23, Lussat**)
- Etang de Tricherie (**87, Thouron**)
- Etang de L'Ardidie (**87, Videix**)
- Etang de la Bastide (**23, Lussat**)
- Etang de la Chateline (**87, Bussière-Galant**)
- Etang de la Chaume (**23, Azérables**)
- Etang de la Côte (**87, Mézières-sur-Issoire**)
- Etang de la Grande Chaume (**23, Lussat**)
- Etang de la Lande (**87, Nexon**)
- Etang de la Mazère (**87, Saint-Martin-le Mault**)
- Etang de la Pêcherie (**87, Saint-Sylvestre**)
- Etang de la Pouge (**87, Saint-Auvent**)
- Etang de la Ramade (**23, Flayat**)
- Etang de la Reyberie (**23, Budelière**)
- Etang de la Serrerie (**87, Coussac-Bonneval**)
- Etang de la Toueille (**23, Le Grand-Bourg**)
- Etang de la Vierge (**23, Lussat**)
- Etang des Bordes (**87, Saint-Jouvent**)
- Etang des Bordes (**23, Lussat**)
- Etang des Garennes (**87, Cieux**)
- Etang des Maisons (**87, Oradour-Saint-Genest**)
- Etang des Oussines (**19, Saint-Merd-les-Oussines**)
- Etang des Planchettes (**87, Azat-le-Ris**)
- Etang des Signolles (**23, Ajain**)
- Etang du Francour (**87, Saint-Junien-les-Combes**)
- Etang du Laget (**23, Mourioux-Vieilleville**)
- Etang du Mas du Puy (**87, Oradour-sur-Glane**)
- Etang du Mas Féty (**87, Moissannes**)
- Etang le Mail (**87, Berneuil**)
- Etang Maison Neuve (**87, Dournazac**)
- Etang Neuf (**23, Jarnages**)
- Etang Saint-Fortunat (**87, Flavignac**)
- Grand étang (**87, Azat-le-Ris**)
- Lac de Bort-les-Orgues (**19, Bort-les-Orgues**)
- Lac de Neuviç (**19, Neuviç**)
- Lac de Saint-Pardoux (**87, Saint-Pardoux**)
- Lac de Vassivière (**23, Royère-de-Vassivière**)
- Lac des Bariousses (**19, Treignac**)
- Lac du Causse (**19, Lissac-sur-Couze**)
- Lac du Chammet (**19, Peyrelevade**)

Cette chronique a été réalisée par

- ➔ **BUSSIERE Raphaël** : Coordination générale de la centrale
- ➔ **GAUTHIER Robert** : Codification des fiches
- ➔ **BOULESTEIX Pascal** : Logiciel de traitement des données «Fenêtre sur la Nature»
- ➔ **BUSSIERE Raphaël, ROGER Jérôme** : Élaboration des graphiques et cartographies
- ➔ **BUSSIERE Raphaël, VILKS Askolds** : Relecture

Liste des auteurs

➔ **Hugo BOURDIN** :

Phasianidés (Perdrix rouge, Perdrix grise, Caille des blés, Faisan vénéré, Faisan de Colchide).

➔ **Raphaël BUSSIÈRE** :

Sulidés (Fou de Bassan), **Anatidés** (Cygne tuberculé, Oie cendrée, Bernache du Canada, Olette d'Égypte, Tadorne casarca, Tadorne de Belon, Canard mandarin, Canard siffleur, Canard chipeau, Sarcelle d'hiver, Canard colvert, Canard pile, Sarcelle d'été, Canard souchet, Nette rousse, Fuligule milouin, Fuligule nyroca, Fuligule morillon, Fuligule milouinan, Macreuse brune, Garrot à œil d'or, Harle piette, Harle bièvre), **Gruidés** (Grue cendrée), **Charadriidés** (Petit Gravelot), **Scolopacidés** (Chevalier gambette), **Stercorariidés** (Labbe à longue queue).

➔ **Pascal CAVALLIN** :

Alaudidés (Alouette lulu, Alouette des champs), **Hirundinidés** (Hirondelle de rivage, Hirondelle de rochers, Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre), **Motacillidés** (Pipit des arbres, Pipit farlouse, Pipit spioncelle, Bergeronnette printanière, Bergeronnette printanière flavissima, Bergeronnette printanière thunbergi, Bergeronnette des ruisseaux, Bergeronnette grise, Bergeronnette de Yarrell), **Troglodytidés** (Troglodyte mignon), **Prunellidés** (Accenteur mouchet, Accenteur alpin).

➔ **Jean-Michel CÉLERIER** :

Fringillidés (Pinson des arbres, Pinson du Nord, Serin cini, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Tarin des aulnes, Linotte mélodieuse, Sizerin flammé, Bec-croisé des sapins, Bouvreuil pivoine, Grosbec casse-noyaux).

➔ **Gaston CHASSAGNARD** :

Podicipédidés (Grèbe castagneux, Grèbe huppé, Grèbe esclavon, Grèbe à cou noir), **Laridés** (Mouette mélanocéphale, Mouette pygmée, Mouette rieuse, Goéland cendré, Goéland argenté, Goéland brun, Goéland leucophaea, Mouette tridactyle), **Picidés** (Torcol fourmilier, Pic vert, Pic noir, Pic épeiche, Pic mar, Pic épeichette), **Passeridés** (Moineau domestique, Moineau friquet, Moineau soulcie), **Emberizidés** (Bruant jaune, Bruant zizi, Bruant fou, Bruant ortolan, Bruant des roseaux, Bruant proyer).

➔ **Aurélien DUMÈTRE** :

Sylviidés (Cisticole des joncs, Locustelle tachetée, Phragmite des joncs, Rousserolle effarvatte, Hypolaïs polyglotte, Fauvette pitchou, Fauvette grisette, Fauvette des jardins, Fauvette à tête noire, Pouillot de Bonelli, Pouillot siffleur, Pouillot véloce, Pouillot véloce ibérique, Pouillot fitis, Roitelet huppé, Roitelet à triple bandeau).

➔ **Étienne DUPOUX** :

Columbidés (Pigeon biset, Pigeon colombin, Tourterelle turque, Tourterelle des bois), **Cuculidés** (Coucou gris), **Caprimulgidés** (Engoulevent d'Europe), **Apodidés** (Martinet

noir), **Turdidés** (Rougegorge familier, Rossignol philomèle, Gorgebleue à miroir, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Tarier des prés, Tarier pâle, Traquet motteux, Merle à plastron, Merle noir, Grive litorne, Grive musicienne, Grive mauvis, Grive draine), **Sturnidés** (Étourneau sansonnet).

➔ **Ludovic FLEYTOU :**

Upupidés (Huppe fasciée), **Corvidés** (Pie bavarde, Choucas des tours, Corneille noire, Grand corbeau).

➔ **Karim GUERBAA :**

Phalacrocoracidés (Grand Cormoran), **Corvidés** (Geai des chênes, Corbeau freux).

➔ **Bruno LABIDOIRE :**

Columbidés (Pigeon ramier).

➔ **Quentin MARQUET :**

Threskiornithidés (Ibis sacré), **Burhinidés** (Oedicnème criard), **Sternidés** (Sterne caugek, Sterne pierregarin, Sterne naine, Guifette moustac, Guifette noire).

➔ **Pierre MARTHON :**

Ardéidés (Butor étoilé, Bihoreau gris, Héron gardebœufs, Aigrette garzette, Grande aigrette, Héron cendré, Héron pourpré), **Rallidés** (Râle d'eau, Marouette ponctuée, Râle des genêts, Gallinule poule-d'eau, Foulque macroule).

➔ **David NAUDON :**

Aegithalidés (Mésange à longue queue), **Paridés** (Mésange nonnette, Mésange boréale, Mésange huppée, Mésange noire, Mésange bleue, Mésange charbonnière), **Sittidés** (Sittelle torchepot), **Tichodromadidés** (Tichodrome échelette), **Certhiidés** (Grimpereaux des bois, Grimpereaux des jardins), **Oriolidés** (Loriot d'Europe).

➔ **Gilles PALLIER :**

Cinclidés (Cincla plongeur).

➔ **Isabelle PRADIER :**

Laniidés (Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse).

➔ **Olivier SCHILTZ :**

Gaviidés (Plongeon catmarin, Plongeon arctique, Plongeon imbrin), **Ciconiidés** (Cigogne noire, Cigogne blanche), **Récurvirostridés** (Echasse blanche, Avocette élégante), **Charadriidés** (Grand gravelot, Gravelot à collier interrompu, Pluvier doré, Pluvier argenté, Vanneau sociable, Vanneau huppé), **Scolopacidés** (Bécasseau maubèche, Bécasseau sanderling, Bécasseau minute, Bécasseau de Temminck, Bécasseau variable, Combattant varié, Bécassine sourde, Bécassine des marais, Bécasse des bois, Barge à queue noire, Barge rousse, Courlis corlieu, Courlis cendrée, Chevalier arlequin, Chevalier aboyeur, Chevalier culblanc, Chevalier sylvain, Chevalier guignette), **Tytonidés** (Effraie des clochers), **Strigidés** (Grand-duc d'Europe, Chevêche d'Athéna, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc, Hibou des marais, Chouette de Tengmalm), **Alcedinidés** (Martin-pêcheur d'Europe), **Méropidés** (Guêpier d'Europe), **Muscicapidés** (Gobemouche gris, Gobemouche noir).

➔ **Anthony VIRONDEAU :**

Accipitridés (Bondrée apivore, Milan noir, Milan royal, Vautour fauve, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Autour des palombes, Épervier d'Europe, Buse variable, Aigle royal, Aigle botté), **Pandionidés** (Balbuzard pêcheur), **Falconidés** (Faucon crécerelle, Faucon kobez, Faucon émerillon, Faucon hobereau, Faucon pèlerin).

Liste des espèces observées



Raphaël Bussière

GAVIIDÉS

Plongeon catmarin (*Gavia stellata*)

● Une seule donnée provenant de la Corrèze, où un individu est observé le 11/01/03 au lac de Bort-les-Orgues (19-DouB).

Plongeon arctique (*Gavia arctica*)

- L'espèce est signalée dans les trois départements :
- 1 ind. le 27/11/02 à Saint-Fréjoux (19-DefP),
 - 1 ind. le 25/01/03 au lac de Vassivière (23-RobS),
 - 1 ind. le 11/11/03 à l'étang de la Ramade (23-LerT),
 - 1 ind. le 22/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ).

Plongeon imbrin (*Gavia immer*)

● Un individu, probablement le même, est observé les 18, 19 et 27/01/04 à l'étang de Landes (23-DupE et DelP).

PODICIPÉDIDÉS

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)

● L'espèce peut-être contactée tout au long de l'année dans l'ensemble de la région, avec cependant de nombreuses observations sur les étangs du bassin de Gouzon.

Les gros rassemblements ont lieu essentiellement à la fin de l'été :

- 50 ind. le 29/08/03 à l'étang de Landes (23-DubP),
- 20 ind. le 04/09/03 à l'étang de Tête de Bœuf (23-BarJ),
- 20 ind. le 13/09/03 à l'étang de Boutilly (87-SotJ).

La nidification de l'espèce fournit quelques données de reproductions certaines :

- nid avec 3 œufs le 05/04/03 à Dournazac, puis 2 jeunes notés le 31/05/03 (87-EyrO),
- 3 poussins à Laurière le 14/04/03 (87-VinS),
- adulte en position de couveur le 18/04/03 à Flavignac (87-PreP),
- nid avec 4 œufs découvert le 22/04/03 à Oradour-sur-Glane puis abandonné le 01/05/03 (87-BouP),
- 2 jeunes volants le 05/06/04 à Oradour-sur-Vayres (87-EyrO).

Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)

● On débute avec le dernier jeune duveteux de l'année 2002, observé le 01/09/02 à l'étang de Landes (23-DupE).

Les rassemblements les plus importants sont notés en septembre et en janvier :

- 100 ind. le 19/09/02 à l'étang de Murat (87-HubP),
- 77 ind. le 19/01/03 au lac de Saint-Pardoux (87-HubP).

Puis commence la saison de reproduction avec l'observation d'un couple le 09/02/03 à l'étang de Peyranche (87-LabB).

Les premières parades sont alors constatées le 13/02/03 à l'étang de Forge Neuve (19-MorS). Un nid garni de 5 œufs est découvert le 27/04/03 à l'étang Baudy (87-CelJ). Ce même jour, un transport de nourriture est noté à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP). Le dernier juvénile de la saison est observé le 19/09/03 à l'étang de la Pêcherie (87-LanJ).

Plus tard, des rassemblements sont notés à l'étang de Landes (23) :

- 60 ind. le 29/08/03 (DubG),
- 70 ind. le 23/11/03 (DubG),
- 150 ind. le 11/04/04 (DubG),
- 97 ind. le 25/07/04 (DubG).

L'année 2004 fournira de nombreuses données de reproduction, parmi lesquelles :

- première parade le 08/02/04 à l'étang de Lavaud (87-RayA),
- parade le 15/02/04 à l'étang de Landes (23-DupE),
- accouplements constatés le 04/04/04 dans un groupe de 50 ind. à l'étang de Landes (23-VirA),
- couvaison le 25/04/04 à l'étang de Poncharal (87-FauB),
- 2 jeunes non volants le 09/05/04 à l'étang de Poncharal (87-FauB),
- 3 jeunes volants le 23/05/04 à l'étang des Bordes (87-GauR).



Raphaël Bussière

Grèbe esclavon (*Podiceps auritus*)

● L'observation de cette espèce reste exceptionnelle dans la région. Elle hiverne en général le long des côtes d'Europe occidentale, mais des conditions météorologiques particulières peuvent la pousser à l'intérieur des terres. L'espèce fournit 4 citations pour 2 individus au cours de la période étudiée :

- 1 ind. du 26 au 28/12/02 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-AudA et MorS),
- 1 ind. le 12/01/03 au Lac de Vassivière (23-BarJ).

Grèbe à cou noir (*Podiceps nigricollis*)

Les données sont essentiellement comprises entre début mars et fin août. Certains individus stationnent pendant la période de reproduction sur certains des étangs du Limousin, mais la nidification n'a pas été avérée. 95 % des données proviennent de l'étang de Landes. Des parades y sont observées, avec 8 individus le 16/06/03 (23-SauJ), et un couple est présent le 09/04/03 (23-VinS). On peut suivre une évolution des effectifs de population à l'étang de Landes : 1 ind. le 12/03/03 (PalG), 7 ind. le 14/09/03 (SauJ), 9 ind. le 22/03/03 (DupE), 14 ind. le 30/03/03 (SauJ), 4 ind. le 11/05/03 (SauJ), 2 ind. le 24/07/03 (VirA) et 14 ind. le 01/09/03 (VarC). Par ailleurs, on peut noter la seule observation hivernale de l'espèce, avec 1 individu le 03/01/03 (23-SauJ). Une seule mention ne provient pas de l'étang de Landes, celle d'un individu présent le 02/04/04 au Lac de Vassivière (23-LanJ).



Raphaël Bussi re

SULID S

Fou de Bassan (*Morus bassanus*)

Un individu est retrouv  bless  le 12/06/03   Espartignac (19-CenS). Il a  t  emmen  dans un centre de soins et 4 jours plus tard, il d c da dans les locaux.

Grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Il n'y a aucune observation attestant la reproduction de l'espèce en Limousin. Rares sont les citations entre mai et septembre, comparées à celles d'octobre à avril. Cependant, on notera l'observation d'individus juvéniles ou immatures en juin et juillet 2003 à Lussat (23-VirA) ainsi que le 01/08/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ).


Parmi les données figurent celles issues de tirs de régulation : entre 60 et 70 cormorans ont été tués en Corrèze et Creuse durant les mois de janvier et février 2004 (SEPOL).

Près d'une centaine de citations concernent les dénombrements aux dortoirs avec un maximum de 201 oiseaux comptés le 14/12/04 à l'étang de Cante (23-ThiP).

Des individus bagués sont observés à l'étang de Lavaud entre octobre et décembre 2003 (87-BusR).

Environ 240 citations concernent la migration active de cette espèce. Une concerne 134 individus vus en rétro-migration le 09/11/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Signalons l'attaque d'un Grand Cormoran par un Faucon Pèlerin à Rancon le 04/12/02 (87-DouA).



Butor étoilé (*Botaurus stellaris*)

- Cette espèce, très discrète, fait l'objet de 4 citations :
 - 1 ind. le 26/10/02 à l'étang de la Ramade (23-LpoA),
 - 1 ind. le 04/04/03 à l'étang de la Ramade, avec présomption de nidification (23-LerT),
 - 1 ind. le 15/05/03 à l'étang de Landes, avec présomption de nidification (23-SotJ),
 - 1 ind. vu de jour et au crépuscule le 15/03/04 à l'étang de Chareneuve (19-BarJ).

Bihoreau gris (*Nycticorax nycticorax*)

- Lors de la migration postnuptiale, les dernières mentions à l'étang de Landes font état de 2 individus le 01/09/02 (23-DupE) et de 10 individus le 25/07/03 (23-VirA).

Hors site de nidification, 1 individu est noté le 19/09/02 aux gravières de Saint-Pantaléon-de-Larche (19-FacP). L'oiseau le plus précoce est observé le 03/04/04 au barrage du Chat Cros (23-DupE). À l'étang de Landes, 2 individus sont présents le 09/04/03 (23-VinS).

L'étang de Landes est le seul site où l'espèce se reproduit : 6 ind. (adultes et jeunes) le 22/06/03, 10 ind. les 25/07/03 (23-VirA) et 25/07/04 (23-DubG).

Des indices possibles de nidification sont relevés sur trois autres sites :

- 1 ind. le 17/04/03 aux gravières de Saint-Pantaléon-de-Larche (19-LabD),
- 2 ind. le 25/05/03 à l'étang de Tête de Bœuf (23-DupE),
- 1 ind. le 07/06/03 à Saint-Loup (23-DubG),
- 1 ind. le 05/06/04 à l'étang de Tête de Bœuf (23-MorS).



Raphaël Bussière

Héron gardeboeufs (*Bubulcus ibis*)

- Cette espèce est citée uniquement de mi-septembre à début février :
 - 1 ind. le 17/09/02 à l'étang de Landes (23-MerC),
 - 1 ind. le 19/02/02 à l'étang de Murat (87-HubP),
 - 2 ind. le 26/04/03 à l'étang de Landes (23-PalG),
 - 4 ind. le 18/12/03 et 1 ind. le 02/02/04 à Jabreilles-les-Bordes (87-Made),
 - 2 ind. les 03/01/04, 17/01/04 et 25/01/04 à Flavignac (87-PreP).



Raphaël Bussière

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)

- À la fin de l'été, 13 individus sont observés le 04/09/03 à l'étang de Landes (23-BarJ).
Durant la période d'hivernage, l'espèce fait l'objet de quelques citations :
 - 2 ind. le 02/11/02 à l'étang de la Pouge (87-PreP),
 - 1 ind. le 27/11/02 à l'étang du Francour (87-EyrO),
 - 1 ind. le 14/01/03 à Nexon (87-RouA).

En période de reproduction, l'Aigrette garzette se reproduit sur un seul site connu, celui de l'étang de Landes. La première nidification, avec succès, date de 1999 avec un couple et pour les années 2003-2004, deux couples se sont installés. Nids occupés le 15/04/03 (23-PalG) et un autre le 09/05/04 (23-HubP).

Grande Aigrette (*Casmerodius albus*)

Sur la période 2002 à 2004, l'espèce fait l'objet de 299 citations sur 35 sites différents. Le secteur de Lussat en Creuse regroupe 70 % des observations :

Secteurs et Sites		Total des citations	% des citations
Secteurs hors Lussat		87	29
Secteurs de Lussat		212	71
Sites du secteur de Lussat	Etang de Landes	149	49
	Etang de Tête de Bœuf	46	-
	Etang de la Bastide	17	-
	Etang de la Grande Chaume	2	-
	Non précisé	1	-

Les plus grandes concentrations de l'espèce sont notées le 11/11/03 à l'étang de Landes avec 31 oiseaux (23-DupE) et le 28/11/03 à l'étang de Tête de Bœuf avec 38 oiseaux (23-SauJ).

Héron cendré (*Ardea cinerea*)

La migration postnuptiale amène une vingtaine d'observations. Les groupes les plus importants sont de :

- 6 ind. le 20/10/02 à Nieul (87-BouP),
- 4 ind. le 05/10/03 à Flavignac (87-PreP),
- 9 ind. le 19/10/03 à Ligniac (19-BarJ).

En hiver, l'espèce est présente dans l'ensemble de la région, sans stationnement très important hormis les observations de 142 individus recensés le 04/11/02 (23-SauJ) et de 150 individus le 02/11/03 à l'étang de Landes (23-DubG).

Les premières données d'individus au nid sont notées :

- le 12/02/03 à l'étang de Lavaud (87-LabB),
- le 13/02/03 à l'étang de Landes (23-VirA),
- le 20/02/03 à Chastaux (19-GauR).

Dans la région, 38 sites de nidifications avérées sont dénombrés. Leur répartition est la suivante :

Département	Nombre de sites
Corrèze (19)	14
Creuse (23)	3
Haute-Vienne (87)	21

Héron pourpré (*Ardea purpurea*)

● Hors site de nidification et en période postnuptiale, l'espèce est notée à diverses reprises :

- 1 ind. posé le 30/08/02 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-DubG),
- 1 ind. le 21/09/02 à l'étang du Mas Féty (87-BarJ),
- 1 ind. le 29/07/03 à Voutezac (19-FacP),
- 1 ind. le 01/08/03 au lac du Causse (19-GauR).

En migration prénuptiale, 3 individus sont observés le 22/03/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Les premiers individus sont signalés les 27/03/03 (23-VirA) et 04/04/04 (23-MerC) à l'étang de Landes, et un groupe de 11 individus est présent le 24/04/04 sur ce même site (23-ChaG).

Durant la période de reproduction, un nid est occupé le 15/04/03 à l'étang de Landes (23-PalG) et un autre le 21/04/04 (23-DupE).



CICONIIDÉS

Cigogne noire (*Ciconia nigra*)

● Des observations sont faites régulièrement de mi-août à mi-octobre, au cours de la migration postnuptiale :

- 5 ind. le 31/08/02 à Flavignac (87-PreP),
- 7 ind. le 11/09/02 à Laurière (87-VinM),
- 10 ind. le 14/09/02 à Meymac (19-AlbD),
- 3 ind. le 25/08/03 à Saint-Loup (23-DubG),
- 1 ind. le 13/09/03 à Servièrès-le-Château (19-NorT),
- 8 ind. le 14/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GenS),
- 1 ind. le 02/10/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 12/10/03 à Saint-Sulpice-les-Bois (19-AlbD),
- 1 ind. le 13/08/04 à Saint-Julien-aux-Bois (19-PigH).

Pour la remontée, les observations commencent véritablement début mars...sauf exception !

- 1 ind. le 28/02/03 à Bazelat (23-BarP),
- 1 ind. le 08/03/03 à Allasac (19-CreD),
- 1 ind. le 22/03/03 à Saint-Aulaire (19-FauB),
- 1 ind. le 15/04/03 à Bétête (23-NauP),
- 19 ind. le 07/03/04 à Saint-Sornin-Lavolps (19-CelJ),

- 1 ind. le 08/04/04 à Eymoutiers (87-TriG),
- 2 ind. le 17/04/04 à Saint-Victour (19-VarC),
- 1 ind. le 19/05/04 à Chambon-sur-Voueize (23-FeuB).

En dehors de ces périodes de migration active, l'espèce est parfois visible :

- 1 ind. le 04/07/04 à Budelière (23-BruB),
- 1 ind. le 15/07/04 à Bétête (23-MorD),
- 9 ind. le 29/07/03 à Évaux-les-Bains (23-DubP),
- 1 ind. le 03/08/04 à Mercoeur (19-SirD),
- 2 ind. le 07/08/04 à Montgibaud (19-GauR).

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*)

● Au cours de la migration postnuptiale, l'espèce est contactée d'août à octobre :

- 8 ind. le 29/08/02 à Meymac (19-AlbD),
- 2 ind. le 20/10/02 à Bussière-Boffy (87-DouA),
- 4 ind. le 28/08/03 à Rochechouart (87-LabB),
- 3 ind. le 18/09/03 à Bugeat (19-BerF),
- 9 ind. le 19/10/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Pour la remontée printanière, les observations s'évaluent principalement de février à mai :

- 25 ind. le 28/02/03 à La Croix-sur-Gartempe (87-RoyM),
- 4 ind. le 10/03/03 à Lubersac (19-Gour),
- 12 ind. le 07/04/03 à Cieux (87-DouA),
- 2 ind. le 13/02/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 10 ind. le 25/03/04 à Sereilhac (87-GorP),
- 5 ind. le 27/04/04 à Lupersat (23-YveJ),
- 5 ind. le 03/05/04 à Lussat (23-VarC).

Quelques observations hors ces périodes montrent que désormais la Cigogne blanche peut-être visible dans notre région quasiment toute l'année :

- 2 ind. posés sur le toit du collège le 08/12/03 à Bourganeuf (23-PatN),
- 3 ind. posés sur un arbre mort le 27/06/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-HubP),
- 2 ind. le 10/07/03 dans le bourg de Saint-Goussaud (23-NauD).

Un squelette trouvé le 23/06/03 à Saint-Barbant (87-BouP) à l'aplomb d'un poteau électrique, rappelle les dangers que rencontrent ces oiseaux lors de leur migration.



Etienne Dupoux

THRESKIORNITHIDÉS

Ibis sacré (*Threskiornis aethiopicus*)

• Une première mention pour la région limousine ! Cette espèce, invasive en provenance d'Égypte, est observée pour la première fois à l'étang de Landes. En effet, un individu est observé pour la première fois le 07/12/02 (23-LpoA), puis sera revu par la suite jusqu'au 27/12/02 (23-VinS), tantôt à l'étang de Landes, tantôt à l'étang de Tête de Bœuf.

ANATIDÉS

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

• L'espèce est notée dans toute la région limousine, tout au long de l'année, principalement observée en Creuse. Elle affectionne particulièrement les zones d'étangs de petite étendue et les plans d'eau. En 2003, l'espèce s'est reproduite sur un seul site, celui de l'étang de Lavaud le 25/07/03 avec un couple accompagné de deux jeunes (87-BusR). Cependant, un couple est observé en pleine construction de nid le 08/03/03 à l'étang de Landes (23-DubG) mais cette observation est restée sans suite. En 2004 également, une seule preuve certaine de nidification, toujours sur la commune de Videix mais cette fois-ci à l'étang de l'Ardidie, avec un individu en position de couvaison sur le nid le 30/04/04 (87-LanJ). Un adulte est retrouvé mort le 03/03/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP).

Oie cendrée (*Anser anser*)

• Principalement observée en très petit nombre pendant la période de migration. Aucune preuve d'hivernage ou de stationnement prolongé pour la période considérée. Les premiers migrateurs postnuptiaux sont contactés à partir de la deuxième décade de septembre avec 1 individu le 19/09/02 à l'étang de Murat (87-HubP) et 13 individus le 14/09/03 à Saint-Aulaire (19-FauB). Le passage en octobre-novembre s'accroît avec des groupes en migration active ne dépassant pas les 100 oiseaux :

- 28 ind. le 28/10/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 34 ind. le 07/11/02 à Saint-Sulpice-le-Dunois (23-Depa),
- 75 ind. le 11/11/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 26 ind. le 15/10/03 à Flavignac (87-EyrO),
- 12 ind. le 19/10/03 à La Bazeuge (87-CavP).

Cependant, des groupes d'oiseaux font une halte migratoire sur quelques étangs afin de pouvoir se restaurer avant de poursuivre leur chemin :

- 9 ind. le 01/12/02 au lac de Neuvic (19-CNN),
- 6 ind. le 15/12/02 à l'étang de Cherchaud (19-MorS),
- 17 ind. le 29/11/03 à l'étang de Landes (23-DesN),
- 6 ind. le 08/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 1 ind. le 04/01/03 à l'étang de la Lande (87-Pral).

Au passage printanier, l'espèce est peu observée. Les observations proviennent du Nord-ouest de la Haute-Vienne avec 2 individus en migration active le 03/02/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 68 individus le 25/02/04 à Bussière-Poitevine (87-CavP).

Bernache du Canada (*Branta canadensis*)

● L'origine des oiseaux observés en Limousin est difficile à connaître sachant qu'ils peuvent correspondre à des oiseaux locaux issus de captivité. Les données proviennent de la Haute-Vienne. 4 individus ont stationné du 03/11/02 au 13/02/03 à l'étang de Forge Neuve (87-MorS). Un individu est contacté en vol le 04/04/03 à Saint-Just-le-Martel (87-BarJ). Une autre observation provient de Saint-Germain-les-Belles où 4 individus sont observés dans la carrière de Pierre Brune (87-EyrO).

Ouette d'Égypte (*Alopochen aegyptiacus*)

● Un individu est présent du 22/10/03 au 20/12/03 à l'étang de Maubrant (23-TarE) et 2 individus sont observés à l'étang des Bordes (87-SotJ).

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*)

● Les seules mentions proviennent de l'étang des Bordes où 3 individus sont contactés le 21/11/03 (87-SotJ), et probablement que ces oiseaux sont restés jusqu'au 01/08/04 (87-SotJ).

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)

● Les différents contacts de l'espèce se font à l'occasion de ses déplacements migratoires et lors des hivers rigoureux. Ce visiteur régulier en Limousin est le plus souvent observé en Creuse. Il affectionne plus particulièrement les grandes étendues, plus attractives, mais peut aussi adopter des petits points d'eau. Les observations effectuées au passage postnuptial sont plus nombreuses qu'au passage printanier. En 2002, la première mention porte sur un groupe de 3 individus observé à l'étang de Landes du 02/11/02 (23-DesF) au 15/11/02 (23-SauJ). Du 29/11/02 au 01/12/02, un quatrième individu a intégré le groupe, et 16 individus sont observés le 07/12/02 (23-LpoA). L'espèce a été également observée en Corrèze sur 2 autres sites : 6 ind. le 07/12/02 à l'étang de Labassat (23-ComP) et 3 ind. le 09/12/02 au lac de Vassivière (23-DesF).

En 2003, une mention de l'espèce par département :

- 1 ind. le 24/10/03 au lac du Chammet (19-SauJ),
- 1 ind. le 11/11/03 à l'étang de Landes (23-VinS),
- 5 ind. le 10/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ).

En période hivernale, le Tadorne de Belon est présent dans la région et ses effectifs fluctuent suivant la rigueur hivernale. Les oiseaux peuvent s'attarder quelques jours sur les étangs comme à l'étang de Landes où l'espèce atteint un effectif maximal de 7 individus le 27/12/02 (23-VinS). Autrement, la plupart des données collectées concernent des individus isolés en halte de courte durée :

- 1 ind. le 12/01/03 au lac de Vassivière (23-BarJ),
- 1 ind. le 17/01/04 à l'étang de Taysse (19-CorP).

Le passage pré-nuptial est beaucoup moins marqué :

- 1 ind. les 09/04/03 (VinS) et 19/04/03 à l'étang de Landes (23-DesF),
- 6 ind. le 25/05/04 à l'étang de Landes (23-BusP).

Canard mandarin (*Aix galericulata*)

● La majorité des observations proviennent en période hivernale en Haute-Vienne, sauf deux mentions concernant un couple présent le 20/12/03 à l'étang du Laget (23-SotJ) et un autre le 02/05/04 à Flavignac (87-PreP).

- 1 mâle le 26/12/02 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-AudA),
- 1 ind. le 10/01/03 à l'étang des Planchettes (87-SotJ),
- 1 mâle le 12/01/03 à l'étang de Murat (87-CouR),
- 1 mâle du 17/01/03 au 16/02/03 à l'étang de la Pouge (87-EyrO et BusR).

Canard siffleur (*Anas penelope*)

● Les premiers oiseaux sont contactés dès la fin du mois de septembre avec 3 individus le 22/09/02 à l'étang de Lavaud (87-SotJ). Les observations s'accroissent pour culminer en décembre. Le site majeur en Limousin où l'on rencontre l'espèce en grand groupe pouvant atteindre 200 oiseaux est celui de l'étang de Lavaud. Un groupe de 200 individus est comptabilisé le 18/01/04 (87-SotJ). À plus petite échelle, l'étang de Landes fournit un effectif maximum de 46 individus le 09/03/03 (23-PalG). D'autres sites accueillent cette espèce :

- 7 ind. le 18/10/02 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 27 ind. le 12/01/03 à l'étang de Gouzon (23-PalG),
- 15 ind. le 28/02/04 à l'étang de la Vierge (23-DupE).

L'hivernage prend fin à partir de mars où les effectifs chutent brutalement et quelques oiseaux sont observés ici et là en petit nombre jusqu'en avril.

- 2 ind. le 20/04/03 à l'étang de Landes (23-NorT),
- 5 ind. le 27/04/04 à l'étang de Landes (23-DupE).

En période estivale, aucune mention n'est signalée en Limousin.

Canard chipeau (*Anas strepera*)

- Les premiers contacts de l'espèce débutent dès le mois de septembre :
 - 1 ind. le 17/09/02 à l'étang de Landes (23-MerC),
 - 20 ind. le 12/09/03 à l'étang de Landes (23-DupE).

Au cours de la période hivernale, l'espèce fréquente assidûment les étangs du Bassin de Gouzon en Creuse et quelques étangs de la Haute-Vienne. L'effectif maximum dénombré est celui de 34 oiseaux le 19/02/04 à l'étang de Landes (23-SauJ). Quant à l'étang de Lavaud, le groupe le plus important est noté le 12/01/03 comptant 30 oiseaux (87-SotJ). En Corrèze, un seul site a accueilli l'espèce, celui du lac de Neuvic où une femelle a été observée le 16/11/02 (19-CNN). Des groupes d'oiseaux allant d'1 à 10 individus sont dénombrés sur les tous types d'étangs ici et là, mais le stationnement est de courte durée. Les premiers mouvements prénuptiaux sont perceptibles en mars, comme ce groupe de 38 individus noté le 03/03/04 à l'étang de Landes (23-BarJ). En période estivale, l'espèce est observée exclusivement à l'étang de Landes où elle niche de façon irrégulière. En 2003, la reproduction est prouvée le 16/06/03 avec 4 jeunes accompagnés d'une femelle (23-SauJ) mais aucune preuve certaine pour l'année 2004, malgré les observations d'un couple à plusieurs reprises courant mai-juin.

Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*)

- Ce petit Anatidé est majoritairement observé sur les étangs de la Haute-Vienne. Après la période de reproduction, la première mention de l'espèce est signalée le 14/08/03 à l'étang de Landes (23-MerC) pouvant être assimilée aux premiers mouvements postnuptiaux. D'autres données sont recueillies au mois d'août :

- 3 ind. le 23/08/02 à l'étang de Landes (23-RobS),
- 9 ind. le 30/08/02 à l'étang de Chabannes (19-SauJ),
- 10 ind. le 29/08/03 à l'étang de Landes (23-DubP).

Les déplacements postnuptiaux sont de plus en plus relevés et ils culminent en novembre, mais les effectifs maximaux sont constatés en décembre-janvier :

- 100 ind. le 09/12/02 à l'étang de Murat (87-SotJ),
- 130 ind. le 21/12/02 à l'étang de Landes (23-SauJ),
- 103 ind. le 18/01/04 à l'étang de Murat (87-CouR).



Quant aux mouvements prénuptiaux, ils débutent dès le mois de mars pour culminer en avril. Un groupe de 6 individus, en vol à haute altitude, est signalé le 05/03/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). À cette période, l'étang de Murat et l'étang de Landes fournissent à eux deux la majorité des effectifs recensés, dépassant la trentaine d'oiseaux.

Cependant, 34 individus sont observés le 15/03/03 à l'étang des Oussines (19-SauJ). Le dernier contact de l'espèce concerne 2 femelles le 27/04/03 à l'étang de Landes (23-DupE) et 3 adultes le 11/05/04 à l'étang de Chabannes (19-LabD).

En période estivale, aucune reproduction certaine n'a été constatée malgré quelques observations restées sans suite :

- 1 couple le 29/05/04 à l'étang des Garennes (87-BouH),
- 1 couple le 04/06/04 à l'étang de Lavillemichel (87-GueK),
- 1 couple le 17/07/04 à l'étang de Landes (23-DesF).

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)

● L'anatidé le plus rencontré dans la région, plus particulièrement sur les points d'eau Haute-Viennois. Que ce soit sur les étangs, mares ou ruisseaux, l'espèce est présente et se reproduit. Au mois d'août, des groupes comportant plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines d'oiseaux sont dénombrés :

- 300 ind. le 16/08/02 à l'étang de Landes (23-HubP),
- 77 ind. le 30/08/02 à l'étang de la Pouge (87-BusR),
- 90 ind. le 31/08/02 à l'étang de la Toueille (23-DubG),
- 52 ind. le 23/08/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR).

Lors des mouvements automnaux, les effectifs locaux sont augmentés sensiblement avec les oiseaux migrateurs et hivernants. Les effectifs, les plus importants, sont notés en période hivernale :

- 480 ind. le 07/12/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-EyrO),
- 325 ind. le 17/01/03 à l'étang de la Pouge (87-EyrO),
- 700 ind. le 07/12/04 à l'étang de Murat (87-EyrO).

La reproduction certaine est peu notée, seulement 28 cas avérés pour l'ensemble du Limousin : 6 en Corrèze, 3 en Creuse et 19 en Haute-Vienne. Les premières découvertes de nid garni d'œufs sont découvertes en mars :

- Nid garni de 8 œufs le 15/03/04 sur les rives de la Vienne à Saint-Junien (87-DouA),
- Nid garni de 5 œufs le 01/04/04 au Moulin Autier à Coussac-Bonneval (87-CelJ).

Et pour les premiers cannetons :

- 4 cannetons le 20/04/03 à l'étang de Chabannes (19-SauJ),
- 8 cannetons au nid le 22/04/03 au moulin de Tarn à Aixe-sur-Vienne (87-PreP),
- 7 cannetons le 29/04/04 à l'étang de la Chaume (23-MerC).

Mais à noter, une découverte surprenante d'une femelle colvert couvant ses œufs à 13m de hauteur dans un nid d'un rapace le 05/04/03 à l'étang des Signolles (23-NorT).

Canard pilelet (*Anas acuta*)

● L'espèce apparaît lors des passages printaniers et automnaux. Aucun cas d'hivernage et de reproduction. Elle a été observée sur 7 sites : étang de Cieux (87), étang de Lavaud (87), étang de Murat (87), lac de Saint-Pardoux (87), étang de Landes (23), étang de Tête de Bœuf (23) et le lac de Neuvic (19). Le passage postnuptial est très peu marqué. L'observation la plus précoce concerne un couple le 19/10/02 à l'étang de Lavaud (87-SotJ) pour 2002 et en 2003, un groupe 8 oiseaux, le plus important, est contacté le 23/10/03 à l'étang de Landes (23-SauJ). Pendant plus d'un mois, aucune observation n'a été faite. Et à la fin janvier, l'espèce apparaît de nouveau sur les sites avec des effectifs ne dépassant pas la trentaine d'oiseaux :

- 29 ind. le 09/03/03 à l'étang de Landes (23-PalG),
- 10 ind. le 14/03/03 à l'étang de Landes (23-SauJ),
- 10 ind. le 14/03/03 à l'étang de Murat (87-SotJ),
- 25 ind. le 02/04/04 à l'étang de Landes (23-DupE).

La mention la plus tardive est relevée le 25/05/03, avec un groupe de 4 mâles posé sur l'étang de Tête de Bœuf (23-DupE).

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*)

● Le passage postnuptial concerne très peu de données. La donnée la plus précoce est relevée le 23/08/03 à l'étang de Lavaud avec un couple (87-BusR) et la plus tardive concerne l'observation d'un oiseau le 04/09/03 à l'étang de Landes (23-BarJ).

Quant au passage prénuptial, nettement plus marqué, il fait l'objet de plusieurs mentions sur les étangs du bassin de Gouzon, allant 1 à 12 oiseaux. Une donnée très précoce est signalée le 01/02/03 à l'étang de Murat (87-SotJ). Les groupes les plus importants sont notés au mois de mars-avril avec entre autre l'observation de 12 individus le 15/04/03 à l'étang de Landes (23-PalG). La dernière observation relevée est celle d'un mâle présent le 11/05/03 à l'étang de Landes (23-SauJ).

Canard souchet (*Anas clypeata*)

● Quelques données sont rapportées à la fin de l'été sur un seul site, celui de l'étang de Landes. Il est de loin le site où l'on peut rencontrer l'espèce en toute période. Les premiers groupes, assimilés aux mouvements postnuptiaux, sont observés début septembre comme ce groupe de 20 oiseaux présents le 04/09/03 à l'étang de Landes (23-BarJ). Au cours de l'hiver, de petits groupes épars sont repérés ici et là sans jamais excéder la douzaine d'oiseaux :

- 4 ind. le 08/01/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 5 ind. le 09/02/03 à l'étang de Champegaud (23-RobS),
- 10 ind. le 22/02/03 à l'étang de Landes (23-VinS),
- 12 ind. le 04/01/04 à l'étang de Landes (23-PalG).



Etienne Dupoux

Le passage de l'espèce en migration printanière est plus marqué. Début mars à fin avril, des groupes plus importants sont contactés :

- 22 ind. le 22/03/03 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 20 ind. le 02/04/04 au lac de Vassivière (23-LanJ),
- 15 ind. le 04/04/04 à l'étang de la Bastide (23-VirA).

En période de nidification, l'espèce est rarissime dans le Limousin. Une seule mention, faisant l'objet d'un à deux couples, est signalée du 07/05/03 au 24/07/03 à l'étang de Landes sans qu'il y ait le moindre jeune observé. Pas de reproduction certaine avérée pour la période 2003-2004.

Nette rousse (*Netta rufina*)

À l'hiver 2002/2003, le premier contact de l'espèce est signalé le 04/01/03 à l'étang de Gouzon avec l'observation d'un individu (23-PalG). Un groupe de 4 oiseaux (3M+1F) est observé le 13/01/03 à l'étang de Lavaud (87-DesF) tandis qu'un groupe de 2 oiseaux est repéré le 09/03/03 à l'étang de Landes (23-PalG). Au passage automnal, un mâle est contacté le 22/10/03 à l'étang de Landes (23-VarC) puis il est revu par la suite jusqu'au 03/11/03 (23-SauJ). Trois semaines plus tard, c'est à l'étang de Gouzon qu'un mâle est observé (23-SauJ) jusqu'au 01/04/04 (23-DupE). Est ce le même oiseau ? Malgré tout, il s'agit du seul cas assimilable à un hivernage.

Fuligule milouin (*Aythya ferina*)

● Chaque année, cette espèce est de plus en plus contactée en Limousin. Dès la mi-septembre, des groupes dépassant la dizaine d'oiseaux sont repérés et sont par conséquent assimilés aux premiers déplacements postnuptiaux :

- 10 ind. le 21/09/02 à l'étang de Murat (87-SotJ),
- 41 ind. le 13/09/03 à l'étang de Landes (23-DubG).

Certains étangs accueillent l'espèce tout au long de l'hiver : étang de Gouzon (23), étang de Landes (23), étang de Lavaud (87), étang de Murat (87), étang des Bordes (87), Grand étang d'Azat-le-Ris (87). Plus particulièrement, c'est à l'étang de Murat que l'espèce y est rencontrée en grand nombre pouvant atteindre jusqu'à 300 oiseaux comme le 07/03/03 (87-SotJ). Quant à l'étang de Landes, l'effectif maximal atteint au cours des hivers 2002/2003 et 2003-2004 est de 179 oiseaux le 04/01/04 (23-PalG). Cependant, des groupes moins importants sont présents ici et là :

- à l'étang de Gouzon avec un effectif maximal de 109 ind. le 12/01/03 (23-PalG),
- à l'étang de Lavaud avec un effectif maximal de 50 ind. le 13/01/03 (87-DesF),
- au Grand étang d'Azat-le-Ris avec un effectif maximal de 38 ind. le 12/01/03 (87-CavP).

À partir de la mi-mars, les effectifs commencent à diminuer sensiblement pour laisser place aux nicheurs enfin... La reproduction de l'espèce est très localisée. Deux cas de nidification certaine ont été révélés : 5 jeunes le 22/06/03 à l'étang de Landes (23-VirA) et un groupe familial est présent le 22/06/03 à l'étang de Tête de Bœuf (23-VirA). Autrement, la seule autre mention de présence de l'espèce en période favorable est celle de 4 individus (3M+1F) présents le 31/05/03 à l'étang de Peyrelevade mais laissée sans suite (19-SauJ).

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*)

● Deux mentions sont rapportées pour cette espèce :

- 1 ind. le 27/03/04 à l'étang de la Reyberie (23-DesN),
- 1 mâle le 02/05/04 à l'étang de Landes (23-DupE et PalG).

Fuligule morillon (*Aythya fuligula*)

● Les premières observations assimilées aux mouvements postnuptiaux sont de 4 oiseaux le 02/11/03 à l'étang de Murat (87-SotJ) et de 20 oiseaux le 10/11/04 à l'étang de Landes (23-BarJ). En hivernage, l'espèce est peu abondante dans la région. Sa présence est régulière sur les étangs de Gouzon alors que sur les autres sites, l'espèce est vue sporadiquement. Les groupes les plus importants relevés sont de :

- 20 ind. le 26/12/03 à l'étang de Landes (23-SauJ),
- 11 ind. le 13/04/03 à l'étang de Tête de Bœuf (23-VarC),
- 11 ind. le 05/04/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP).

Les dernières mentions printanières proviennent toujours de l'étang de Landes où 3 oiseaux sont observés le 15/04/03 (23-PalG) et 1 oiseau le 24/04/04 (23-ChaG). En période de reproduction, l'espèce se fait très rare dans la région. Seul un couple est observé à l'étang de Landes jusqu'au 18/05/03 (23-BarJ) mais la reproduction n'a pas été avérée.



Raphaël Bussière

Fuligule milouinan (*Aythya marila*)

- Cette espèce fait l'objet de 2 mentions :
 - 3 ind. (1F+2M) le 08/03/03 à l'étang de Murat (87-CavP),
 - 1 ind. le 18/01/04 à l'étang Boutilly (87-CavP).

Macreuse brune (*Melanitta fusca*)

- Une femelle a stationné du 23/12/02 au 10/01/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-AurA et al.). Une autre observation concerne celle d'un individu présent le 12/01/03 à l'étang de la Côte (87-CavP).

Garrot à œil d'or (*Bucephala clangula*)

- Pendant l'hiver 2002/2003, l'espèce est observée sur trois sites :
 - 1 ind. le 12/01/03 au lac de Vassivière (23-BouP),
 - 1 mâle le 12/01/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
 - 1 mâle présent du 13/02/03 au 29/03/03 à l'étang de Landes (23-PalG, DupE et al.).

L'hiver 2003/2004, une femelle est observée à plusieurs reprises du 11/11/03 au 01/04/04 à l'étang de Landes (23-DupE et al.) et un mâle est contacté sur ce même site les 14/03/04 et 02/04/04 (23-DupE).

Harle piette (*Mergellus albellus*)

● L'espèce a été contactée au cours des deux hivers et ne concerne que des femelles ou des immatures.

- 1 ind. le 11/01/03 à Crozant (23-LacB),
- 3 ind. le 19/01/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 02/03/03 à l'étang de Landes (23-SauJ),
- 1 ind. le 31/01/04 à l'étang de Gouzon (23-DupE),
- 1 ind. le 31/01/04 à l'étang de Landes (23-BarJ).

Harle bièvre (*Mergus merganser*)

● L'espèce apparaît dans la région limousine en hiver à l'occasion des vagues de froid. Aucun département n'a été échappé par sa présence. 6 sites ont accueilli l'espèce : étang de Chabannes (19), lac des Bariousses (19), lac de Vassivière (23), étang le Mail (87), étang des Oussines (19) et le lac de Saint-Pardoux (87).

Présence de l'espèce en hiver 2002/2003 :

- 2 ind. le 08/12/02 au lac de Vassivière (23-MerC),
- 1 mâle le 22/01/03 à l'étang de Chabannes (19-LabD),
- 7 ind. (4F+3M) le 22/01/03 au lac des Bariousses (23-LabD et BerF),
- 1 ind. le 23/02/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 7 ind. (6F+1M) le 15/03/03 à l'étang des Oussines (19-SauJ),
- 3 ind. (1M+2F) le 17/03/03 à l'étang de Chabannes (19-LabD).

Présence de l'espèce en hiver 2003/2004 :

- 1 ind. le 30/11/03 à l'étang de Chabannes (19-SauJ),
- 2 femelles le 31/12/03 à l'étang le Mail (87-DesF),
- 11 ind. le 25/01/04 à l'étang de Chabannes (19-VarC),
- 6 ind. le 25/01/04 à l'étang des Oussines (19-VarC),
- 1 ind. présent du 05/02/04 au 08/02/04 à l'étang des Oussines (19-CheJ et ChMa),
- 5 ind. le 08/02/04 à l'étang de Chabannes (19-LabG).

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)

● En 2002, la migration postnuptiale débute le 17/08 avec 1 individu à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ). Le passage culmine fin août début septembre, avec notamment 142 oiseaux en 7 heures d'observations le 31/08/02 à Flavignac (87-PreP), et surtout 600 oiseaux en 3h30 d'observations le 07/09/02 à Brignac-la-Plaine (19-LabD). Ce jour là, vers 15h, environ 500 bondrées se suivaient en file indienne à très haute altitude, formant par moment des pompes d'une centaine d'individus ! Les 3 derniers individus de 2002 sont observés le 29/09 à Rilhac-Lastours (87-LabB). En 2003, les premiers départs sont notés le 15/08, avec 14 individus à Tercillat (23-NauP). Comme en 2002, c'est à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre que passe la majeure partie des oiseaux. L'effectif le plus important est obtenu le 04/09/03, avec 179 bondrées en 3h30 à Flavignac (87-PreP). Les dernières sont observées le 29/09/03 (la même date qu'en 2002), avec 5 individus à Neuvis (19-BarJ). Enfin, puisque cette synthèse intègre les données allant jusqu'à mi-août 2004, notons les premiers départs de l'année 2004 dès le 01/08, avec 1 migrateur précoce à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Le retour des quartiers d'hivernages africains est tardif chez la bondrée. En 2003, un premier individu est contacté le 19/04 à Ussel (19-DefP), et les retours se généralisent en mai. La migration prénuptiale est beaucoup moins marquée que la postnuptiale, et les observations ne dépassent pas la dizaine de migrants par jour. Le dernier de la saison est contacté le 22/05/03 à Limoges (87-VirA). En 2004, un oiseau est contacté le 08/03 à Saint-Silvain-Montaigut (23-BarG), à une date étonnamment précoce pour l'espèce. Pour le reste, c'est le même scénario qu'en 2003, le dernier migrateur étant observé le 23/05/04 à Isle (87-MarQ).

De manière classique, les données de Bondrée apivore en période de reproduction sont nettement moins nombreuses que celles concernant les migrants. Les observations se répartissent sur tout le Limousin, mais peu de données faisant état d'une reproduction certaine : jeunes oiseaux recueillis en Centre de soins sans que la date d'envol ne soit connue (87-CenS), nid avec poussins le 13/08/04 à Ajain (23-NorT) et un nid occupé en 2003 et 2004 à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT). Cette espèce, discrète lors de la nidification, mériterait d'être un peu plus recherchée.

Milan noir (*Milvus migrans*)

● Une seule donnée de migration postnuptiale en 2002 : 1 individu le 20/10 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Cette donnée est tardive, il s'agit d'ailleurs du dernier oiseau contacté cette année là. Cependant, la période prise en compte commence le 16/08/02, et une bonne part des migrants traverse le Limousin dès juillet. En 2003, les deux premiers migrants sont notés le 26/07 à Flavignac (87-PreP). Quelques individus sont

observés en août et début septembre, mais aucun groupe d'importance, et sans qu'il soit possible de distinguer une phénologie précise du passage. Le dernier Milan noir est contacté le 19/09/03 à Moutier-Rozeille (23-DelP). Les premiers départs de 2004 sont similaires en dates et effectifs à 2003.

Le retour d'Afrique se produit à des dates classiques. En 2003, un premier Milan noir est contacté le 24/02 à Varetz (19-FauB). La plupart arrivent en mars, mais des oiseaux en migration active sont observés jusqu'au 19/04/03, avec 5 individus à Flavignac (87-PreP). 2004 voit le premier Milan noir passer le 04/03 à Vareilles (23-MerC). À noter que le mois de mars cumule l'ensemble des données de migrateurs prénuptiaux.

Les nombreuses données en période de reproduction témoignent d'une bonne présence de l'espèce sur l'ensemble de la région. En 2003, la reproduction est prouvée en Haute-Vienne au Châtenet-en-Dognon (87-BarJ), au Dorat (87-EyrO), à Flavignac, où la couvaison est observée sur un nid dans un chêne le 16/04 (87-PreP), à Saint-Julien-le-Châtel (23-NorT), à Pionnat (23-NorT), à Saint-Fiel (23-NorT) pour la Creuse, et des jeunes à l'envol le 15/07 à Laval-sur-Luzège (19-NorT et RubB) pour la Corrèze. En 2004, elle est constatée à Lappleau (19-BarJ) et à Aubazines (19-MaPi) pour la Corrèze, à Saint-Laurent-les-Églises (87-EyrO), à Bujaleuf, où des jeunes ont déjà quitté le nid le 14/06 (87-GauR) et à Cieux, avec un jeune encore sur l'aire le 03/07 (87-BouH) pour la Haute-Vienne. Le Milan noir niche sur bien d'autres secteurs, sans doute moins prospectés au cours de la période considérée. Quelques rassemblements sont observés, ce qui est classique chez cette espèce grégaire. Ainsi, une trentaine d'individus sont dénombrés le 28/06/03 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-DauR).

Milan royal (*Milvus milvus*)


● C'est la migration postnuptiale qui donne lieu au plus grand nombre d'observations de cette espèce. En 2002, le premier Milan royal est signalé le 25/08 à Vicq-sur-Breuilh (87-EyrO) mais le passage débute réellement lors de la dernière décade de septembre. Il culmine dans la 2e quinzaine d'octobre et se poursuit jusqu'à fin novembre. Quelques migrateurs sont encore contactés en décembre, les 2 derniers étant observés en migration active le 25/12/02 à Brignac-la-Plaine (19-LabD). En 2003, la migration postnuptiale est lancée le 06/09 avec 1 individu à Lussat (23-DubG). Son déroulement est similaire à 2002. L'effectif maximum est de 88 oiseaux en 3 heures d'observations le 12/10/03 à La Roche-l'Abeille (87-DumA). Le dernier oiseau en migration active est contacté le 07/11/03 à Flavignac (87-PreP), bien que les individus observés plus tard comprennent certainement des migrateurs et pas seulement des hivernants.

De fait, il est difficile de différencier les migrateurs postnuptiaux tardifs (en début d'hiver), ou les migrateurs prénuptiaux précoces (en fin d'hiver), des individus réellement hivernants dans notre région. Comme tend à le prouver le peu de données, ces derniers sont probablement peu nombreux, sauf peut-être à l'Est de la région. L'hivernage est mis en évidence à Leyrat, où un dortoir de 4 individus est signalé le 03/01/03 (23-NorT). Le constat est le même lors de l'hiver 2003/2004, avec très peu de données entre la mi-décembre et fin janvier. Un dortoir de plusieurs dizaines d'individus est signalé le

29/02/04 à Bort-les-Orgues (19-RioR), dans un secteur qui accueille probablement de nombreux hivernants, le dortoir se trouvant côté Cantal ou côté Corrèze selon les années.

En 2003, 22 migrateurs prénuptiaux sont observés dès le 10/02 à Vignols (19-CelJ). Le passage culmine de la dernière décade de février à la mi-mars, et se termine début avril. Quelques migrateurs tardifs sont contactés encore plus tard : 9 ind. le 28/04/03 à Saint-Léonard-de-Noblat (87-BarJ) et 1 ind. le 14/05/03 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ). Le passage prénuptial est similaire en 2004. Les 4 premiers migrateurs sont observés le 07/02/04 à Meymac (19-LabD). Alors que le passage se termine au tout début du mois d'avril, notons à nouveau deux données de migrateurs tardifs cette année là : 1 ind. le 01/05/04 à Flavignac (87-PreP), et 2 ind. le 15/05/04 à Saint-Aulaire (19-FauB).

La reproduction du Milan royal en Limousin est très (trop !) mal documentée, alors que cette espèce est présente à l'Est de la région. Ainsi sur la période considérée, seulement 2 preuves certaines de reproduction sont apportées : 3 jeunes volants sont observés le 19/06/03 à Bort-les-Orgues (19-CelJ), et un nid occupé est trouvé le 08/05/04 à Neuvic (19-BarJ). Des indices de reproduction probable sont obtenus à Saint-Laurent-les-Églises (87-LanJ et Eyro) et à Sérandon (19-DupE). Des études en cours permettront bientôt de mieux préciser le nombre et la répartition des couples nicheurs.



Vautour fauve (*Gyps fulvus*)

● Trois données du printemps / été 2003, une par département :

- 7 ind. en vol vers le Nord-ouest le 28/04/03 à Turenne (19-DauR),

- 1 ind. le 11/05/03 à La Celle-Dunoise (23-Beli),

- 2 ind. en vol vers l'Ouest le 24/06/03 à Neuville-Entier (87-DalS).

L'augmentation des colonies françaises, notamment celle des Grands Causses dans le Sud du Massif Central, induit une augmentation des observations de Vautours fauves dans notre région. L'espèce, et notamment les jeunes individus, est sujette à de grands déplacements. C'est au printemps que les déplacements vers le Nord sont les plus marqués. Ces données s'inscrivent parfaitement dans ce contexte.



Raphaël Bussière

Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)


● En 2002, lors de la migration postnuptiale, 3 individus sont contactés : 1 ind. le 02/09 à Moissannes (87-BarJ), 1 ind. le 07/09 à Brignac-la-Plaine (19-LabD) et 1 ind. le 12/09 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ) faisant l'objet de la dernière observation de l'année. En 2003, aucun individu n'est observé en migration postnuptiale active. Mais le dernier oiseau de l'année, vu le 22/10/03 à Lussat (23-VarC), correspond vraisemblablement à un migrateur. Enfin, un migrateur est contacté le 12/08/04 à Aix-sur-Vienne (87-PreP), en début de migration postnuptiale 2004.

Les retours ont lieu à la fin du mois de mars : le 22/03/03 à Meymac (19-MerC) et le 24/03/04 à Chasteaux (19-DupE). Un seul oiseau est observé en migration prénuptiale active, le 10/04/03 à Blond (87-CavP).

En relation avec le faible nombre de couples présents en Limousin, peu d'indices de reproduction sont notés au cours de la période. Notons 2 individus criant en vol (parades ?) le 24/04/03 à la tourbière du Longeyroux (19-NauD), et 4 individus (2 couples ?) observés le 31/05/03 à la lande de Marcy (19-SauJ), commune de Saint-Merd-les-Oussines. Deux preuves de nidification de l'espèce en Corrèze :

- 1 jeune au nid le 15/07/03 et échec en 2004 à Laval-sur-Luzège (19-NorT),

- 1 échec en 2004 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT).



Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)


La migration postnuptiale du Busard des roseaux est généralement bien étalée. En 2002, elle débute le 31/08 avec 2 individus à Flavignac (87-PreP), et culmine vers la mi-septembre avec notamment 6 individus le 21/09 toujours à Flavignac (87-PreP). Le dernier migrateur est contacté le 28/10/02, encore par notre spécialiste de la migration sur son site d'observation préféré à Flavignac (87-PreP). En 2003, le premier migrateur est contacté le 24/08 à Flavignac, suivi dès le lendemain par 3 autres individus, signe que la migration a bien repris (87-PreP). D'après les données recueillies, le passage semble culminer fin août / début septembre. Le dernier migrateur est contacté le 17/10/03 à Flavignac (87-Pral). Pendant la migration postnuptiale, des Busards des roseaux sont également observés en halte sur des plans d'eau.

Quelques individus sont observés en plein hiver sur certains étangs du Limousin mais l'hivernage ne semble régulier qu'à l'étang de Landes où l'espèce est contactée à l'unité le plus souvent.

La migration prénuptiale reprend en mars, et le stationnement d'oiseaux sur les étangs devient plus marqué. Notons 6 individus le 02/03/03 à l'étang de Landes (23-SauJ). Seuls 3 individus sont notés en migration active ce printemps-là, tous

début avril. Passé la mi-avril, l'espèce n'est observée qu'à l'étang de Landes. Au printemps 2004, les données sont moins nombreuses, avec seulement 2 oiseaux en migration active. Passé début avril, une seule observation provient de l'étang de la Pouge avec 1 femelle le 09/06/04 (87-MarQ).

La reproduction n'est envisageable que sur l'étang de Landes. En 2003, un couple est observé le 15/04 (23-PalG), et l'espèce est contactée pendant toute la saison de reproduction, sans qu'aucune preuve ne soit obtenue. Par contre, en 2004, l'espèce semble absente du site de début mai à début août.



Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*)

Comme à l'accoutumée, peu d'individus sont contactés en migration, le passage étant peu sensible et bien étalé chez le Busard Saint-Martin. Lors de la migration postnuptiale 2002, le premier individu est signalé le 31/08 à Flavignac (87-PreP). Le passage culmine en octobre, les migrateurs étant généralement observés à l'unité. Notons 3 individus sur la journée du 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ). Le dernier est contacté le 13/11/02 à Flavignac (87-PreP). La migration postnuptiale 2003 est moins riche en observations. Le premier individu est signalé le 24/08/03 à Flavignac (87-PreP). Les données augmentent en octobre, le dernier étant contacté le 20/10/03 à La Roche-l'Abeille (87-DumA). Notons que les observations de migrateurs, chez cette espèce comme chez toutes les autres, sont biaisées parce que nombre d'observateurs ne suivent que certaines périodes de l'année (en octobre pour le passage des Pigeons ramiers et des Grues cendrées par exemple).


L'hivernage de l'espèce est bien documenté, notamment grâce au suivi des dortoirs. Les premiers dortoirs sont notés en octobre. Ainsi, 5 individus sont comptés le 20/10/02 à la Butte de Frochet (87-DouA). Au cours de l'hiver 2002-2003, 5 dortoirs sont recensés

en Haute-Vienne, 1 en Corrèze et 1 en Creuse. La Haute-Vienne bénéficie cet hiver-là d'un suivi précis qui fera l'objet d'un article dans un Epops à paraître. Le plus gros dortoir est sans conteste celui de l'étang de Landes (23), où l'effectif remarquable de 24 individus est dénombré le 24/01/03 (23-SauJ). Le dernier dortoir est signalé le 09/03/03 avec 5 individus à Bussière-Boffy (87-DouA). L'année suivante, le 1^{er} comptage est réalisé le 18/10/03, avec 4 individus à Bussière-Boffy (87-DouA). En Haute-Vienne, un nouveau site est signalé. Il s'agit de la lande de Massaloux, commune de Gorre, qui accueille 9 individus le 20/02/04 (87-ChoP). Aucun dortoir n'est noté en Corrèze. En Creuse, le dortoir de l'étang de Landes monte à 20 busards le 26/12/03 (23-SauJ). Le dernier est signalé le 18/03/04 à Bussière-Boffy (87-LabB), avec 1 individu. Notons que les busards en migration fréquentent aussi les dortoirs pendant la période des passages.

Les Busards Saint-Martin observés en migration pré-nuptiale active sont rares. En 2003, 1 individu est signalé le 22/02 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), 1 ind. le 09/03 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS) et 2 ind. le 23/03 à Moissannes (87-BarJ). En 2004, 1 individu est contacté le 13/03 et 1 autre le 15/04 à Flavignac (87-PreP). Ces données illustrent la discrétion et l'étalement dans les dates du passage.

L'espèce est contactée toute l'année, et il est probable qu'une partie des nicheurs limousins soit sédentaire. En 2003, la reproduction est prouvée à Bussière-Galant (87-EyrO), à Cieux (87-DouA et EyrO) et à Bussière-Boffy (87-DouA) où malheureusement un incendie dans la lande détruit un nid contenant 2 œufs trouvés le 19/06. En 2004, la

Carte de répartition du Busard Saint-Martin en période de reproduction (2003 et 2004)



reproduction n'est prouvée qu'à Bussière-Boffy (87-CREN), et elle est suspectée à Saint-Auvent (87-DohR). La grande discrétion de l'espèce à cette période de l'année explique cette carence de données, qui ne reflètent pas la réalité. Notons la destruction partielle de la lande de la Haute-Renaudie (87), lors du printemps 2004. Ce site, inscrit en ZNIEFF et faisant partie des zones sensibles à actions prioritaires du PNR Périgord-Limousin, fut partiellement labouré par un agriculteur, en toute connaissance de cause. La reproduction du Saint-Martin, constatée en 2003, n'a pu avoir lieu alors que les adultes étaient présents (EyrO). Dans la même catégorie, notons l'observation d'un tir de chasseur de bécasses sur un Busard Saint-Martin (tir manqué ou d'effarouchement ?) le 17/11/02 à Château-Chervix (87-VirA).

Busard cendré (*Circus pygargus*)

● Seulement 7 données de Busard cendré en 2 ans ! Toutes proviennent de Haute-Vienne. Aucun oiseau en migration postnuptiale en 2002. En 2003, 1 mâle probablement en dispersion postnuptiale le 07/07 à Peyrilhac (87-BouP). 3 données de migrateurs dans la dernière décade d'août, dont 2 mâles le 31/08/03 à Flavignac (87-PreP). Enfin en 2004, 1 juvénile le 02/08 à Folles (87-VinS), probablement en dispersion postnuptiale. Concernant la migration prénuptiale, 1 individu observé le 14/03/03 à Couzeix (87-ThoF), et l'année suivante, 1 couple le 06/04/04 à Mézières-sur-Issoire (87-CavP). Aucune donnée ne permet réellement d'envisager la reproduction du Busard cendré, qui, en tant que nicheur, semble avoir bel et bien disparu du Limousin.

Autour des palombes (*Accipiter gentilis*)

● 33 données d'Autour des palombes en 2 ans. Même si l'espèce est très discrète, c'est relativement peu. Seulement 3 données concernent des individus en migration, toutes postnuptiales : 1 mâle le 02/09/02 à Moissannes (87-BarJ), 1 femelle le 13/10/02 également à Moissannes (87-BarJ) et 1 ind. le 04/11/03 à Flavignac (87-PreP). L'espèce, sédentaire en Limousin, est contactée à toutes les périodes de l'année. Aucun individu n'est observé en migration prénuptiale.

La reproduction est peu documentée. Le 31/03/03, un couple parade à Pérois-sur-Vézère (19-LabD). Le 06/04/03, des querelles entre des Faucons pèlerins et un couple d'Autours des palombes sont rapportées à Bort-les-Orgues (19-PinD). Enfin le 17/06/04, un juvénile est observé à Dournazac (87-EyrO). Il y a donc 3 cas de reproduction probable tandis qu'une seule reproduction certaine a été prouvée, celle d'un couple ayant élevé 3 jeunes en 2003 et 2 jeunes en 2004 sur la commune de Ladapeyre (23-NorT).

Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*)

● Lors de la migration postnuptiale 2002, le premier migrateur est signalé le 30/09 à Ambrugeat (19-AlbD). Le passage culmine dans les deux dernières décades d'octobre, avec notamment 5 individus dans la journée du 20/10/02 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). Le dernier migrateur est contacté le 03/11/02 à Meymac (19-AlbD). En 2003, le passage débute le 29/09, avec 1 migrateur à Flavignac (87-PreP). Le déroulement est similaire à 2002, avec une concentration du passage en octobre. Là encore, le maximum est de 5 individus dans la journée du 12/10/03 et celle du 24/10/03 à Moissannes (87-BarJ). Le dernier migrateur est contacté le 13/11/03 à Flavignac (87-PreP). Les données hivernales sont nombreuses. En 2003, le passage prénuptial est observé du 09/03, avec 1 individu à La Roche-l'Abeille (87-DumA), au 06/04, avec 1 individu à Bort-les-Orgues (19-PinD), pour un total de 6 individus. Seuls 2 individus sont contactés lors du passage prénuptial en 2004 : 1 ind. le 13/03 et un autre le 17/03 à Flavignac (87-PreP).

Les indices de reproduction sont répartis sur les 3 départements. La reproduction est prouvée à Isle avec un jeune volant le 17/07/03 (87-VirA), et à Leyrat avec la découverte d'un nid garni de 5 jeunes (23-NorT) puis en 2004 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ), à Lafat (23-BieJ), à Leyrat (23-NorT), et à Verneuil-sur-Vienne (87-LanJ) où un nid avec poussins est découvert le 18/07, date tardive. La prédation est observée sur les espèces suivantes : hirondelle sp. (CavP), Merle noir (DouA et BarJ), Geai des chênes (BarJ), Etourneau sansonnet (HubP), Moineau domestique (EyrO), Linotte mélodieuse (NorT) ou encore Tarin des aulnes (EyrO).

Buse variable (*Buteo buteo*)

Il s'agit de l'espèce de rapace la plus observée en Limousin. Les oiseaux en migration ne sont pas toujours faciles à détecter. En effet, ils côtoient en vol des individus locaux, et il faut les suivre parfois longtemps pour s'assurer de leur comportement migratoire. Difficile à réaliser quand on est seul et que d'autres espèces passent en même temps ! Lors du passage postnuptial de 2002, la première est signalée le 15/09 à Ayen (19-FauB). Le passage culmine dans la 2e quinzaine d'octobre. La dernière est notée le 24/11/02 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Lors du passage postnuptial de 2003, une migratrice précoce est contactée le 22/08/03 à Lussat (23-DupE). Un total remarquable de 53 migratrices est observé sur la journée du 24/10/03 à Flavignac (87-PreP). Les 2 dernières sont notées le 27/10/03 sur ce même site (87-PreP).

Le passage prénuptial est observé fin février et en mars. En 2003, 13 migratrices sont comptées dans la journée du 27/02 à Flavignac (87-PreP). Les 2 dernières sont notées le 17/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). En 2004, 3 données sont de la mi-mars, dont 5 migratrices le 16/03 à Vars-sur-Roseix (19-CreD). Enfin, 1 migratrice tardive est observée le 15/04 à Eymoutiers (87-RogJ).

La nidification est notée en de nombreux secteurs. En général, l'espèce pond entre 3 et 4 œufs mais une observation mentionne la présence de 5 œufs dont 2 de très petites tailles le 03/05/03 à Jarnages (23-NorT). La plupart des nids signalés sont dans des chênes, mais mélèze, Douglas et sapin sont également cités comme supports. Plusieurs buses très blanches sont observées au cours de la période considérée. L'une d'elle a le plumage blanc pur, sans aucune trace sombre, comme le plumage d'une Aigrette garzette. Cet oiseau, cantonné sur les communes de Saint-Laurent-les-Églises et du Châtenet-en-Dognon (87-BarJ, MerC et EyrO), est observé à plusieurs reprises depuis le 05/03/03. Il est a priori toujours vivant lors de la rédaction de cette synthèse, puisque je l'ai encore observé cette semaine, en juin 2007.



Raphaël Bussière


Aigle botté (*Aquila pennata*)

Très peu de données pour cette espèce, présente surtout dans le Sud et l'Est de la Corrèze. Une seule donnée en migration postnuptiale : 4 individus sont observés le 01/09/03 à Sérandon (19-BarJ). Les départs semblent surtout avoir lieu en septembre. Le plus tardif, un juvénile, est contacté le 20/10/02 à Liginiaç (19-CNN). Les retours ont lieu à partir du mois d'avril. L'oiseau le plus précoce est observé le 03/04/04 à Aubazines (19-MarP). Un seul individu est noté en migration pré-nuptiale active, le 09/04/03 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ). Il s'agit d'ailleurs de la seule donnée non corrézienne. La reproduction est probable à Aubazines (19-MaPi), où un individu parade le 03/04/04, ainsi qu'à Sérandon, où un couple parade le 28/05/04 (19-BarJ). En période de nidification, l'espèce est nicheuse sur les communes suivantes :

- Argentat avec 1 jeune au nid en 2003 et 2 jeunes en 2004 (19-NorT),
- Lapleau avec 2 jeunes au nid en 2003 (19-NorT),
- Monceaux-sur-Dordogne, 2 jeunes non émancipés avec couple en 2003 et 1 jeune au nid en 2004 (19-NorT),
- Saint-Martin-la-Méanne avec 1 jeune au nid en 2003 (19-NorT),
- Servières-le-Château avec 2 jeunes au nid en 2003 et 1 jeune au nid en 2004 (19-NorT),
- Soursac avec 2 jeunes au nid en 2003 et 2004 (19-NorT).

Pour 18 individus, la forme est précisée : 11 sont de forme claire et 7 de forme sombre.

**Carte de répartition de l'Aigle botté pour la période du
16/08/02 au 15/08/04**



Aigle royal (*Aquila chrysaetos*)

● Un Aigle royal juvénile, houspillé par des Corneilles noires, est observé le 08/11/02 à l'étang de la Ramade (23-SauJ). Cette donnée s'inscrit dans un contexte classique d'errastisme des jeunes Aigles royaux.

PANDIONIDÉS

Balbusard pêcheur (*Pandion haliaetus*)

● Le Balbusard pêcheur est régulièrement observé lors des 2 passages. Environ la moitié des observations concerne des individus en halte migratoire sur des étangs ou des cours d'eau. Un tiers concerne des individus en migration active (et probablement plus en réalité, le comportement n'étant pas toujours précisé). L'espèce est contactée sur l'ensemble du Limousin. 88% des individus sont notés à l'unité. L'effectif maximal est noté le 06/04/03 à l'étang de la Ramade, avec 4 individus ensembles (23-LerT).

En 2002, le passage postnuptial débute le 30/08, avec un migrateur à Peyrelevade (19-SauJ). Il culmine nettement dans la 2^e quinzaine de septembre. Notons ainsi le passage de 8 migrants en 3h30 d'observations le 21/09 à Flavignac (87-PreP). Le dernier, en migration lui aussi, est contacté le 20/10 à Château-Chervix (87-CouR). En 2003, le premier oiseau du passage postnuptial est observé le 29/07 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP). Les premiers individus en migration active sont signalés fin août, et le passage culmine en septembre. Le dernier oiseau de l'année est observé le 29/09 à Neuville (19-BarJ). Enfin, en 2004, le passage postnuptial débute dès le 05/07 avec un oiseau en halte à l'étang de Tricherie (87-SegB). 2 oiseaux en migration active sont observés dès la 1^{ère} quinzaine d'août.

Concernant le passage prénuptial, en 2003, un premier migrateur précoce est signalé le 09/02 à Cognac-la-Forêt (87-DouA). Le passage commence réellement à la mi-mars, et est marqué jusqu'à la mi-avril. Une seule donnée en mai, avec un oiseau le 18/05 à Bujaleuf (87-FitV). En 2004, le premier migrateur prénuptial est noté le 08/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Le passage culmine de mi-mars à mi-avril. 2 données en mai : 1 ind. le 02/05 à l'étang de Landes (23-DupE), et 1 ind. le 25/05 à Peyrilhac (87-BouP).

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)

● Les nicheurs limousins sont sédentaires. Cependant, notre région est traversée par des migrateurs. Ces derniers sont surtout observés en migration postnuptiale. En 2002, 3 individus sont notés sur la journée du 21/09 à Flavignac (87-PreP). Les autres sont observés en octobre, les 4 derniers le 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ), à Monceaux-sur-Dordogne (19-TeuJ) et à Davignac (19-VilO). Le total est de 9 individus pour le passage postnuptial en 2002. En 2003, 3 migrateurs sont signalés dès le 14/09 à Ayen (19-FauB). Le passage se déroule de fin septembre à mi-octobre. Notons ainsi 5 migrateurs en 2h d'observations le 28/09 à Neuvic (19-BarJ). Le dernier est contacté le 20/10 à La Roche-l'Abeille (87-DumA). Ce passage concerne 25 individus. En 2004, un seul oiseau est observé en migration prénuptiale, le 17/03 à Flavignac (87-PreP).

La reproduction est signalée à de nombreuses reprises, l'espèce étant commune en Limousin. Les aires sont fréquemment trouvées dans des bâtiments. La plus grosse ponte signalée contient 6 œufs, le 02/05/03 à Flavignac (87-Pral). Des tentatives de prédation sur des oiseaux sont observées : Bécasse des bois (NedS) et Pipit farlouse (EyrO et VirA).

Faucon kobez (*Falco vespertinus*)

● Une femelle est observée les 10/05/03 et 11/05/03 en vol de chasse à Saint-Pierre-le-Bost (23-NorT), à une date classique pour l'espèce.



Etienne Dupoux

Faucon émerillon (*Falco columbarius*)

● 24 observations pour ce petit faucon venu du Nord. 3 individus sont observés lors du passage postnuptial en 2002. Le premier est vu le 17/10 en migration à Flavignac (87-PreP), et le dernier le 28/10 à Meilhac (87-LabB). 9 individus sont observés lors du passage postnuptial en 2003. Le premier est vu le 15/10, et le dernier le 26/10, tous les 2 en migration, à Flavignac (87-PreP). La migration a donc lieu principalement au mois d'octobre.

Plusieurs données peuvent correspondre à des Faucons émerillons hivernant en Limousin. 3 individus sont vus en janvier 2003, un dans chaque département. 5 données sont signalées l'hiver suivant, 1 en Creuse et les autres en Haute-Vienne. Une femelle est observée le 24/11/03 et le 26/12/03 à Nexon (87-SelP), seul véritable indice de l'hivernage de l'espèce dans notre région.

Le passage prénuptial donne lieu à une seule donnée en 2003 avec un individu le 06/04 à Saint-Germain-Beaupré (23-DubG). En 2004, 1 individu est observé le 14/03 à Thiat (87-CavP), 1 individu le 20/03 à Glandon (87-CelJ) et 1 individu très tardif (estivant ?) le 17/06 à Lussat (23-DupE).

Faucon hobereau (*Falco subbuteo*)

● Espèce peu observée en migration active. En 2002, le premier migrateur postnuptial est noté le 02/09 à Moissannes (87-BarJ). Le passage est surtout observé en septembre, avec notamment 3 migrateurs le 14/09 de nouveau à Moissannes (87-BarJ). Le dernier de l'année est contacté en migration le 20/10 à Davignac (19-VilO). En 2003, le seul oiseau en migration postnuptiale active est noté le 05/10 à Flavignac (87-PreP). C'est également la date la plus tardive cette année-là. Le retour a surtout lieu en avril. La donnée, la plus précoce, est obtenue le 29/03/04 à Neuville (19-BarJ). Aucun individu n'est observé en migration prénuptiale active au cours de la période considérée. La reproduction n'est prouvée qu'à 3 reprises : à Rilhac-Lastours (87-LabB), à Brignac-la-Plaine (19-LabB) et à Perpezac-le-Blanc où 3 jeunes sont encore à l'aire le 05/09/02 (19-LabD).

Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*)

● Cette espèce charismatique est bien suivie par les observateurs. Un seul individu est contacté en migration active, le 27/10/02 à La Roche-l'Abeille (87-DumA). Des hivernants sont signalés sur des secteurs où l'espèce ne niche pas. Il peut s'agir d'oiseaux nichant plus au Nord ou bien d'oiseaux nichant en Limousin sur d'autres secteurs. L'espèce est ainsi observée toute l'année dans les 3 départements.

Les nicheurs limousins sont plus ou moins sédentaires. Au cours de la période considérée, 9 couples nicheurs certains sont trouvés en Corrèze, 4 en Haute-Vienne et 1 en Creuse. Les données témoignent d'une expansion nette de l'espèce. Le nombre de couples trouvés n'est certes pas exhaustif, mais il est important si l'on considère la rareté

du Faucon pèlerin et le peu de données obtenues pour des rapaces plus communs. Dès le mois de février, les couples sont signalés sur les sites de reproduction. C'est la période des parades. Des accouplements sont signalés le 23/02/04 en Corrèze (DauR). La couvaison débute dès la fin mars / début avril, par exemple le 02/04/03 en Haute-Vienne (BarJ). Pour un couple provenant de la Haute-Vienne très précoce, les poussins sont notés le 14/04/04 (SegB), et leur envol est constaté dès le 24/04/04 (MorS). L'envol a généralement lieu à partir de la mi-mai. Dans le cas d'un couple Haut-viennois plutôt tardif, les jeunes sont encore notés au nid le 14/06/04 (GauR).

La prédation sur les espèces suivantes, réussie ou simplement tentée, est constatée : Grèbe sp. (TulY), Canard colvert (BarJ), Vanneau huppé (MorS), Pigeon biset urbain (DumA), Pigeon ramier (BarJ et EyrO), Tourterelle des bois (MigF), Pic sp. (DouB), Merle noir (EyrO), Grive musicienne (BarJ) et Grive litorne (BarJ).

PHASIANIDÉS

Perdrix rouge (*Alectoris rufa*)

● Les observations concernent souvent des groupes issus de lâchers. Le groupe noté le plus important est de 10 oiseaux le 03/09/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Parmi les 46 données, 2 laissent envisager des nidifications probables avec un couple le 03/04/03 à Azat-le-Riz (87-DouA) et un autre le 12/04/04 à l'étang de Cieux (87-LacB).

Perdrix grise (*Perdix perdix*)

● Beaucoup moins de données que pour sa cousine, seulement 6 observations ont été effectuées durant la période considérée, comme le 28/05/03, où un individu est observé au bord de la Vienne à Limoges (87-ArnL).

Caille des blés (*Coturnix coturnix*)

● Ce migrateur retrouve la région limousine le 18/03/03 avec un mâle chanteur entendu à l'étang de Landes (23-BarJ). L'observation la plus tardive de la période provient le 07/08/03 à Chard (23-Pral). Aucune reproduction certaine n'est relevée mais notons tout de même trois indices probables en 2003, dont un couple observé le 06/07/03 à Soudaine-Lavinière (19-HubP).

Faisan vénéré (*Syrnaticus reevesii*)

● Un individu est observé le 30/03/03 à Châtenet-en-Dognon (87-MerC), et une autre observation, le même jour, non loin du Pont du Dognon à Saint-Laurent-les-Églises (87-EyrO).

Faisan de Colchide (*Phasianus colchicus*)

● La majorité des données proviennent du département de la Haute-Vienne. Seuls 3 cas de nidifications certaines sont notées durant l'année 2004 (aucune en 2003) :

- 3 jeunes volants le 17/06/04 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- jeunes volants le 01/08/04 à Lavignac (87-PreP),
- 6 jeunes le 15/07/04 à Limoges (87-VirA).

Ces quelques nidifications ne doivent pas faire oublier que la «population» limousine est totalement artificielle. La quasi totalité des oiseaux étant issus des lâchers cynégétiques.

RALLIDÉS

Râle d'eau (*Rallus aquaticus*)

● Cet oiseau, difficile à observer, fait l'objet de 28 citations sur 10 sites connus :

Communes	Sites	Nombre de citations	
		2003	2004
Lagraulière (19)	Etang neuf	-	1
Palisse (19)	Etang de la Chareneuve	1	-
Flayat (23)	Etang de la Ramade	1	1
Le Grand-Bourg (23)	Etang de la Toueille	1	-
Lussat (23)	Etang de Landes	10	7
Lussat (23)	Etang de Tête de Bœuf	-	1
Azat-le-Ris (87)	Grand étang	1	-
Châteauponsac (87)	Les Fougères	1	-
Cieux (87)	Etang de Cieux	-	1
Saint-Martin-le-Mault (87)	Etang de la Mazère	2	-
	Total	17	11

À l'étang de Landes, 7 individus ont été recensés le 25/07/03 (23-VirA) et 3 individus le 03/03/04 (23-BarJ). Pour les autres sites, les contacts concernent des oiseaux isolés.

Marouette ponctuée (*Porzana porzana*)

- Les trois citations émanent de l'étang de Landes :
 - 1 chant entendu le 18/05/03 (23-BarJ),
 - 1 ind. observé le 09/07/03 (23-MigF),
 - 1 chant entendu le 25/07/03 (23-EyrO et VirA).

Râle des genêts (*Crex crex*)

- Cette espèce, en déclin en France, est notée à 6 reprises pour la période considérée.
4 citations en période de migration postnuptiale d'une part :
 - 1 chant entendu le 15/09/02 à Bussière-Galant (87-ChJp),
 - 1 chant entendu le 13/10/02 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
 - 1 ind. victime de la chasse le 20/10/02 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Desv),
 - 1 chant entendu le 15/09/03 à Bussière-Galant (87-ChJp).Et 2 citations en période de reproduction d'autre part :
 - 1 chant entendu le 31/07/03 à Châteauponsac (87-HubP),
 - 1 chant entendu le 21/07/04 l'étang des Bordes à Lussat (23-DubG).

Gallinule poule-d'eau (*Gallinula chloropus*)

- Cet oiseau est présent sur l'ensemble de la région. Le maximum d'individus observés est de 30 individus les 24/07/03 (23-VirA) et 13/09/03 (23-DupE) à l'étang de Landes.

16 individus sont dénombrés le 05/09/03 à l'étang de Murat (87-EyrO).

En période de reproduction, les premiers poussins sont découverts le 16/04/03 sur un canal à Objat (19-CreD). L'espèce est notée nicheuse certaine sur les communes suivantes : Lissac-sur-Couze (19-GauR), Objat (19-CreD), Azérables (23-MerC), Saint-Germain-Beaupré (23-RogJ), Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO), Dournazac (87-EyrO), Flavignac (87-PreP), Les Salles-Lavauguyon (87-LabB), Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA), Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ) et Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF).

Foulque macroule (*Fulica atra*)

- Les plus grosses concentrations sont notées à l'étang de Landes (23) :
 - 700 ind. le 29/08/03 (DubP),
 - 371 ind. le 11/11/03 (DupE),
 - 400 ind. le 11/04/04 (DubG).

Un groupe de 227 individus est dénombré le 19/01/03 sur le Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP).

Hormis l'étang de Landes, l'espèce est nicheuse certaine sur 6 sites :

- 2 nidifications avérées le 08/05/03 à l'étang de la Mazère (87-CavP),
- 1 ind. au nid le 10/05/03 à l'étang de la Pouge (87-BusR),
- 1 poussin le 25/05/03 à l'étang de Tête de Bœuf (23-DupE),
- 1 jeune non émancipé le 29/05/04 à l'étang de Lavaud (87-LabB),
- 1 ind. couve le 05/06/04 à l'étang de la Vierge (23-MorS),
- 5 jeunes le 20/06/04 à l'étang de la Chaume (23-MerC).

Raphaël Bussière



GRUIDÉS

Grue cendrée (*Grus grus*)

● Près de 1 700 citations de Grues cendrées sont enregistrées dans la centrale sur la période considérée. Près de 200 observateurs ont noté l'espèce dans leur carnet. 2003 est évidemment l'année la plus riche en observations car les citations concernent les migrations pré et post-nuptiales.

Migration postnuptiale 2002

Le premier contact de l'espèce est repéré le 13/09/02 à Aubusson avec une trentaine d'oiseaux entamant leur descente (23-Boul). C'est à partir du début du mois d'octobre que les observations deviennent régulières et un gros passage s'amorce le 11/10/02 avec entre autre :

- 1 000 oiseaux en 12 vols comptabilisés à Saint-Sulpice-les-Bois (19-AlbD),
- 400 ind. en 1 vol à Meuzac (87-Boye),
- 1 400 ind. en 1 vol à Neuvic (19-LapM).

Le lendemain (12/10/02), c'est 1 600 oiseaux qui passent au-dessus de Saint-Sulpice-les-Bois (19-AlbD). Des groupes de 10 à 400 oiseaux sont observés ici et là,

majoritairement en Haute-Vienne. Il faut attendre ensuite le 20/11/02 pour apercevoir un gros passage avec 1 500 oiseaux en formation à La Souterraine (23-SEPOL). D'autres groupes importants sont repérés :

- 1 000 ind. le 23/11/02 à Guéret (23-NorT),
- 1 000 ind. le 06/12/02 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Desv),
- 1 500 ind. le 07/12/02 à Lussat (23-LpoA),
- 1 780 ind. le 08/12/02 à Lussat (23-LpoA),
- 1 040 ind. le 18/12/02 à Vaulry (87-DouA).

Le dernier vol migratoire vers le Sud, composé de 30 oiseaux, est noté le 12/01/03 à Sainte-Feyre (23-VigY).

Migration prénuptiale 2003

Le chassé-croisé s'effectue à partir de la deuxième quinzaine de janvier, où des groupes d'oiseaux continuent leur migration vers le Sud, tandis que d'autres entament leur montée, comme ce groupe de 60 individus en migration active vers le Nord le 19/01/03 à Limoges (87-VirJ). Le passage s'intensifie jusqu'au mois de février et c'est à partir de fin février à début mars que la majorité des observations est effectuée :

- 2 000 ind. le 27/02/03 à Voutezac (19-Chal),
- 1 000 ind. le 05/03/03 à Oradour-sur-Glane (87-LarM),
- 1 000 ind. le 06/03/03 à Bourganeuf (23-DoIT).

La dernière mention de l'espèce fait l'objet de deux oiseaux en vol le 18/04/03 à Lussat (23-SauJ). Une observation «anormale» d'un groupe de 500 oiseaux notée le 30/06/03 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV).

Migration postnuptiale 2003

Le premier contact est celui d'un juvénile présent à l'étang de Landes le 09/08/03 (23-SotJ). Puis, il faut attendre plus d'un mois pour contacter à nouveau l'espèce qui se fait encore plutôt rare, mais un groupe de 3 oiseaux est observé en migration au Dorat (87-CavP). Comme pour la migration postnuptiale 2002, c'est au mois d'octobre que le passage de l'espèce culmine :

- 1 000 ind. le 14/10/03 à Ségonzac (19-MarJ),
- 10 000 ind. le 14/10/03 à Glandon (87-LacF),
- 1 600 ind. le 14/10/03 à Sainte-Feyre (23-VigY),
- 2 730 ind. le 14/10/03 à Moissannes (87-BarM),
- 4 000 ind. le 14/10/03 à Magnac-Bourg (87-GenG),
- 10 000 ind. le 15/10/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ),
- 3 200 ind. le 15/10/03 à Rilhac-Rancon (87-DouS).


Quelques groupes d'oiseaux se posent dans les chaumes, prés et viennent à proximité de l'eau pour y passer la nuit. L'étang de Lavaud est un site qui accueille l'espèce en petit nombre. Le 29/10/03, un groupe de 64 oiseaux a passé la nuit sur le site, et en scrutant ce groupe, un individu adulte porteur d'une combinaison de bagues couleurs a été repéré (87-BusR). L'oiseau a été bagué à Nittorp en Allemagne le 27/06/01 par Simone Roeper.

Le dernier vol se dirigeant vers le Sud est noté le 30/01/03 à Meuzac (87-BadF).


Migration prénuptiale 2004

Alors que des groupes continuent leur descente vers le Sud, d'autres débutent leur remontée vers leur site de nidification. Le premier groupe est signalé, en direction du Nord, le 02/02/04 à Saint-Junien (87-LerK). Le passage est faible au début du mois de février et se renforce dès le 15/02/04, où des groupes de 1 000 oiseaux sont contactés, comme à Saint-Sylvestre (87-MerC). Il arrive parfois que des individus soient affaiblis lors du voyage et certains ne pourront pas atteindre malheureusement les sites de nidification. Un mâle adulte est retrouvé mort le 25/02/04 à Saint-Mathieu (87-CouC). Mars est le mois des grues se dessinant dans le ciel en formation en «V». Ce sont des instants magiques, lorsque les groupes se succèdent les uns après les autres et ces moments là restent gravés dans la tête à tout jamais, comme cette observation de 20 000 individus le 10/03/04 à Saint-Yrieix-sous-Aixe (87-LabP). La dernière observation pour cette période concerne un groupe de 300 oiseaux le 04/05/04 à Flavignac (87-BuiM).

Carte des migrations postnuptiales de la Grue cendrée (2002 et 2003)



Carte des migrations prénuptiales de la Grue cendrée (2003 et 2004)



Échasse blanche (*Himantopus himantopus*)

- Vue exclusivement à l'étang de Landes (23) et lors de la migration prénuptiale :
 - 1 ind. le 04/04/04 (VirA),
 - 1 ind. le 19/04/03 (DesF),
 - 1 ind. le 03/05/03 (DupE),
 - 2 ind. le 07/05/03 (SotJ et SauJ).



Raphaël Bussière

Avocette élégante (*Recurvirostra avosetta*)

- Espèce observée sur un seul site, celui de l'étang de Landes (23) :
 - 7 ind. le 10/11/02 (BarJ),
 - 1 ind. le 01/12/02 (SauJ),
 - 8 ind. le 08/12/02 (LpoA),
 - 2 ind. le 08/04/03 (PalG),
 - 1 ind. le 27/04/03 (DupE).

À l'étang de Tête de Bœuf, non loin de celui de l'étang de Landes, deux individus, probablement les mêmes, sont vus à plusieurs reprises du 20/12/02 (HubP) au 28/12/02 (MerC).

BURHINIDÉS

Edicnème criard (*Burhinus oedicnemus*)

● Une seule donnée pour l'année 2003 : 1 individu entendu le 10/05/03 à Lussat (23-DubG). En 2004, le premier individu est observé le 04/05 à Azat-le-Ris (87-RayG). C'est ensuite 3 individus notés le 27/06/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-HubP), dont 2 mâles se querellant, et un mois plus tard, 3 individus sont observés sur le même site, probablement les mêmes oiseaux (87-EyrO). La tentative de nichée est avérée le 31/07/04 (87-MerC) lorsqu'un adulte est observé en position de couveur. Par la suite, les 3 oiseaux sont régulièrement contactés jusqu'au 13/08/04 (87-MerC et al.), date à laquelle un individu est encore observé posé sur le nid (87-MerC). Un œuf est aperçu le 02/08/04 (87-MerC). Ils seront rejoints par un quatrième adulte le 07/08/04 (87-SotJ).

Les rassemblements postnuptiaux n'ont fait l'objet d'aucune observation, au cours de la période considérée.

CHARADRIIDÉS

Petit Gravelot (*Charadrius dubius*)

● Le passage automnal se fait très discret. Aucune donnée n'est enregistrée pour 2002 et seulement 3 données le sont pour 2003. Le premier contact a lieu le 06/09/03 à l'étang de Landes avec l'observation d'un individu (23-DesF) et la dernière mention concerne un individu le 13/09/03 à l'étang de Murat (87-SotJ).

En migration prénuptiale, l'oiseau le plus précoce est signalé le 22/03/03 à l'étang de Landes (23-DupE) et le 13/03/04 à Ligniac avec 4 individus (19-BarJ). Les effectifs augmentent ensuite régulièrement, avec une nette accélération à partir de la dernière décade de mars où les oiseaux apparaissent alors en petits effectifs. Le groupe le plus important est noté le 27/03/03 à l'étang de Landes avec 10 individus (23-SauJ), et 12 étaient encore présents le 09/04/03 sur ce même site (23-VinS). À partir de la fin avril, les effectifs purement migrateurs décroissent sensiblement et laissent place aux nicheurs.

En période de reproduction, l'espèce est peu observée. Un couple parade le 30/05/04 au lac de Vassivière (23-SauJ), et un autre est présent le 07/06/04 à l'étang de Cieux (87-BouH). Trois preuves certaines sont relevées dont 2 provenant de Haute-Vienne :

- 3 jeunes le 30/06/03 à Ussel (19-DefP),
- 1 nid garni de 4 œufs le 03/07/04 à l'étang des Garennes (87-BouH),
- 4 jeunes le 20/07/04 à Boisseuil (87-MerC).

Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*)

● Deux données proviennent du passage automnal de 2002 :

- 3 ind. le 22/09/02 à l'étang de Lavaud (87-SotJ),
- 5 ind. le 18/10/02 au lac de Neuvic (19-CNN).

Pour le passage printanier, une seule observation est notée, celle d'un individu présent le 27/04/03 à l'étang de Cieux (87-BouP).

À l'automne 2003, l'espèce est observée pour la première fois le 01/09/03 à l'étang de Landes avec 5 oiseaux (23-DupE). Puis, 2 individus sont observés le 04/09/03 (23-BarJ) et un était encore présent sur le site le 06/09/03 (23-MerC).

Un oiseau est visible le 13/09/03 à l'étang de Murat (87-SotJ) et deux autres sont vus le 12/10/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP).



Raphaël Bussière

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)

● Un individu est signalé pour la première fois en Limousin le 27/04/03 à l'étang de Landes (23-DupE et PalG).

Pluvier doré (*Pluvialis apricaria*)

● Il est essentiellement observé durant les mois d'octobre et novembre pour la migration postnuptiale, et au cours des mois de février et mars pour le retour prénuptial. On peut le voir posé, souvent avec des bandes de Vanneaux huppés, dans des prairies humides à la recherche de nourriture ou en vol en migration active. La plupart des observations sont faites en Haute-Vienne et aucune n'est notée en Corrèze.

- 2 ind. en vol vers le Sud le 18/10/02 à Flavignac (87-PreP),
- 2 ind. le 10/11/02 à l'étang de Landes (23-BarJ),
- 20 ind. en vol avec des Vanneaux huppés le 27/11/02 à l'étang des Planchettes (87-EyrO),
- 1 ind. le 12/02/03 à l'étang de Chavaignac (87-BouP),
- 30 ind. en vol le 09/03/03 à Beynac (87-LabB),
- 8 ind. le 22/03/03 à l'étang de Landes (23-SauJ).

Un beau passage en plusieurs vagues est observé le 04/03/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP), avec d'abord des groupes de 15, 50 et 40 oiseaux à 11h00 puis des vols de 11, 12 et 31 individus à 13h20.

Pluvier argenté (*Pluvialis squatarola*)

● Toutes les observations sont faites à l'étang de Landes, et en période de migration automnale.

- 1 ind. le 28/10/02 (DubG),
- 17 ind. le 10/11/02 (BarJ),
- 3 ind. les 11/11/02 et 15/11/02 (SauJ).

Pas de donnée pour les années 2003 et 2004.

Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*)

● Un individu est présent dans un groupe de Vanneaux huppés le 18/01/04 à Glandon (87-TeuJ et al.). Il restera au moins une semaine sur le site, observé par plusieurs ornithologues heureux de voir cet oiseau bien rare dans notre région.

Vanneau huppé (*Vanellus vanellus*)

● Durant la période, de nombreux mouvements migratoires sont signalés de la mi-octobre à la fin mars. Sur les 520 données recueillies, 35 proviennent de Corrèze, 122 de Creuse et 363 de Haute-Vienne.

Les premiers mouvements migratoires postnuptiaux sont constatés au cours du mois d'octobre :

- 27 ind. le 20/10/02 à Flavignac (87-PreP),
- 38 ind. le 22/10/03 à Genouillac (23-Pral).

Le gros du passage migratoire automnal se déroule essentiellement en novembre et décembre, mais les groupes en vol n'excèdent pas les 150 oiseaux :

- 150 ind. le 11/11/02 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA),
- 147 ind. le 27/11/02 à Azat-le-Ris (87-EyrO),
- 67 ind. le 28/11/02 à Lussat (23-DubG).

Durant son hivernage, l'espèce côtoie principalement les berges et îlots des étendues d'eau, mais elle est aussi présente dans les champs. Les rassemblements d'oiseaux hivernants sont souvent importants :

- 600 ind. le 08/12/02 à l'étang de Landes (23-LpoA),
- 300 ind. le 21/12/03 à l'étang de Lavaud (87-SotJ),
- 350 ind. le 19/01/03 à Bussière-Galant (87-VirA).

Le 04/02/03 à Aix-sur-Vienne, un vol de 13 oiseaux en direction du Nord atteste de la première observation de passage migratoire printanier (87-PreP). Le passage est plus marqué en fin de mois de février et culmine en mars :

- 200 ind. le 25/02/04 à Saint-Sulpice-les-Feuilles (87-SotJ),
- 1 200 ind. le 05/03/04 et 2 655 ind. le 07/03/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 400 ind. le 06/03/04 à La Roche-l'Abeille (87-DumA),
- 1 000 ind. le 13/03/04 au Dorat (87-MorS).

En période de nidification, l'espèce se fait beaucoup plus rare. Pour la période considérée, seules trois données de nidifications certaines ont été rapportées :

- découverte d'un nid le 15/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP),
- 4 poussins duveteux le 04/05/04 à Azat-le-Ris (87-RayG),
- 1 jeune non volant accompagné d'un adulte le 25/05/04 à Peyrelevade (19-RogJ).

Des restes de vanneaux sont trouvés à la cathédrale de Limoges et aux alentours...le 08/01/03 (Pral), le 12/03/03 (Pral), le 30/10/03 (EyrO) et le 08/11/03 (Pral)...victimes probables du Faucon pèlerin.

Bécasseau maubèche (*Calidris canutus*)

- Une seule donnée avec 2 individus présents le 10/11/02 à l'étang de Landes (23-BarJ).

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

- À l'étang de Landes, un individu est observé pour la première fois le 10/11/02 (23-BarJ), puis est revu les 11/11/02 et 15/11/02 (23-SauJ). L'observation de l'année 2003 sera pour le département de Haute-Vienne, avec un individu noté le 14/09/03 à l'étang de Lavaud (87-SotJ).

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

- Cette espèce fait l'objet de quelques données mais uniquement en 2003.
 - 1 ind. le 25/07/03 à l'étang de Landes (23-VirA),
 - 1 ind. le 24/08/03 à l'étang de Landes (23-HubP),
 - 2 ind. le 01/09/03 à l'étang de Landes (23-DupE),
 - 1 ind. le 06/09/03 à l'étang de Landes (23-MerC et DesF),
 - 3 ind. le 14/09/03 à l'étang de Lavaud (87-SotJ).

Bécasseau de Temminck (*Calidris temminckii*)

- Une espèce peu souvent observée mais notée deux fois en 2003.
 - 1 ind. le 08/05/03 à l'étang de Landes (23-DesF),
 - 1 ind. le 03/11/03 sur la Glane à Saint-Junien (87-DouA).

Bécasseau variable (*Calidris alpina*)

- Durant la migration postnuptiale en 2002, la donnée la plus précoce nous vient de Liginiaç, où un oiseau est présent le 15/09/02 (19-CNN). En 2003, l'espèce est contactée le 23/08/03 de nouveau à l'étang de Landes (23-NedS). Mais d'autres sites accueillent l'espèce en période automnale :
 - 1 ind. le 13/09/03 à l'étang de Murat (87-SotJ),
 - 12 ind. le 14/09/03 à l'étang de Lavaud (87-SotJ),
 - 5 ind. le 18/10/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR).

Quant à l'étang de Landes, l'espèce est signalée au mois d'octobre avec 5 oiseaux le 28/10/02 (23-DubG) et de 7 oiseaux le 20/12/02 (23-HubP).

Trois données prénuptiales concernant des oiseaux en halte migratoire :

- 1 ind. le 04/04/03 à l'étang de Landes (23-VarC),
- 7 ind. le 27/04/03 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 7 ind. le 27/04/03 à l'étang du Mas du Puy (87-BouP).



Raphaël Bussiére

Combattant varié (*Philomachus pugnax*)

Les observations sont effectuées essentiellement sur le bassin de Gouzon en Creuse et dans le département de Haute-Vienne. Aucune donnée en Corrèze.

En 2002, l'espèce est signalée deux fois à l'étang de Landes avec un groupe de 6 oiseaux à chaque fois, les 02/11/02 (23-DesF) et 11/11/02 (23-PalG).

En 2003, la première observation de l'année concerne un individu le 09/03/03 à l'étang de Landes (23-PalG). Hormis le mois de juin, l'espèce est signalée au moins une fois tout les mois sur les communes de Lussat (23) et de Videix (87), avec un maximum de 28 individus le 22/03/03 à l'étang de Landes (23-DupE), et ce jusqu'en septembre, où elle est notée pour la dernière fois de l'année en migration postnuptiale le 14/09/03 à l'étang de Lavaud (87-SotJ).

Il faudra attendre l'année 2004 pour recontacter l'espèce. Un groupe de 5 oiseaux est présent le 04/04/04 à l'étang de Landes (23-VirA), puis un individu isolé est présent le 30/04/04 sur ce même site (23-DupE). Le 05/04/04, 7 individus sont observés à l'étang des Maisons (87-CavP).

Bécassine sourde (*Lymnocyptes minimus*)

● La plupart des observations sont faites en Haute-Vienne et réalisées durant la période hivernale. Cette espèce n'est pas signalée en 2002.

- 1 ind. le 02/02/03 au Grand étang d'Azat-Le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 15/02/03 à Bellac (87-DesF),
- 1 ind. le 29/11/03 à l'étang de Landes (23-DesF),
- 1 ind. le 31/12/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR),
- 1 ind. capturé et bagué le 17/01/04 à Ladignac-le-Long (87-TeuJ),
- 1 ind. le 23/01/04 à Bersac-sur-Rivalier (87-LabG),
- 1 ind. le 18/03/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK).

Bécassine des marais (*Gallinago gallinago*)

● Pour la période concernée, elle est notée tout les mois de l'année...sauf en juin.

- 4 ind. le 16/08/02 à l'étang de Murat (87-HubP),
- 1 ind. le 04/09/02 à la tourbière de la Ferrière, commune de Davignac (19-HenE),
- 23 ind. le 11/11/02 aux Combes de Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 12 ind. le 14/12/02 à l'étang de la Serrerie (87-DumA),
- 4 ind. le 02/02/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF),
- 1 ind. le 22/03/03 à Tarnac (19-MerC),
- 1 ind. le 02/10/03 à Meymac (19-DupE),
- 5 ind. le 27/01/04 à l'étang de la Pougé (87-HubP),
- 6 ind. le 05/04/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 4 ind. le 02/05/04 à Lussat (23-DupE),
- 1 ind. le 25/07/04 à l'étang de Landes (23-MerC).

Le plus important groupe noté compte 30 oiseaux, présents le 10/11/02 à l'étang de Landes (23-BarJ). Lors d'une opération nocturne de capture, un oiseau a été bagué le 17/01/04 à Ladignac-le-Long (87-TeuJ).

Bécasse des bois (*Scolopax rusticola*)

● L'oiseau est signalé toute l'année, avec cependant moins de données en période estivale. Les premières hivernantes sont notées le 21/10/02 à Saint-Vaury (23-LefP) et le 20/10/03 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-Desv). En période hivernale, quelques groupes d'oiseaux sont repérés ici et là :

- 5 ind. le 16/12/02 sur la commune des Cars (87-MerC),
- 3 ind. le 13/12/03 à Faux-la-Montagne (23-ChaS),
- 10 ind. le 19/12/03 et 8 ind. le 02/01/04 à Ambazac (87-MerC),
- 4 ind. le 09/01/04 à Saint-Laurent-les-Églises (87-MerC),
- 4 ind. le 15/01/04 à Saint-Sylvestre (87-MerC).

Des parades sont signalées en mars, comme par exemple, le 09/03/03 à Bussière-Boffy où un couple officie (87-DouA), et en avril, avec ce mâle « chanteur » le 09/04/04 à Saint-Fréjoux (19-DefP).

L'espèce est notée durant la période estivale, comme ces mâles qui se font entendre les 06/06/03 à Meymac (19-DouA) et 23/06/03 à Sornac (19-DefP).

On note des restes de Bécasse des bois le 07/12/03 à la cathédrale de Limoges (87-EyrO), victime pour une fois de l'un de ses prédateurs naturels, le Faucon pèlerin.

Barge à queue noire (*Limosa limosa*)

● Peu d'observations pour cette espèce peu représentative de notre région, et contactée exclusivement à l'étang de Landes (23) :

- 1 ind. le 30/03/03 (SauJ),
- 3 ind. les 13/04/03 (VarC) et 15/04/03 (PalG),
- 5 ind. le 14/08/03 (MerC),
- 2 ind. le 04/04/04 (VirA).



Raphaël Bussière

Barge rousse (*Limosa lapponica*)

● Une observation d'un individu vu à deux reprises dans une pâture les 17/09/02 et 21/09/02 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV).

Courlis corlieu (*Numenius phaeopus*)

● Comme souvent, cette espèce rare dans notre région est contactée à l'étang de Landes, avec l'observation d'un individu en vol au-dessus de l'eau le 12/04/04 (23-SauJ).

Courlis cendré (*Numenius arquata*)

● Il est vu régulièrement à l'étang de Landes (23) :

- 1 ind. le 04/11/02 (SauJ),
- 1 ind. le 09/11/02 (DubG),
- 3 ind. le 10/11/02 (BarJ),
- 9 ind. le 27/12/02 (VinS),
- 6 ind. le 23/02/03 (NorT),

- 2 ind. le 13/09/03 (DubG),
- 2 ind. le 23/11/03 (VarC),
- 1 ind. le 27/04/04 (DupE).

Mais, il est également observé en Haute-Vienne :

- 3 ind. le 18/08/02 aux Courrières d'Ambazac (87-LarR),
- 1 ind. le 02/11/02 et 1 autre de passage le 27/10/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. en vol le 22/02/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 1 ind. en vol le 23/03/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Pas de donnée existante en Corrèze.

Chevalier arlequin (*Tringa erythropus*)

• Une seule observation en 2002, où 2 individus sont vus à plusieurs reprises à l'étang de Landes, les 10/11/02 (23-BarJ) et 15/11/02 (23-SotJ).

En 2003 un individu est observé, toujours à l'étang de Landes, en migration prénuptiale les 19/04/03 (23-DesF), 21/04/03 (23-SauJ) et 27/04/03 (23-DupE). Pour la migration postnuptiale, l'espèce est notée à l'étang de Lavaud où 3 individus sont vus le 23/08/03 (87-BusR) et un autre oiseau présent le 14/09/03 sur ce même site (87-SotJ).

En 2004, deux données sont rapportées :

- 1 ind. le 04/04/04 à l'étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 05/04/04 à l'étang des maisons (87-CavP).

Chevalier gambette (*Tringa totanus*)

• L'espèce est plus souvent observée au passage printanier qu'au passage automnal. Les premières notes d'oiseaux en migration postnuptiale concernent l'observation d'un individu le 21/09/02 à l'étang de Murat (87-SotJ) et d'un oiseau présent le 23/08/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR). Après, il faut attendre la fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre pour observer l'espèce :

- 1 ind. le 20/10/02 à l'étang de Puycheny (87-SEPOL),
- 21 ind. en vol en direction du Sud le 18/10/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP),
- 7 ind. le 02/11/02 à l'étang de Landes (23-DesF).

L'observation la plus précoce du passage prénuptial est celle d'un groupe de 11 oiseaux le 20/03/04 à l'étang de Landes (23-DubG). À cette période, les effectifs des groupes sont plus importants avec notamment l'observation de 21 oiseaux le 09/04/03 à l'étang de Landes (23-VinS). Cependant, des contacts sont notés faisant objet d'un oiseau isolé, comme le 11/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP) et le 22/04/04 à Châlus (87-CouC).

Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*)

La donnée la plus précoce lors du passage postnuptial concerne 2 oiseaux le 01/09/02 à l'étang de Landes (23-SauJ) pour 2002 et 2 oiseaux le 15/08/03 à l'étang de Lavaud pour 2003 (87-BusR).

D'autres mentions de l'espèce sont répertoriées :

- 3 ind. le 14/09/02 à Liginiac (23-CNN),
- 1 ind. le 19/09/02 à l'étang de Murat (87-HubP),
- 1 ind. le 28/10/02 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 1 ind. le 29/08/03 à l'étang de Landes (23-DubP),

- 2 ind. le 11/09/03 au barrage de la Triouzoune (19-BarJ),
- 1 ind. le 02/11/03 à l'étang de Landes (23-VirA).

Il faudra attendre trois mois pour observer de nouveau l'espèce mais cette fois-ci lors de sa remontée printanière :

- 1 ind. le 01/02/03 à l'étang de Murat (87-SotJ),
- 12 ind. le 30/03/03 à l'étang de Landes (23-SauJ),
- 24 ind. le 21/04/03 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 14/05/03 à l'étang du Mas Féty (87-BarJ),
- 2 ind. le 05/04/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 21 ind. le 17/04/04 à l'étang de Landes (23-SauJ).

Une donnée est répertoriée fin juillet, celle d'un groupe de 30 oiseaux s'envolant de l'étang de Landes, puis revu quelques minutes plus tard à l'étang de la Bastide (23-VirA).



Etienne Dupoux

Chevalier culblanc (*Tringa ochropus*)

Les premiers mouvements migratoires postnuptiaux ont, semble-t-il, lieu plus tardivement que les dates habituelles de l'espèce, comprises entre juin et août. On recense ainsi 2 individus le 16/08/02 à l'étang de Murat (87-HubP), 6 autres le 24/07/03 à l'étang de Landes (23-VirA), et 2 derniers le 20/06/04 à Saint-Viance (19-GauR).

Les données s'étalent ensuite jusqu'au mois de décembre, et l'on peut noter :

- 4 ind. le 25/09/02 à Liginiac (19-CNN),
- 2 ind. le 26/10/02 à l'étang de la Toueille (23-SotJ),
- 4 ind. le 10/11/02 à la Sablière de Gouzou (23-BarJ),
- 2 ind. le 23/09/03 à l'étang Maison Neuve (87-CouC),
- 1 ind. le 14/10/03 à Liginiac (19-BarJ),

- 3 ind. le 10/11/03 à l'étang Neuf (23-BarJ),
- 1 ind. le 10/12/03 au lac de Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 3 ind. le 25/07/04 à Saint-Martin-de-Terressus (87-EyrO),
- 2 ind. le 11/08/04 à la station d'épuration de Segonzac (19-GauR).

Le retour depuis les quartiers d'hivernages a classiquement lieu entre mars et mai :

- 1 ind. le 13/03/03 à Saint-Goussaud (23-Pral),
- 1 ind. le 03/05/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP).
- 1 ind. le 28/03/04 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR),
- 2 ind. le 15/04/04 à Flavignac (87-PreP).

Des observations précoces en janvier indiquent probablement des hivernants : d'abord 2 individus sont notés le 05/01/03 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-HubP), puis enfin un autre qui l'est le 05/01/04 au lac de Neuvic (19-BarJ).

Avec un peu de chance, il est possible d'apercevoir des groupes d'effectifs plus importants. Et le plus exceptionnel compte 18 oiseaux en migration prénuptiale, le 05/04/03 à l'étang de Landes (23-SotJ), tandis que 8 individus sont vus le 23/08/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR), puis 6 autres le 21/12/02 à l'étang de Landes (23-SauJ), en période hivernale.

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

● L'espèce est notée en Creuse et en Haute-Vienne lors des passages migratoires, mais aucune donnée n'est répertoriée provenant de Corrèze. En 2002, une seule observation est effectuée, celle de 2 individus le 16/08/02 à l'étang de Murat (87-HubP). Cette observation n'est pas la plus précoce, car le premier contact en 2003 est celui de 2 oiseaux présents le 14/07 à l'étang de Landes (23-SauJ). Cette année là, quatre sites ont accueilli l'espèce :

- 1 ind. le 02/08/03 à l'étang de la Chateline (87-BarJ),
- 3 ind. le 02/08/03 à l'étang de Murat (87-SotJ),
- 2 ind. le 14/08/03 à l'étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 31/08/03 à l'étang de la Ramade (23-VarC).

En migration prénuptiale, les tous premiers contacts se font dans les premiers jours du mois d'avril, et la dernière mention de l'espèce est notée le 07/05/03 à l'étang de Landes avec un oiseau (23-SauJ).

- 1 ind. le 05/04/03 à l'étang de Landes (23-SotJ),
- 5 ind. le 19/04/03 (DesF) et 2 ind. le 03/05/03 (DupE) à l'étang de Landes,
- 2 ind. le 22/04/03 et 1 ind. le 01/05/03 à l'étang du Mas du Puy (87-BouP),
- 2 ind. le 05/04/04 à l'étang des Maisons (87-CavP), seule mention printanière de 2004.

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*)

En 2002, l'espèce est notée en août et septembre, majoritairement en Haute-Vienne. Le premier contact concerne un groupe de 6 oiseaux le 16/08 à l'étang de Murat (87-HubP). Quant à la dernière observation, elle nous vient de Creuse avec un oiseau le 30/09/02 au lac de Vassivière (23-VirA).

Au printemps 2003, la première note concerne un individu présent le 21/03/03 au Pont Gartempe à Bussière-Poitevine (87-CavP). D'autres données où de petits groupes sont repérés :

- 4 ind. le 18/05/03 à Saint-Exupéry (19-DefP),
- 3 ind. le 03/06/03 à l'étang de Landes (23-NauD).

La dernière observation pour cette année est de 2 individus le 28/11/2003 à l'étang de Landes (23-DubG). En 2004, un oiseau est d'abord noté le 29/01/04 à l'étang de Cieux (87-SotJ), puis 2 individus le sont le 25/04/04 à Puy-Grolier d'Uzerche (19-CreD). Beaucoup d'observations au cours de ce printemps, notamment en avril et mai, et ce sur les trois départements. On note 16 individus le 06/05/04 à l'étang de Lavaud (87-RoyA) et 15 individus le 24/07/04 à l'étang de Cieux (87-EyrO). La dernière observation de la période sera le 15/08/04 sur les berges de la Glane à Saint-Junien (87-EyrO).



Etienne Dupoux

STERCORARIIDÉS

Labbe à longue queue (*Stercorarius longicaudus*)

● L'année 2002 fournit 3 observations de l'espèce. Un juvénile est trouvé blessé le 29/08/02 à Mourieux-Vieilleville (23-CenS). Puis, un autre juvénile est observé pour la première fois le 03/09/02 au lac du Causse (19-LabB), et sera re-contacté le 07/09/02 sur le même site (19-FauB).

LARIDÉS

Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*)

- Trois observations pour cette espèce, rare en Limousin :
- 1 ind. le 17/04/04 à l'étang de Landes (23-SauJ),
 - 1 ind. le 19/07/04 à l'étang de Cieux (87-LasM),
 - 13 ind. (7 imm. et 6 adt.) le 27/04/04 à l'étang de Landes (23-DupE).

Mouette pygmée (*Larus minutus*)

● L'espèce est régulière dans la région lors des migrations. 9 citations de l'espèce sur la période étudiée dont 8 provenant de l'étang de Landes. Parmi celles-ci, 7 sont en période pré-nuptiale :

- 4 ind. le 19/04/03, puis 5 ind. le 21/04/03 (23-DesF et al.),
- 23 ind. le 23/04/03 (23-DesF),
- 12 ind. le 17/04/04 (23-SauJ),
- 10 ind. le 21/04/04 (23-DupE),
- 11 ind. le 24/04/04 (23-ChaG),

Une seule est en période postnuptiale, et concerne 2 individus le 04/09/03 (23-BarJ).

La neuvième citation concerne un 1 oiseau de 2^{ème} année observé à l'étang de Cieux (87-BouP).

Mouette rieuse (*Larus ridibundus*)

● L'espèce est observée tout au long de l'année. 59 % des données proviennent des étangs du Bassin de Gouzon.

Ainsi, des individus sont notés en migration postnuptiale en Creuse et en Haute-Vienne :

- 3 ind. le 18/10/02 à Limoges (87-VirA),
- 2 ind. le 24/10/02 à Sainte-Feyre (23-RobS),
- 30 ind. le 28/10/02 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 2 ind. le 15/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Quelques rassemblements hivernaux sont relevés, mais de faible importance :

- 30 ind. le 09/01/03 sur les bords de Vienne à Limoges (87-MerC),
- 20 ind. le 08/12/02 à l'étang de Landes (23-LpoA),
- 18 ind. le 18/01/04 à l'étang de Lavaud (87-SotJ).

Les groupes les plus importants sont mentionnés lors de l'arrivée des beaux jours (et surtout des migrateurs !). On recense alors 12 observations de groupes d'effectifs supérieurs ou égaux à 200, toutes réalisées sur l'étang de Landes : 230 ind. le 27/03/03 (23-SauJ), 264 ind. le 20/04/03 (23-DubG), 200 ind. le 24/04/04 (23-ChaG).

Également, quelques données d'individus en migration prénuptiale active sont rapportées :

- à Oradour-Saint-Genest, avec 2 ind. le 22/02/03, 7 le 13/03/03, 29 le 14/03/03, 7 le 17/03/03 et 4 le 18/03/03 (87-CavP),
- à Limoges, avec 6 ind. le 18/03/03 (87-EyrO).

Une seule donnée de nidification certaine est relevée au cours de la période de reproduction, celle d'un nid découvert le 02/05/04 à l'étang de Landes (23-DupE et PalG). Sur ce même site, en 2003, un transport de matériaux avait été observé le 21/04/03 (23-DumA).

Goéland cendré (*Larus canus*)

● Quelques données pour ce migrateur régulier en Limousin, mais qui se fait plutôt rare :

- 1 imm. le 09/12/02 au Lac de Vassivière (23-DesF),
- 1 imm. le 13/02/03 à l'étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 02/04/03 et le 04/04/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- 1 ind. le 05/04/03 et le 09/04/03 à l'étang de Landes (23-SotJ et al.),
- 1 ind. le 05/01/04 au lac de Neuvic (19-BarJ).

Goéland brun (*Larus fuscus*)

● Les deux et uniques observations correspondent, à priori, à des comportements migratoires :

- 3 ind. le 05/04/03 à l'étang de Landes (23-SotJ),
- 4 ind. le 04/04/04 au lac de Neuvic (19-BarJ).

Goéland argenté (*Larus argentatus*)

● Cette espèce étant inféodée au domaine littora, elle est d'ordinaire peu courante en Limousin et il est donc intéressant de noter que la période considérée a été relativement riche en observations :

- 4 ind. le 16/08/02 à l'étang de Murat (87-HubP),
- 4 ind. le 08/09/02 à Guéret (23-RobS),
- 1 ind. le 10/07/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-VirA),
- 1 ind. le 29/07/03 à Videix (87-EyrO),
- 1 ind. le 18/01/04 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 08/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ),
- 1 ind. posé sur un poteau EDF le 06/07/04 à Bussière-Poitevine (87-CavP).

Goéland leucophée (*Larus michahellis*)

● Le groupe observé le plus important comprend 39 individus, le 02/11/03 à l'étang de Landes (23-DubG). L'espèce est notée sur toutes les grandes étendues d'eau de la région et à toutes périodes de l'année :

- 1 ind. le 12/01/03 au lac de Vassivière (23-BouP),
- 2 ind. stationnent du 08/03/03 au 07/04/03 sur le lac de Neuvic (19-BarJ),
- 2 ind. (adt. et imm.) le 07/05/03 sur les bords de Vienne à Limoges (87-VirA),
- 1 adt. le 24/10/03 au lac du Chammet (19-SauJ),
- 5 ind. les 08 et 09/12/03 au lac de Vassivière (23-MerC et DesF).

Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*)

● Cette espèce côtière est rare en Limousin, et son observation dans la région survient généralement après des événements particuliers tels que des tempêtes, des marées noires... Par conséquent, les citations concernent généralement des oiseaux affaiblis et récupérés par les observateurs. Ceci se confirme une fois de plus au cours de la période considérée :

- 1 ind. mazouté récupéré le 03/02/03 à Vars-sur-Roseix, puis relâché le 03/03/03 (19-CenS),
- 1 ind. mazouté récupéré le 12/02/03 à Bussière-Galant (87-CNG).



Mouette tridactyle / Raphaël Bussière

STERNIDÉS

Sterne caugek (*Sterna sandvicensis*)

De nature très maritime, cette espèce ne fut observée qu'à une seule occasion dans la région : 4 ind. le 30/05/04 à Faux-la-Montagne (23-SauJ).

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

En 2003, la migration prénuptiale amène 1 individu le 27/03/03 à l'étang de Landes (23-MerC et al.), puis un autre le 15/04/03 sur le même site (PalG).

L'année suivante, 5 individus sont observés le 21/04/04 aux abords de l'étang de Landes (23-DupE), puis 2 autres deux mois plus tard, le 26/06/04 (23-MerC). Ensuite, une série d'observations a lieu dans la première moitié du mois de juillet, concernant probablement des oiseaux issus de la dispersion postnuptiale :

- 2 ind. le 04/07/04 à l'étang de Landes (23-MerC),
- 1 ind. le 11/07/04 à l'étang de la Chaume (87-MerC),
- 2 ind. le 11/07/04 à l'étang de Landes (23-DubG),
- 1 ind. le 17/07/04 à l'étang de Landes (23-DesF).

Comme les années précédentes, aucun oiseau n'est aperçu en Limousin lors de la migration postnuptiale.

Sterne naine (*Sterna albifrons*)

● Cette espèce, accidentelle en Limousin, fait l'objet d'une seule observation, celle de 2 individus observés le 18/05/03 à Lussat (23-BarJ).

Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*)

● La migration prénuptiale débute le 30/03/03 avec 1 individu observé à l'étang de Landes (23-SauJ). Elle culmine le 18/05/03 avec 20 individus sur le même site (23-BarJ), puis se termine le 10/06/03 avec 4 individus observés, toujours à Lussat (23-SotJ). Outre les observations provenant des étangs creusois, d'autres sont signalées en Haute-Vienne :

- 2 ind. le 14/04/03 à Videix (87-BusR),
- 1 ind. le 18/04/03 à Saint-Auvent (87-SchB),
- 1 ind. le 24/04/03 à Oradour-sur-Glane (87-BouP),
- 2 ind. le 17/05/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-GenG).

Au total, 70 individus sont contactés au cours de cette période.

Quelques données concernent des oiseaux observés lors de la dispersion des jeunes après la période de reproduction :

- 1 ind. le 25/07/03 à l'étang de Landes (23-VirA),
- 1 ind. le 26/07/03 à l'étang de Tête de Bœuf (23-VirA).

Lors de la migration postnuptiale, un individu est observé le 06/09/03 à l'étang de Landes et un autre le 13/09/03 sur le même site (23-DubG).

En 2004, toutes les données sont réalisées à l'étang de Landes, hormis 1 oiseau observé le 23/04/04 à Flavignac (87-PreP), et l'observation de 22 individus le 15/05/04 sur l'étang de Chabannes (19-LabD), soit l'effectif maximal noté en période de migration. Les 3 premiers oiseaux de ce mouvement prénuptial sont, quant à eux, notés le 21/04/04 (23-DupE). Ils seront suivis notamment par un groupe de 15 individus le 03/05/04 (23-DupE), tandis qu'une observation datée du 26/06/04 (23-MerC) pourrait être considérée comme la dernière concernant des oiseaux migrateurs, si 5 guifettes à la traîne n'étaient passées en migration active le 04/07/04 à Lussat (23-MerC). Ce sont 80 individus en tout qui ont été aperçus au cours de ce passage.

Il n'existe qu'une seule donnée d'oiseaux en chemin vers leurs quartiers d'hiver : 4 ind. contactés le 07/08/04 à l'étang de Landes (23-DubG).

Guifette noire (*Chlidonia niger*)

Quelques migrateurs postnuptiaux sont observés en septembre 2002 à Lussat : 1 ind. le 01/09 (SauJ), puis 2 ind. le 19/09 (HubP).


En 2003, la saison de migration s'ouvre avec l'observation de 4 individus le 14/04 à l'étang de Lavaud (87-BusR). Elle ne se terminera que le 22/06/03 avec 6 individus au lac de Saint-Pardoux (87-TeuJ). Entre-temps, de nombreux individus isolés ou en groupes font leur apparition à l'étang de Landes, et les plus importants groupes comprennent 20 ind. le 15/04 (23-PalG), 53 ind. le 08/05 (23-VinS), puis 20 ind. le 18/05 (23-BarJ). D'autres Guifettes noires seront encore aperçues ici et là dans la région, comme celle observée le 27/04 lors d'un passage EPS sur un secteur corrézien (FauB), mais aussi une autre présente le 28/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ), puis 3 autres le 05/05 sur la même commune (87-CelJ), ou encore ces 2 individus présents le 24/05 à l'étang de la Toueille (23-SotJ). 147 oiseaux différents sont comptabilisés lors de ce passage prénuptial.

En juillet de la même année, une Guifette noire est observée le 06/07 à Lussat (23-DubG), suivie de 5 autres oiseaux le 19/07 à Marcillac-le-Croisille (87-SchO), puis de 2 individus le 24/07 à l'étang de Landes (23-VirA). Cependant, c'est en septembre que sont notés les migrateurs postnuptiaux avec 3 individus le 01/09 à Lussat (23-DupE), puis 5 oiseaux le 05/09 sur la même commune (23-BarJ), et enfin un dernier observé le 27/09 à l'étang de la Ramade (23-VarC).

Le passage prénuptial de 2004 est moins prolifique en observations de Guifettes noires. Il débute plus tard que l'année précédente avec 3 individus observés le 24/04 à l'étang de Landes (23-DupE), pour se terminer plus tôt avec 14 individus le 25/05 sur le même site (23-BusP). Cette dernière mention fait état du groupe le plus important observé à cette période. La seule observation, ne provenant pas de Lussat, dénombre 2 individus le 29/04 à l'étang de la Chaume (87-MerC). Au total, seulement 35 individus sont contactés avant la période reproduction.

En outre, un individu sera observé le 25/07/04 à Lussat (23-MerC).

Présence décadaire : nombre de citations



Pigeon biset (*Columba livia*)

Les données disponibles dans la centrale sont relatives à des points d'écoute STOC-EPS. Aucune observation particulière n'est à relater pour cette espèce pour laquelle davantage de données seraient nécessaires afin de mieux apprécier sa présence en Limousin, à la fois quantitativement et spatialement.

Pigeon colombin (*Columba oenas*)

Lors de la migration postnuptiale, 101 colombins sont comptés entre le 30/09/02 et 03/11/02, dont 9 individus le 20/10/02 à Château-Chervix (87-CouR), puis 308 autres entre le 30/09/03 et le 06/11/03 dont 29 individus le 12/10/03 à Moissanes (87-BarJ).

L'hivernage est constaté à deux reprises avec 36 oiseaux le 17/12/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) et 5 oiseaux le 14/02/04 à Saint-Pardoux (87-SotJ).

La migration prénuptiale débute le 01/03/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP) où 8 individus sont vus en vol, et le 06/03/04 ce sont 12 oiseaux qui migrent à La Roche-l'Abeille (87-DumA). Beaucoup moins importante, la migration prénuptiale totalise 21 individus en 2003 et 20 en 2004. Aucune donnée concernant des migrateurs actifs n'est mentionnée au delà du 15 mars.

Une seule citation correspond à un mâle chanteur, le 23/06/03 à Sornac (19-DefP). Quelques colombins sont également observés durant la période de reproduction :

- 3 ind. le 26/03/04 à Moissannes (87-BarJ),
- 3 ind. le 03/04/04 à Azat-le-Ris (87-CavP),
- 1 ind. le 05/05/04 à Roche-le-Peyroux (19-BarJ).

Pigeon ramier (*Columba palumbus*)

Migrations postnuptiales :

Les ornithologues se mobilisent toujours autant pour suivre les « vols bleus » des palombes. La période de migration s'étale approximativement sur un mois et demi pour les deux saisons avec cependant une plus forte intensité les trois semaines comprises entre le 08/10 et le 01/11. Dans cette période, deux pics migratoires espacés de 8 jours en 2002 et de 5 jours en 2003 ont été notés.

Les observateurs ont été comblés lors du comptage simultané du 20/10/02, ce qui a permis d'étudier précisément ce pic migratoire et de le comparer avec les autres sites suivis dans le Massif Central et dans les Pyrénées.



Raphaël Bussière

● **Migration postnuptiale 2002 :**

Le premier groupe de 60 migrateurs est observé le 29/09 à Lastours (87-LabB), mais le passage commence véritablement le 08/10 : 36 300 pigeons passent à Gentioux-Pigerolles dans la journée (23-AlbD), et 2 170 à Lastours (87-LabB). Le premier rush a lieu les 19 et 20/10 avec respectivement 80 000 et 410 000 comptés sur les différents sites suivis du Limousin (sans double compte).

Le comptage simultané du 20/10 a permis d'affiner les limites des couloirs migratoires et de caractériser la phénologie de la migration sur les 18 sites suivis par 31 observateurs. Les sites de Flavignac et de Moissannes comptabilisent les effectifs les plus importants, avec 127 548 (87-PreP et al.) et 98 500 (87-BarJ) en 10 heures d'observations. L'intensité du passage est au maximum entre 8h et 8h30 et 71% des vols sont inférieurs ou égaux à 200 individus. Seulement 4% sont supérieurs à 4 000 oiseaux. Pendant cette journée, la migration est la plus dense dans le «couloir central», en gros entre Nieul à l'ouest (87) et les Monédières à l'Est (19) soit 67 km de largeur.

Les mauvaises conditions météorologiques freinent le passage la semaine suivante puis il reprend le 28/10 avec 98 828 pigeons dont 84 000 pigeons à Lastours (87-LabB) entre 6h30 et 11h et 12 500 au Puy de l'Aiguille à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). En novembre, les migrateurs sont plus rares avec toutefois 1 454 oiseaux le 03/11 à Flavignac (87-PreP). Les deux derniers vols (150+100) en migration active vers le Sud-ouest sont vus le 12/11 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayS). Pour l'ensemble de la saison, environ 600 000 pigeons ont été comptés (sans double compte), un chiffre inférieur à la réalité puisque le Limousin n'a pas été surveillé dans toute sa largeur, ni tous les jours.

● **Migration postnuptiale 2003 :**

Elle commence le 14/09 avec deux pigeons en migration active vers le Sud-ouest, très tôt le matin à Ayen (19-FauB). Le premier vol, un peu plus important (seulement 25 oiseaux), est noté le 04/10 à Videix (87-LabB) puis à Saint-Brice avec 200 oiseaux le 06/10 (87-LabB) mais les pigeons se font rares dans la première décade d'octobre.

Le 12/10, plus de 13 000 sont comptés en Limousin. La migration devient plus active les jours suivants puis un premier pic est relevé le 19/10 : 195 000 pigeons sont observés sur les 17 sites suivis. Les effectifs les plus nombreux sont ceux relevés à Flavignac avec 38 410 pigeons (87-PreP et al.), à Gentioux-Pigerolles avec 30 080 (23-AlbD), à Château-Chervix avec 21 247 (87-CouR), à Moissannes avec 19 410 (87-BarJ) et à Saint-Gilles-les-Forêts avec 17 115 individus (87-MorS). Le lendemain est aussi une journée de fort passage mais seulement un observateur était sur le terrain : il note à La Roche-l'Abeille 38 598 pigeons entre 8h20 et 11h20 (87-DumA).

Une nouvelle vague importante affecte toute la largeur du Limousin le 25/10, 88 000 oiseaux sont dénombrés sur 4 sites dont 57 000 à Saint-Setiers (23-AlbD), 16 608 à Flavignac (87-PreP) et 12 685 à Chéronnac (87-LabB). Du 27/10 à début novembre, très peu de données ont été enregistrées. La migration reprend le 04/11 et se maintient jusqu'au 08/11, plus de 28 000 ramiers sont notés durant ces 5 jours dont 10 993 à Videix le 08/11 (87-BusR). Les derniers migrateurs sont repérés à Saint-Vaury (23-AlbD), aux Combes (87-DouA) et à Flavignac (87-PreP) le 11/11. Au total, 580 000 pigeons ont été observés en migration active sur la saison.

● ***Hivernages :***

La période d'hivernage a été fixée entre le 15/11 et le 31/01. Cependant, pour plus de clarté, nous avons débordé sur les mois de février et mars pour 2004 afin de mieux décrire un phénomène exceptionnel jusque là jamais observé en Limousin.

Pendant la période d'hivernage proprement dite, des mouvements migratoires peuvent être observés dans une direction ou une autre (voir le 09/12/03), les oiseaux changent de zone d'alimentation ou se rendent à leurs dortoirs parfois situés à plus de 10 km des zones de gagnage (observations dans le nord de la Haute-Vienne en 2003/2004). Le Sud de la région (bassin de Brive) et les hauteurs de la montagne limousine n'apparaissent pas comme des zones d'hivernage d'importances significatives.

● ***Hivernage 2002/2003 :***

Très peu d'observations ont été centralisées. Le plus important dortoir est de 550 oiseaux le 28/01/03 à Meilhac (87-LabB), et 400 individus y sont toujours le 08/02/03.

Le 16/11/02, 200 pigeons sont observés à Coussac-Bonneval (87-DumA). Le 17/11/02, 11 vols compris entre 35 et 140 oiseaux rejoignent leurs dortoirs en fin d'après midi à Aix-sur-Vienne (87-LabB). Le 24/11/02, 200 pigeons se posent à Flavignac (87-PreP).

● ***Hivernage 2003/2004 :***

Cette saison a été exceptionnelle, les effectifs de ramiers hivernants ont dépassé largement ceux enregistrés les années et même les décennies précédentes. Rappelons que nous avons connu durant l'été 2003 une très forte canicule, mais aussi une glandée très abondante dès le début de l'automne. On peut se demander s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre tous ces phénomènes...


● ***L'installation des pigeons hivernants :***

Les premiers groupes en stationnement dans la région sont repérés fin novembre, mais ils disparaissent assez vite, continuant leur migration vers le Sud-ouest. Quelques

gros dortoirs sont signalés la première semaine de décembre : 1 000 ind. dans la forêt de Rochechouart le 07/12/03 et 3 000 ind. le même jour dans le secteur de Saint-Bazile (87-LabB). Le 09/12/03, des déplacements importants vers le Nord sont notés sur un front assez large de Séreilhac à Babaudus (à l'ouest de Rochechouart), 12 600 pigeons ramiers au total pour 115 vols entre 8h15 et 9h45 (87-LabB). Ces oiseaux ont quitté des dortoirs situés entre Dournazac et Saint-Mathieu, et seuls moins de 2 000 oiseaux y sont retournés dans la soirée. Ces oiseaux sont sans doute partis rechercher des zones d'alimentation plus favorables.

● **Les hivernants se concentrent dans la Basse-Marche :**

Aux mois de décembre, janvier et février des comptages réguliers ont été réalisés depuis la butte de Frochet, commune de Bussière-Boffy (87). Le maximum d'individus est noté dans la troisième décade de décembre : de 20 000 à 30 000 oiseaux sont vus en fin d'après-midi depuis la butte de Frochet alors qu'ils rejoignent leurs dortoirs le 22/12/03 (87-LabB). Les comptages ont été réalisés entre 15h30 et la tombée de la nuit (AlbD, EyrO, LabB). Les vols susceptibles d'avoir été comptés deux fois ont été exclus.



Les comptages réalisés en voiture sur plusieurs parcours le 22/12/03, le 10/01/04 et le 07/02/04 ont montré que la population hivernante était bien supérieure aux effectifs vus depuis la butte de Frochet. Deux dortoirs de 15 000 à 20 000 oiseaux sont repérés sur les communes de Blond et de Saint-Georges-les-Landes (87-LabB). Des prospections en voiture ont permis par exemple de recenser entre 35 000 et 45 000 pigeons dans un carré de 10 km de côté entre Mézières-sur-Issoire et Bellac le 22/12/03 (87-LabB). Les dortoirs supérieurs au millier sont nombreux (Bussière-Poitevine, Bussière-Boffy, Gajoubert, Mézières-sur-Issoire, Lathus-Saint-Rémy, Saint-Barbant, Saint-Christophe en Charente, vallée de l'Isop, vallée de la Gartempe, Thouron...). Ils sont souvent dans des réserves de chasse. Les oiseaux se concentrent dans le bocage avec de vieilles haies de chênes et des prairies rases pâturées par des ovins. Ils se nourrissent sous les chênes et "pâturent" parfois en rangs serrés au milieu des prairies. Les dortoirs sont dans des

bois, pas forcément très grands et dans les haies. Les prospections ont permis de faire des observations spectaculaires : par exemple le 10/01/04 en fin d'après-midi à l'ouest de Bellac, un vol en forme « d'écharpe » ondule à faible hauteur au-dessus des arbres, il semble ininterrompu et totalise peut-être 20 000 pigeons ! (87-LabB, Pral, ThoF).

Nous pouvons tenter une estimation de l'effectif hivernant (sûrement en dessous de la réalité) pour le Nord de la Haute-Vienne et le Nord-est de la Charente, sûrement entre 60 000 et 80 000 pigeons ramiers. La zone d'hivernage déborde largement dans le Sud de la Haute-Vienne, en particulier à l'Ouest et dans le nord de la Creuse, l'Indre, la Vienne, mais les prospections y ont été insuffisantes. Voici les plus importants dortoirs signalés en dehors de la zone de concentration proprement dite de la Basse-Marche : 4000 ind. à Sauviat-sur-Vige le 01/02/04 (87-BarJ), 3 400 ind. à l'étang de Lavaud le 18/01/04 (87-BusR), 1 000 ind. à Saint-Mathieu le 18/01/04 (87-DouA), 1 000 ind. à Bussière-Galant le 18/01/04 (87-CouC)...

Des groupes de pigeons sont signalés dans le reste de la région, y compris sur la plateau de Millevaches mais ils sont très petit nombre, 60 ind. à Meymac le 30/12/03 (19-AlbD). Le Sud de la Corrèze ne fournit quasiment pas de données, 100 ind. le 07/12/03 à Chasteaux (19-GauR) et 65 ind. à Louignac le 10/01/04 (19-CreD).

● **Les premiers départs des pigeons :**

Le gros de la population hivernante semble être parti les premiers jours de février. De nombreux observateurs en Haute-Vienne signalent d'ailleurs des vols migratoires vers le Nord-est début février : 3 vols à Feytiat le 05/02/04 (87-MarR), 9 vols à Aixe-sur-Vienne le 06/02/04 (87-PreP), 500 ind. le 08/02 à Juillac (19-TulP)... Plus de 15 000 pigeons sont contactés dans le Nord de la Haute-Vienne (aucune observation dans le Nord-est de la Charente) lors du comptage simultané du 07/02/04. Ce même jour, 1 500 oiseaux se rendent à un dortoir aux alentours de la butte de Frochet (87-DouA).

● **Une nouvelle vague en février et mars :**

En février et pendant le mois de mars, la migration se poursuit et de nombreux vols choisissent de stationner quelques jours (ou semaines ?) dans la région. Le Nord de la Haute-Vienne n'est plus le seul secteur avec de gros dortoirs. Les pigeons s'installent alors un peu partout (au moins en Haute-Vienne et en Creuse) avec des concentrations importantes : 2 300 ind. à Oradour-Saint-Genest le 14/02/04 (87-CavP), 6 000 ind. dans un dortoir à Saint-Auvent (87-LabB), 7 000 ind. à Saint-Jean-Ligoure (87-CouR), 3 500 ind. à Tercillat (23-NauP), plus de 1 000 ind. à Saint-Bonnet-Briance (87-LabG), 3 000 ind. à Mourioux-Vieilleville (23-SotJ), 1 000 ind. le 17/02/04 à Peyrilhac (87-BouP), 1 500 ind. le 20/02/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), 5 000 ind. le 22/02/04 à Saint-Étienne-de-Fursac (23-VinS), etc.

● **Les derniers dortoirs :**

Jusqu'à fin mars, des groupes fréquentent des dortoirs. Il peut s'agir de dortoirs qui ont existé tout l'hiver et de nouveaux formés lors de haltes migratoires. À priori, les derniers dortoirs importants sont signalés à Tercillat avec environ 1 500 oiseaux le 20/03/04 (23-NauP), et le 27/03/04 à Saint-Auvent avec 1 500 oiseaux environ (87-LabB). Ils ne sont plus observés après cette date.

● **Migrations prénuptiales :**

La période de migration est très longue, de début février (voir fin janvier) à début avril pour les dates extrêmes. On ne note que de petits vols en migration active, bien souvent inférieurs à 100 oiseaux. Il est difficile d'identifier des pics migratoires, sans doute dans les 5 jours de part et d'autre du 10 mars pour les deux années.

● **Migration prénuptiale 2003 :**

Le premier vol de 400 oiseaux est observé le 08/02 à Meilhac (87-LabB) et le dernier le 09/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ).

Le passage est plus régulier le 09/02 : 1 098 pigeons en 12 vols sont notés entre 9h30 et 10h30 à La Roche-l'Abeille (87-DumA) et 1 037 ind. en 15 vols à Flavignac entre 10h et 11h (87-PreP). Peu de données nous sont parvenues après la mi-février, seulement 2 vols le 13/02 à l'étang de Landes (23-VirA) et 250 ind. le 20/02 à Brignac-la-Plaine (19-LabD). Notons aussi 5 vols entre 15h45 et 17h le 23/02 à Chaillac-sur-Vienne et 8 vols le lendemain de 8h30 à 10h30, soit 339 individus au total (87-BusR).

Cette migration de faible intensité est également observée sur le plateau de Millevaches le 05/03 avec 173 pigeons en 6 vols (19-AlbD) et dans le Sud de la Corrèze le 08/03 où 645 ind. en 11 vols sont notés (CreD). Le comptage simultané organisé le 09/03 a donné des résultats intéressants (*Cf tableau*).

Sites	Observateurs	Heures	Effectifs
Allasac (19)	CreD	9h00 à 16h30	645
Yssandon (19)	FauB	8h30 à 12h30	12 131
Bussière-Boffy (87)	DouA	9h00 à 11h00	26
Bussière-Galant (87)	DumA	8h30 à 11h30	3 820
Flavignac	PreP	8h45 à 17h30	4 170
Saint-Gilles-les-Forêts (87)	MorS	9h00 à 13h30	5 131
Saint-Sylvestre (87)	LanJ	9h00 à 9h30	810

La migration se poursuit les deux dernières décades de mars avec 133 individus en 8 vols entre 8h30 et 10h à Saint-Yrieix (87-CelJ) et 270 à Moissannes le 15/03 (87-BarJ). Le dernier vol comptant 62 oiseaux en Mars est observé le 30/03 à Mansac (19-GauR).

● **Migration prénuptiale 2004 :**

Le descriptif de l'hivernage 2003/2004 (ci-dessus) présente quelques tendances. Voici un peu plus de détails.

Les premiers jours de février fournissent les premières données de vols en migration active vers le Nord-est : 500 ind. en 3 vols le 05/02 à Feytiat (87-MarR) et 525 ind. à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Dans la journée du 08/02, des observations ponctuelles réalisées à Aix-sur-Vienne totalisent 970 individus en 9 vols (87-PreP). Courant février, de nombreux dortoirs (supérieurs au millier) sont repérés en Limousin, mais très peu d'observations de groupes en migration active nous sont parvenues. Ces nouveaux dortoirs témoignent cependant d'une arrivée massive de pigeons pendant la période.

Début mars des totaux plus importants sont obtenus sur le plateau de Millevaches : 1 400 ind. le 03/03, 1 740 ind. le 04/03, 1 090 ind. le 15/03 (23-AlbD). 853 individus sont

vus le 17/03 à Flavignac (87-PreP) et 100 ind. le 18/03 dans les Monédières (19-RogJ). Les oiseaux en halte migratoire constituent encore des dortoirs importants fin mars, et les derniers petits groupes sont notés le 03/04 à Évaux-les-Bains avec 70 oiseaux posés, et 20 autres le 04/04 à l'étang de Landes (23-VirA).


● **Nidification :**

Plusieurs faits semblent s'affirmer au fil des années:

- la présence de l'espèce dans les zones périurbaines est très importante (lotissements, parcs...)
- la présence en centre-ville (Limoges...) devient habituelle.
- les oiseaux défendent leur territoire de nidification très tôt dans l'hiver (chants, parades avec claquement d'ailes). Il n'est donc pas rare d'observer des oiseaux qui chantent ou parades alors que des groupes d'hivernants sont présents à peu de distance. Exemples : le 17/01/03 avec des parades à Limoges (87-VirA), le 04/01/04 présence d'un chanteur à Ambazac (87-LanJ), encore d'autres parades à Limoges (87-MorS) et le 05/01/04 à Chéronnac (87-DouA).
- certains territoires sans doute très favorables sont occupés toute l'année.
- les indices de nidifications probables ou certains sont répartis sur une très grande partie de l'année, sur 9 mois pendant la période considérée. Parades en janvier et transport de matériaux le 20/09/03 à Saint-Jean-Ligoure (87-VirA) et le 14/02/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayS).

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*)

● Le podium des rassemblements les plus fournis concerne 121 ind. le 24/10/02 à Châlus (87-CouC), 80 ind. le 27/09/02 à Flavignac (87-PreP) et 60 ind. le 03/12/03 à Brive-la-Gaillarde (19-DauR). Le graphique ci-dessous indique que c'est en octobre et novembre que se forment les rassemblements les plus importants. À partir du mois de février, il est rare de rencontrer plus de 20, voir 10 oiseaux au même endroit. Les premières couvaisons ont lieu le 17/02/03 et le 10/02/04 à Aix-sur-Vienne (87-PreP).




Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

Les dernières mentions automnales se rapportent à 1 individu le 29/09/02 à Flavignac (87-PreP) et 1 individu le 12/10/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Les premières tourterelles sont contactées le 06/04/03 à Aubazines (19-CorP) et le 07/04/04 en Haute-Vienne (87-DouA).

La reproduction est prouvée à deux reprises : le 06/07/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP) et le 02/07/04 à La Meyze (87-PreP), avec respectivement une famille et des jeunes volants.

Enfin, le graphique ci-dessous montre que la période de chant de la Tourterelle des bois s'étale de début avril jusqu'à mi-août, avec une intensité majeure en mai et juin.

Répartition temporelle des chants de la Tourterelle des bois



CUCULIDÉS

Coucou gris (*Cuculus canorus*)


Les derniers individus sont contactés le 07/09/02 à Meilhac (87-DumA) et le 11/09/03 à Flavignac (87-PreP). Les chants annonçant les premiers retours sont entendus le 14/03/03 à Brive-la-Gaillarde (19-RenD) et le 17/03/04 à Saint-Léger-la-Montagne (87-RanJ). En 2004, les retours semblent plus tardifs qu'en 2003, et l'on constate que le mois de mars cumule 101 citations (18 % des citations de l'année) contre seulement 5 en 2004 (1 % des citations de l'année).

Le fameux «pirate» des nids n'est pas très apprécié des autres oiseaux : un juvénile est houspillé par des mésanges le 07/09/02 à Meilhac (87-DumA), un individu est atta-

qué par un geai le 11/04/03 à Ambazac (87-LanJ), une femelle est poursuivie par un passereau le 29/05/03 à Cromac (87-LanJ) et un juvénile se querelle encore avec un geai le 21/08/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ) ! Pour la période considérée, aucune preuve de nidification certaine n'a pu être apportée.

À partir de la dernière décade de juin, les Coucous gris ne sont quasiment plus observés dans notre région. Ceux qui le seront sont identifiés comme juvéniles pour près d'un tiers d'entre eux.

**Nombre de citations (cumul des 2 années couvertes par cette centrale)
par décade du Coucou gris**



TYTONIDÉS

Effraie des clochers (*Tyto alba*)

● Elle est signalée régulièrement tout au long de l'année. En hiver, on peut l'apercevoir jusqu'à tôt le matin, en vol à 7h40 le 12/12/02 à Lupersat (23-ColD), ou posée le long d'une route de bon heure le soir, comme ce 07/02/03 à Flavignac avec un individu perché à 19h30 sur une ligne téléphonique (87-Pral).

Beaucoup d'oiseaux sont soignés par le centre de soins, ceci dû aux nombreux chocs avec les lignes électriques, barbelés et voitures. Pour certaines malheureusement, la mort est immédiate comme le 14/09/03 à Uzerche (19-ChaJ) ou pas moins de 4 chouettes sont signalées sur le bord l'A20 le long d'une portion de moins d'un kilomètre. Le centre accueille également des jeunes tombés ou sortis du nid trop tôt, dans l'impossibilité de voler. L'idéal lorsque l'on trouve des jeunes nocturnes, c'est de les mettre si

possible dans un cageot et de les surélever afin que les parents puissent continuer à les nourrir, comme le 30/05/03 à Bussière-Galant (87-CouC) où deux jeunes trouvés à terre dans une stabulation seront secourus de cette façon. On peut signaler aussi l'éclosion de sept œufs dans un nichoir le 25/06/04 à Châlus (87-CouC).



Olivier Schiltz

STRIGIDÉS

Grand-duc d'Europe (*Bubo bubo*)

• Toutes les données proviennent de Corrèze mais les contacts avec ce grand rapace sont peu fréquents tout de même.

- mâle chanteur le 26/01/03 au barrage de l'Aigle (19-DefP),
- mâle chanteur le 06/09/03 à Saint-Julien-Près-Bort (19-DefP),
- fientes et pelotes trouvées le 19/10/03 à Sérandon (19-BarJ),
- 2 ind. observés au crépuscule le 06/01/04 à Roche-le-Peyroux (19-BarJ).

Une seule preuve de nidification certaine a été décelée au cours de la période. Elle nous parvient du barrage de l'Aigle où le 14/05/03, des jeunes âgés de 7 semaines sont détectés et confirme donc la nidification dans le secteur (19-DefP).

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

• Durant la période, sur 174 données, la chevêche est mentionnée à 8 reprises comme nicheuse certaine en Haute-Vienne, à 4 reprises en Corrèze, mais aucune fois en Creuse, où les observations semblent moins fréquentes. Une dizaine de données proviennent de jeunes tombés du nid et qui sont amenés pour la plupart au centre de soins.

Selon les données recueillies, les mâles chantent assidûment à partir de janvier, comme le 20/01/03 à Oradour-sur-Glane (87-NauD), et ce jusqu'à mi-avril où un individu est entendu le 12/04/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

On peut voir heureusement des jeunes en dehors du centre de soins, avec ce nid contenant trois poussins à Ussac (19-BerF), ou bien ces juvéniles sortis du nid à Nieul (87-GauR).

Sinon, notre petite chouette peut être visible toute l'année, posée sur un toit le 14/10/02 à Naves (19-ChaJ), ou sur un fil électrique le 15/10/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-DouA).

Chouette hulotte (*Strix aluco*)

• 75 % des données proviennent de Haute-Vienne, 15 % de Corrèze et 10 % de Creuse. La hulotte est, bien sur, présente toute l'année et son chant la signale pour la moitié des citations. Elle est d'ailleurs entendue quasiment à toutes les périodes de l'année avec un peu moins d'activité acoustique en période d'élevage des jeunes. Des chants simultanés sont entendus le 31/10/02 à Ambazac (87-LanJ), le 30/03/04 à Limoges (87-SchO) et le 08/06/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-DouA).

30 citations en nicheur certain, comme le 14/03/03 à Lupersat avec un nid garni de quatre œufs (23-ColD). Si certains couvent à cette période, d'autres élèvent déjà leurs jeunes comme en démontre ces juvéniles découverts le 17/03/03 à Châlus (87-CouC). Le 24/06/04 à Dournazac, un jeune est trouvé au sol au pied d'une cheminée (87-CouC). Le nid se trouvait sur un replat à 3-4 mètres du haut de la cheminée ! Le 02/06/03 à Saint-Sylvestre (87-LanJ), trois juvéniles sont posés en groupe sur une même branche d'un feuillu.

15 données proviennent du centre de soins, souvent des jeunes non volants apportés, mais aussi des adultes victimes du trafic routier, comme cette chouette trouvée le 28/12/03 à Saint-Paul (87-CenS), soignée et relâchée le 10/02/04.

Hibou moyen-duc (*Asio otus*)

• L'espèce est discrète mais on peut l'apercevoir parfois posée sur des arbres, comme cet individu observé quasiment tous les jours du 31/03/03 au 14/04/03 à La Souterraine dans un cyprès de Lawson et houspillé régulièrement par des mésanges, pinsons, tarins des aulnes et autres merles,...le laissant sans réaction (23-BieJ). Parfois seul, il aime aussi la compagnie de ses semblables se rassemblant en dortoir hivernal, comme le 18/12/03 à Boisseuil où 7 individus se reposent dans un même arbre (87-FacP).

Nicheur dans notre région, on l'entend chanter en rase campagne ou plus en altitude, tel ce mâle le 13/04/04 à Faux-la-Montagne (23-JuiR). Les jeunes sont parfois visibles, le 18/06/03 à Saint-Fréjoux (19-DefP) ou le 14/05/04 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ).

L'espèce est malheureusement souvent l'hôte du centre de soins suite à de trop nombreuses collisions dues à des voitures, ou victime des clôtures barbelées. Un juvénile est soigné quelques semaines et relâché le 04/12/02 à Limoges (87-CenS) et un autre le 21/12/03 à Dun-le-Palestel (23-CenS). Heureux dénouement pour ces deux oiseaux, car l'euthanasie est malheureusement plus souvent de rigueur...

Hibou des marais (*Asio flammeus*)

● Un individu est posé dans un pré le 15/10/02 à Flavignac (87-PreP et Pral), probablement en halte migratoire. Ce sera la seule donnée pour cette période concernant cet oiseau bien rare en Limousin.

Chouette de Tengmalm (*Aegolius funereus*)

● Pas de contact pour cette espèce en 2002.

En 2003, un couple est d'abord observé le 15/03 à Meymac (19-SauJ), puis un chant est entendu le 06/06 à Meymac de 22h15 à 23h00 (19-DouA), et ré-entendu un mois plus tard le 07/07 (19-DouA). Le 16/10, un oiseau est trouvé à Limoges et soigné au centre de soins (87-CenS). Il est relâché le 12/11 à Davignac (19) en parfaite santé.

L'année 2004 débute le 03/03 avec un chant signalé à Lamazière-Haute (19-DouA).

La seule donnée de nidification certaine provient de Saint-Georges-Nigremont où la couvaison de l'espèce est constatée le 18/04/04 (23-PriV).

CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*)


● L'ensemble des données provient de Corrèze (30 contacts) et de Haute-Vienne (20 contacts). Une prospection plus poussée en Creuse, notamment sur le plateau de Millevaches, pourrait combler ce manque puisque la partie corrézienne cumule des effectifs importants pour la région (Cf. Carte).

Les engoulevents nous quittent dès le mois d'août et les derniers sont notés le 02/09/03 à Bussière-Galant (87-EyrO) et le 15/08/04 à Bussière-Boffy (87-CREN).

Les premiers oiseaux sont de retour début mai : le 01/05/03 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ) et le 12/05/04 à la Tourbière des Dauges où un nid sera découvert le 10/06/04 (87-GueK).

Sept oiseaux se querellent et parquent le 12/06/03 à Saint-Hilaire-les-Places (87-LabB), ce qui constitue l'effectif maximum dénombré, devant les 6 chanteurs différents entendus dans des clairières le 24/06/03 à Saint-Angel (19-DefP).

Carte de répartition de l'Engoulevent d'Europe du 16/08/02 au 15/08/04



APODIDÉS

Martinet noir (*Apus apus*)

● C'est dès le mois de juillet que les martinets entament leur migration vers leur quartier d'hivernage, se faisant donc rares au mois d'août. Les groupes les plus importants, en migration active, concernent 138 individus le 11/07/04 à Flavignac (87-PreP) et 140 individus le 14/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Si certains s'attardent jusqu'en septembre, avec un individu le 30/09/02 à Rilhac-Lastours (87-LabB) et un le 28/09/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), mais celui vu le 21/12/02 à Curemonte avait probablement oublié de régler son horloge interne (19-CorP) !

Le retour a lieu début avril : le 08/04/03 à Saint-Léonard-de-Noblat (87-BarJ) puis le 02/04/04 à Malemort-sur-Corrèze (19-BerF) et à Nieul (87-BouP).

Les nids se construisent ensuite dès la fin du mois, notamment le 23/04/04 à Saint-Priest-Ligoure (87-JenG). Un nid garni est découvert le 11/05/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF) tandis que des jeunes sont encore nourris le 18/08/02 à Ambazac (87-LanJ).

ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe (*Alcedo atthis*)

● L'oiseau est visible tout au long de l'année. Pas un mois sans qu'il ne soit noté durant la période concernée, et ce sur les trois départements. Étangs et rivières sont, bien sûr, ses lieux de prédilection.

Il est repéré nicheur certain sur quelques sites :

- nid découvert le 17/04/03 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-LabD),
- coquilles d'œufs trouvées à proximité du nid le 07/06/03 à Augères (23-BouP),
- 3 jeunes nourris par leur parent le 23/08/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR),
- nid découvert le 20/06/04 à Saint-Viance (19-GauR).

MÉROPIDÉS

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)

● Une seule donnée en 2003, 1 oiseau migrateur le 23/07/03 à la Tourbière des Dauges (87-GueK).

En 2004, de belles observations pour un bel oiseau mais sans preuve de nidification.

D'abord, 6 individus sont observés en migration active le 14/05/04 à Saint-Georges-de-Nigremont (23-PriV), premier contact de l'année en Limousin. Puis une dizaine d'observations comptant jusqu'à 12 individus du 11/07/04 au 04/08/04 posés la plupart du temps sur des fils électriques à Perpezac-le-Blanc (19-PloA et CreD).

UPUPIDÉS

Huppe fasciée (*Upupa epops*)

● Pour l'année 2002, la dernière présence de Huppe fasciée est notée le 05/09/02 à Flavignac (87-Pral). En 2003, le dernier individu limousin mentionné est observé le 29/09/03 à Flavignac (87-EyrO).



Le retour s'effectue durant le mois de mars, le plus précoce de l'année 2003 étant le 09/03/03 à Azérables (87-Faye) et pour l'année 2004, le 23/02/04 à Ladignac-le-Long (87-CNG).

Les premiers chants sont eux aussi entendus en mars de façon sensiblement identique pour les deux années, le 14/03/03 à Nieul (87-RouA) et le 17/03/04 à Châlus (87-CouC).

La nidification débute en avril avec un transport de nourriture le 19/04/03 à Flavignac (87-PreP). Elle se poursuit durant le mois de mai, avec l'observation de 3 jeu-

nes volants le 18/05/03 à Châlus (87-CouC). Au cours du mois de juin, 2 mentions de jeunes volants sont notées, le 15/06/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA) et le 15/06/04 à Ussac (19-BerF), ainsi qu'une famille le 20/06/03 Bussière-Galant (87-CouC). Au mois de juillet 2004, un transport de nourriture est assuré par un adulte au nid le 02/07/04 à Nexon (87-LabB) et des jeunes volants sont présents le 31/07/04 à Flavignac (87-PreP).

PICIDÉS

Torcol fourmilier (*Jynx torquilla*)

● Migrateur transsaharien, cet oiseau est relativement discret et s'installe préférentiellement dans des milieux dépourvus de conifères. Par conséquent, l'espèce fournit peu de données dans notre région, avec 56% des observations provenant de Basse-Corrèze.

En 2003, les premiers individus sont observés le 13/04/03 à Lissac-sur-Couze, avec un mâle chanteur (19-FauB), puis le 15/04/03 à Meuzac (19-Blal). Le dernier individu de l'année est observé le 14/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

En 2004, les premiers contacts avec l'espèce ont lieu le 12/04/04 à Flavignac (87-PreP), et le 14/04/04 à Limoges (87-SEPOL). Quelques jours plus tard, retentit le premier chant le 19/04/04 à Flavignac (87-PreP), et le dernier contact de l'espèce est noté le 16/06/04 à Fontanières (23-DupE).

À noter qu'aucune reproduction n'a été prouvée.

Signalons l'observation assez surprenante d'un individu à quasiment 900 mètres d'altitude le 17/05/04 à Pérols-sur-Vézère (19-BarJ).

Pic vert (*Picus viridis*)

● L'espèce est commune en Limousin, voire abondante dans certains secteurs.

4 de données de reproduction certaine ont été répertoriées :

- 1 jeune volant le 23/06/03 à Limoges (87-MerC),
- 1 jeune non volant le 11/06/04 à Châlus (87-CouC),
- 1 jeune volant le 27/06/04 à La Jonchère-Saint-Maurice (87-LanJ),
- 4 juvéniles volants le 25/07/04 à Davignac (19-ChaG).

Pic noir (*Dryocopus martius*)

● Il est signalé toute l'année dans une bonne partie de la région et seul le bassin de Brive est délaissé par l'espèce. Les premiers chants et tambourinages sont notés dès le 07/02/03 à Bussière-Boffy (87-DouA), et une construction de loge est observée le 27/01/03 à Treignac (19-LabD). Des chants de nouveau sont entendus durant l'automne, comme le 14/10/03 à Flavignac (87-PreP), ou encore le 11/11/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA).

En 2004, les premières manifestations vocales sont notées le 06/01 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) et le 04/02 à Ambazac (87-LanJ).

5 données de reproduction certaine sont répertoriées :

- loge découverte le 13/04/03 à Treignac (19-BerF),
- loge découverte le 07/04/04 à Meuzac (19-MorS),
- loge découverte dans un peuplier le 08/04/04 à Saint-Jean-Ligoure (87-EyrO),
- loge découverte dans un hêtre le 26/06/04 à Blond (87-BouH),
- loge découverte dans un hêtre le 03/07/04 à Ambazac (87-LanJ).

Signalons 2 loges découvertes dans des platanes le 28/03/04 en bord de Vienne à Aix-sur-Vienne (87-LabB).

Pic épeiche (*Dendrocopos major*)

● Il est noté en toute saison et dans toute la région limousine. 16 reproductions certaines sont prouvées.

En 2003, les premières loges occupées sont découvertes le 25/02/03 à Flavignac (87-Pral) et le 28/03/03 à Couzeix (87-GauR). Le premier nourrissage est observé le 13/05/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Les premiers jeunes volants sont vus le 04/07/03 à Dournazac (87-EyrO) et le 26/07/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

En 2004, d'autres données font état d'une reproduction de l'espèce :

- nid occupé le 28/03/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS),
- nid garni le 30/05/04 à Bourgneuf (23-LanJ),
- 2 jeunes volants le 14/06/04 à Ambazac (87-LanJ).

Pic mar (*Dendrocopos medius*)

● Cette espèce particulièrement discrète est en apparence présente en très petit nombre dans la région. Mais l'homogénéité géographique des citations et la connaissance que l'on a de son comportement spécifique peuvent laisser penser que les effectifs réels sont plus importants que ce que l'on peut observer. Il serait peut-être intéressant et surprenant de réaliser une étude approfondie du Pic mar, puisque sa discrétion et sa méconnaissance nous font probablement mésestimer son statut en Limousin.

Par ailleurs, aucune nidification n'a pu être prouvée au cours de la période étudiée. Un couple est toutefois observé le 20/03/03 à Cussac (87-CouC), et les premiers mâles chanteurs sont entendus le 28/03/03 à Couzeix (87-GauR), puis le 05/02/04 à Bort-les-Orgues (19-DouA). On relève également un couple paradant le 05/02/04 à Saint-Julien-Près-Bort (19-DouA). Enfin, ce nid est en construction dans un chêne à 10 mètres de hauteur est mentionné le 12/04/04 à Peyrilhac (87-BouP).

Pic épeichette (*Dendrocopos minor*)

● En période de nidification, l'espèce est notée sur 54 sites différents (28 en 2003, 32 en 2004). Cependant, aucun indice de reproduction certaine n'est révélé.

Les premiers tambourinages sont entendus :

- le 09/03/03 à Bussière-Galant (87-CelJ),
- le 21/03/03 à Saint-Mathieu (87-LanJ),
- le 21/03/04 à Chéronnac (87-DouA),
- le 28/03/04 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR).

En 2003, les chants se font entendre dès le 22/03/03 à Saint-Pantaléon-de-Larche (19-GauR), et à La Roche-l'Abeille (87-DumA). Plus précoce, les chanteurs de 2004 sont notés à partir du 08/02/04 à Montrol-Sénard (87-DouA) et du 17/03/04 à Liginac (19-BarJ). Et pour finir, cet individu observé en migration active le 19/10/03 à Jalesches (23-NauP).



ALAUDIDÉS

Alouette lulu (*Lullula arborea*)

● Un mâle chanteur se fait entendre le 29/09/02 à Meilhac (87-LabB), tout comme à Saint-Junien (87-DouA). Le dernier sera entendu le 06/10/02 à La Roche-l'Abeille (87-DumA) tandis que le premier migrateur actif est noté le même jour au même endroit. Seulement 483 oiseaux, du 29/09/02 au 11/11/02, sont relevés en migration en Limousin sur les différents sites de suivi. Les dernières de l'année seront contactées posées au sol dans une prairie le 14/12/02 à Bussière-Galant (87-VirA).



Au cours du mois de janvier 2003, des petits groupes d'hivernantes sont observées çà et là en Limousin, avec 5 à 20 individus par bande. Certains individus isolés se rassemblent pour former des dortoirs, comme le 05/01/03 à Bussière-Galant (87-CouA). Le premier mâle chanteur isolé est signalé le 09/02/03 à Cognac-la-Forêt (87-DouA) tandis que les migrateurs sont déjà de retour le 20/02/03 à Flavignac (87-PreP).

Beaucoup de contacts de mâles chanteurs, mais peu de preuves de reproduction certaine pour l'année 2003 en dehors d'un transport de nourriture détecté le 31/05 à Flavignac (87-PreP), ou un transport de sacs fécaux le 05/06 à Meilhac (87-LabB).

Le 13/09/03, les 2 premiers migrateurs de la saison sont enregistrés à Flavignac (87-EyrO), alors que les derniers le sont le 13/11/03 sur le même site (87-PreP). À noter un passage important le 19/10/03 à Chaillac-sur-Vienne en une demi-heure (87-BusR), ou encore le 25/10 avec 151 individus en 1h25 d'observations à Évaux-les-Bains (23-DupE).

Le premier chant de l'année 2004 est entendu le 10/01 à Peyrilhac (87-BouP), et l'on relève une activité importante des mâles chanteurs entre les deux premières décades de février sur l'ensemble de la région. Cette activité se mélange avec la migration tout au long du mois de mars.

Alors qu'une famille est observée le 01/05/04 à Nexon (87-DumA), un nid garni de 4 œufs est découvert le 10/05/04 à Châteaux (19-BarJ), un transport de nourriture le 19/05/04 à Flavignac (87-PreP) et un individu avec une chenille dans le bec le 29/05/04 à Meymac (19-DouA). La saison s'achève avec un individu posé sur la route le 15/08/04 à Flavignac (87-PreP).

Alouette des champs (*Alauda arvensis*)

Les premières de l'automne 2002 sont observées le 28/09 à Flavignac (87-PreP) et à Saint-Junien (87-DouA), avec respectivement un individu par site. Puis, la migration postnuptiale monte en puissance petit à petit jusqu'à atteindre un premier pic de 600 individus observés le 20/10/02 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). Au même moment, près de 426 individus passent entre 8h00 et 8h30 à Moissannes (87-BarJ). Un second pic sera enregistré le 29/10/02 avec 1 200 individus contactés en 4h30 d'observations à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD) et 1 533 individus à Rilhac-Lastours (87-LabB).

Puis, la migration s'étale légèrement et s'achève le 09/11/02 avec 200 individus à La Meyse (87-LabB). La dernière alouette de 2002 sera notée comme hivernante à l'étang de Lavaud (87-BusR).

Le 06/01/03, les hivernantes apparaissent en petit nombre, comme les 6 présentes à Châlus (87-CouC). La migration pré-nuptiale s'installe ensuite dès le 22/02/03 avec 50

individus à Mansac (19-GauR) et 421 individus à Flavignac (87-PreP). Un passage de 256 individus est enregistré le même jour en une heure à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 448 autres en une demi-heure le 24/02/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), la moyenne des vols étant de 13 individus. Le 08/03/03, le mouvement printanier s'achève avec 160 individus notés en migration active à Flavignac en 6 heures d'observations (87-PreP).

Il n'y a pas de donnée de reproduction disponible pour l'année 2003.

La première migratrice de l'automne est notée le 26/09/03 à Flavignac (87-PreP). Elle sera suivie d'une légère montée en puissance jusqu'au 12/10/03 à La-Roche-l'Abeille avec 109 individus (87-DumA). Le gros de la troupe déboule en masse autour de la deuxième décade d'octobre. On peut noter ainsi près de 5 520 individus sur le Limousin entre le 14/10/03 et le 20/10/03. Près de 974 individus sont comptabilisés en migration active les 24 et 25/10/03 à Flavignac (87-PreP).

Les dernières belles bandes sont notées le 06/11/03 avec 350 individus en 4h d'observations à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD). Un inventaire permet de noter les 14 dernières à l'étang de Lavaux le 31/12/03 à quelques heures du réveillon (87-BusR).

Le 18/04/04, une bande de 300 individus hiverne dans une éteule à Videix (87-SotJ) et 250 individus sont également présents le 31/01/04 à Dompierre-les-Églises (87-LabG). La migration active devient significative les 14 et 15/02/04, où 175 individus sont notés à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et 200 autres à Veyrac (87-ChaG). Le 19/02/04, ce sont 517 oiseaux qui passent sur l'étang de Landes (23-SauJ). Puis, les observations de troupes en migration se généralisent entre les 06/03/04 et 17/03/04 sur l'ensemble du Limousin.

Le premier mâle chanteur de l'année est noté le 12/04/04 à Verneuil-Moustiers, et le dernier le 26/07/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-EyrO). Malgré une vingtaine de contacts, il ne sera pas possible de prouver la reproduction cette année là.

HIRUNDINIDÉS

Hirondelle de rivage (*Riparia riparia*)

● Peu de données disponibles sur l'espèce en cours de migration postnuptiale pour l'année 2002.

3 individus sont encore présents aux Sablières d'Argentat (19-SchL), mais c'est un groupe de 280 oiseaux qui fréquente l'étang de Landes le 01/09/02 durant son trajet migratoire (23-SauJ). Une retardataire passe le 06/10/02 à Peyrilhac (87-BouP) marquant la fin de l'année d'observation.

Le retour de la première hirondelle en 2003 est enregistré le 04/04 à Lussat (23-DubG) tandis que les contacts s'étalent sur le Limousin :

- 3 ind. le 08/04 à Saint-Auvent (87-SchB),

- 2 ind. le 27/04 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP),
- 2 ind. le 03/05 au Grand étang d'Azat-le-Ris (87-CavP),
- 8 ind. le 04/05 à Mansac (19-GauR).

Malgré cela, la reproduction ne sera pas prouvée de manière certaine cette année là.

Les données de la migration postnuptiale débutent avec 9 individus observés le 29/08/03 à Flavignac (87-PreP), puis 50 autres notés le 15/09/03 sur le même site (EyrO). Les 8 derniers individus de l'année sont vus le 29/08/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Retour précoce de l'espèce en 2004, avec 1 individu dès le 11/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP), mais aussi des contacts réguliers sur le mois de mars comme le 22/03 où plusieurs dizaines d'individus fréquentent le lac de Neuvic (19-BarJ). Au mois d'avril, l'espèce est bien présente en passage sur l'ensemble du Limousin avec des petits groupes de 10 à 15 oiseaux contactés sur les plans d'eau ou les cours d'eau. Dès le 24/04/04, les nids de la colonie d'Altillac sont fréquentés (19-GauR), et le 16/06/04, deux colonies distantes de 200 m à Saint-Brice-sur-Vienne sont occupées (87-LabB). Par ailleurs, les terriers sont notés garnis le 26/06/04 à Saint-Panthaléon-de-Larche (19-GauR). La migration commence ensuite le 04/07/04, avec un individu présent à l'étang de Landes (23-MerC) alors que l'on constate, le 30/07/04, la destruction de la colonie de Saint-Panthaléon-de-Larche (19-GauR).



Raphaël Bussière

Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*)

● Deux données en 2002 concernant exclusivement le département de Corrèze, avec 2 individus observés le 04/09 à Neuvic (19-DupE), et un oiseau isolé noté le 15/09 à Ayen (19-FauB).

Trois données sont relevées en 2003, toujours en Corrèze. Le 23/03/03, la première hirondelle est repérée en vol à Turenne (19-DauR), tout comme les 5 individus présents le 07/06/03 (CorP). Trois oiseaux le 08/06/03 sont observés à Bort-les-Orgues (19-DouA).

L'année 2004 est nettement plus riche en données, avec 21 inventaires mentionnant l'espèce. Pour la première fois, l'espèce est notée nicheuse certaine en Haute-Vienne sur deux sites de nidification : le 17/06 à Bujaleuf (87-LebA) et le 01/07 à Saint-Julien-le-Petit (87-LebA). Cependant, c'est à Sérandon qu'est enregistrée la première mention de l'année, le 15/03 (19-BarJ), tandis que le même observateur note également sur ce même site, le 03/04 un individu mort, étranglé par un fil de pêche. L'espèce nous offre également une donnée creusoise le 27/03 au centre-ville d'Aubusson (23-NutJ). Puis le 08/05, un groupe de 22 oiseaux au minimum est enregistré au Barrage de Marèges de Ligniac (19-BarJ).

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

● Le 16/08/02, un groupe de 20 oiseaux est présent à l'étang de Murat (87-HubP) alors qu'un nid garni de poussins est noté le 31/08/02 à Bessines-sur-Gartempe (87-CacM). On retiendra la note insolite d'un individu albinique enregistré à Soudaine-Lavinadière parmi un groupe de 29 oiseaux (19-HubP). Le dernier nid garni est relevé le 05/10/02 à Chaptelat avec deux jeunes (87-SolV), quant à la dernière migratrice, elle est vue le 30/10/02 à Magnac-Bourg (23-TulY).

En 2003, les deux premières de l'année sont repérées à Flavignac (87-PreP). La dixième hirondelle est observée seulement 4 jours après l'arrivée des premières. La région est recolonisée de manière rapide principalement par l'Ouest de la Haute-Vienne. À contrario, la première donnée corrézienne est réalisée le 14/03/03, soit 10 jours après la première, à Neuvic (19-ThuB). Le 11/05/03, un nid garni de 5 œufs est trouvé à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF) et deux autres avec 3 et 6 poussins le 22/05/03 à Flavignac (87-Pral). La reproduction est établie sur l'ensemble du Limousin de manière homogène. Le 03/08/03, un premier rassemblement de 100 individus est noté à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF), le plus important étant un vol de chasse de 300 individus le 15/08/03 à l'étang de Lavaud (87-BusR). Plus de 1 000 oiseaux passent en migration entre le 13/09 et le 15/09/03 à Flavignac (87-PreP et EyrO), tandis que le dernier contact a lieu le 26/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-EyrO). C'est à Ayen le 14/02/04 qu'est observé la première hirondelle de 2004 (19-FauB). Puis, la dixième mention est notée le 12/03/04, soit près d'un mois plus tard à Oradour-sur-Glane (87-NauD). La centrale recèle un nombre très important de mentions de reproduction certaine de l'espèce sur l'ensemble de la région mais il semble bien délicat d'avancer une quelconque tendance de dynamique de population interannuelle. Dès le 15/08/04, les vols migratoires sont annoncés, comme le groupe de 50 individus en vol au-dessus d'Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbica*)

La migration est entamée avec un groupe de 44 individus volant à moyenne altitude le 16/08/02 à Ambazac (87-LanJ), alors que les derniers nids sont encore occupés, comme le 31/08/02 à Bessines-sur-Gartempe (87-CacM). Un rassemblement de 450 oiseaux en dortoir est noté le 31/08/02 à Uzerche (19-Prev) témoignant des rassemblements nocturnes que l'espèce constitue en phase de migration. Près de 200 individus sont observés en vol le 30/09/02 à Treignac (19-LabD). Les 4 dernières migratrices sont notées lors du comptage simultané du 20/10/02, en milieu d'après-midi, à La Bazeuge (87-CavP).

Le retour précocé de l'espèce a lieu le 06/02/03 à Darnac (87-DouA), alors qu'il faut attendre le 16/03/03 pour observer les suivantes à Bussière-Galant (87-CNG), suivies d'un groupe de 40 individus le 21/03/03 à Ussel (19-ThoF). Le 13/04/03, les oiseaux s'affairent autour des nids à Lagraulière (19-ChaJ) et le premier jeune volant de l'année est découvert le 24/05 au Palais-sur-Vienne (87-EyrO). Beaucoup d'observations sur les mois suivants font état d'une reproduction certaine de l'espèce un peu partout sur l'ensemble du Limousin et jusqu'à 700 m d'altitude à Saint-Fréjoux (19-ThoF). Le Centre Départemental de Soins de la Faune Sauvage signale des jeunes ramassés à terre le 07/07/03 à Nieul (87). Les nourrissages vont bon train, tandis que les 2 premiers migrants de la saison sont notés le 11/08/03 à Moissannes (87-BarJ), suivis d'un vol de 170 individus le 18/08/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Le 17/09/03, un nourrissage est toujours en cours à Meuzac (87-BarJ) alors que la migration atteint son pic sur la région avec 400 individus le 27/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-BouP). La dernière mention est enregistrée le 24/10/03 en migration active à Flavignac (87-PreP).

On observe un retour classique de l'espèce le 26/03/04 à Maisonnais-sur-Tardoire avec 2 individus (87-RayA), et à Saint-Jouvent avec un individu (87-SotJ). Le 03/04/04, 20 hirondelles volent au-dessus de l'étang de la Rechèze (19-CreD). Mais en réalité à cette période, les observations ne concernent que 1 à 5 individus en migration et ce jusqu'au 10 avril. Le pic de passage est alors constaté jusqu'au 30/04/04 sur tout le Limousin avec des groupes constitués de plusieurs dizaines de migrants.

En période de nidification, une construction de nid est repérée le 24/04/04 à Brivezac (19-GauR) mais il faut attendre le 04/05/04 pour que le premier nid garni soit signalé à Ambazac (87-LanJ) et que les jeunes soient volants au 26/06/04 sur le même site. L'altitude maximale notée pour un nid garni est de 610 m à Saint-Martin-Château (23-FleJ).

Enfin, le premier vol migratoire postnuptial actif est signalé le 14/08/04 à Oradour-Saint-Genest avec 27 individus (87-CavP).

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*)

Le premier de la saison est observé en migration active le 22/08/02 à La Souterraine (23-LabG) en vol isolé comme la plupart des observations réalisées au cours du passage de fin août / début septembre, où près de 18 individus ont été enregistrés en Limousin. Le dernier de l'année est repéré le 06/10/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA).

Les contacts printaniers apparaissent à partir du 09/03/03 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS), et se multiplient, notamment la journée du 09/04/03 où 9 individus sont observés à Aix-sur-Vienne (87-PreP) lors d'un suivi de la migration active. Le premier mâle chanteur est repéré le 12/04/03 à Compreignac (87-SotJ) tandis que le premier chant ne retentit qu'à partir du 21/04/03 à Peyrilhac (87-BouP). Le 17/05/03, lors du protocole « STOC-Capture » du CRBPO/MNHN de Paris, 3 individus sont bagués sur le site de reproduction de la Tourbière des Duges à Saint-Léger-la-Montagne (87-TeuJ et Selp). Le 14/06/03, au même endroit, une femelle présentant une plaque incubatrice y sera capturée (87-Selp).

Le premier transport de nourriture est noté le 10/06/03 à Nexon (87-LabB) tandis que les dernières parades clôturent la saison de reproduction 2003 le 06/07 à Beaumont-du-Lac (87-LanJ).

Dès le 11/08/03, les 3 premiers migrants sont observés à Moissannes (87-BarJ) et la migration s'achève sur le passage remarquable et inhabituellement tardif de 201 individus le 26/10/03 à Sauviat-sur-Vige (87-LanJ) en 5h45 d'observations.

2004 débute avec un premier migrant le 14/03 à Saint-Jouvent (87-GauR), tandis que le premier mâle chanteur est détecté le 05/04/04 à Voutezac (19-FacP).

Un transport de nourriture sera observé le 29/05/04 à La Roche-l'Abeille (87-DumA), une observation rare malgré la densité des données (62 inventaires) concernant des mâles chanteurs isolés ou des parades sur l'ensemble du Limousin. La saison de reproduction s'achève tristement avec un individu mort par collision routière trouvé à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ).

Pipit farlouse (*Anthus pratensis*)

Le premier est contacté le 30/08/02 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ). Sur ce début de saison, la plupart des observations mettent en évidence des oiseaux isolés ou en petits trios à l'exception des 10 individus observés le 07/09/02 à La Roche-l'Abeille (87-Pral). Le 29/09/02 sur deux heures d'observations, ce sont 50 oiseaux en vol migratoire qui sont enregistrés à Rilhac-Lastours (87-LabB), et le lendemain, 180 autres mettent en évidence un pic très net de passage à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ). Sur le même site, le 13/10/02, un passage de 56 individus est observé sur deux heures (BarJ) tandis que les

14 et 15/10/02 près de 210 oiseaux migrent au dessus de Flavignac (87-PreP). Ces observations, de petits groupes (1 à 68 ind.) en migration active, vont s'étaler jusqu'au 04/11/02 sur de très nombreux sites de Haute-Vienne et de Corrèze, montrant ainsi un front de migration très large sur notre région. Ensuite, les hivernants sont présents un peu partout sur le Limousin, et l'on note un dortoir de 177 oiseaux à partir de 16h00 le 12/12/02 à Ladignac-le-Long (87-LabB) et un groupe de 29 individus posés dans une prairie le 19/12/02 à Saint-Hilaire-les-Places (87-LabB).

Le dernier individu de l'année 2002 sera noté le 29/12/02 sur les landes de la Flotte et du Cluzeau de Château-Chervix (87-NedS).

Dès le 08/02/03, des rassemblements indiquent une préparation de la migration active, comme les 49 individus à Bussière-Galant (87-Pral), les 100 individus présents en dortoir à l'étang des Planchettes (87-LabB) ou encore 100 autres sur les landes de Ceinturat à Cieux (87-VirA). La migration se concentre alors autour de la quatrième décade de février et la première de mars, avec des observations qui varient de 10 à 90 individus sur divers sites en Limousin. Un léger flux migratoire reste présent néanmoins sur le mois d'avril. Le 23/05/03, un premier mâle chanteur est observé à Saint-Goussaud (23-GauR), qui sera le seul témoignage d'une possible reproduction de l'espèce en Limousin cette année là.

La migration postnuptiale reprend le 12/09/03 à Flavignac (87-PreP), avec un individu isolé. Ce passage au compte-goutte s'étale jusqu'à la troisième décade de septembre où l'on enregistre une activité plus marquée : 125 oiseaux sont enregistrés en 4 jours sur les sites de suivis de la migration de Haute-Vienne (PreP, CouC, EyrO, LanJ, BarJ). Les 03/10 et 04/10/03, 324 individus passent au-dessus de Flavignac (87-PreP et EyrO), avec des vols moyens constitués de 5 individus. Le 12/10/03, sur deux heures d'observations, près de 300 pipits migrent à Châlus (87-CouC). Le pic de la migration est enregistré en Limousin entre le 15/10/03 et le 28/10/03. Les bandes hivernantes sont notées dès la mi-décembre comme à Veyrac (87-ChaG) avec 30 individus posés au sol, ou les 20 oiseaux présents à Rilhac-Lastours (87-DumA).

Comme en 2003, des bandes hivernent localement. On retrouve ainsi, dès le 03/02/04, la bande hivernante de 100 individus sur les landes de Ceinturat à Cieux (87-VirA) ou encore le 08/02/04, 20 autres posés dans un champ à Soudaine-Lavinadière (19-HubP), puis enfin les 22 et 23/02/04, ce sont 25 individus qui sont présents sur le stade de Laurière (87-VinS). Ensuite le 24/03/04, 200 individus sont localisés posés au sol à Saint-Auvent (87-LabB) marquant ainsi la fin des bandes hivernantes repérées. En deux heures d'observations, 39 individus passent en migration prénuptiale le 11/04/04 à Chamberet (19-HubP) et 101 autres entre le 14/04/04 et le 20/04/04 à Flavignac (87-PreP). Un nourrissage de jeunes est observé le 29/05/04 à Meymac (19-DouA), offrant la seule de preuve de nidification certaine pour l'année, malgré quelques contacts de mâles chanteurs comme le 02/06/04 à Tarnac (19-EyrO).

Pipit spioncelle (*Anthus spinoletta*)

Le premier de l'année 2002 est repéré le 07/10 à l'étang de Murat (87-SotJ). Si les oiseaux sont souvent isolés, ce n'est pas le cas des 19 individus localisés le 22/12/02 à l'étang du Mas Féty (87-BarJ). Il convient de noter que les oiseaux sont souvent en bordure de plans d'eau comme les 5 individus présents le 05/01/03 à Azat-le-Ris (87-HubP), et qui seront recontactés le 09/02/03 sur le même site (87-LabB). Il faut attendre le 20/04/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ) pour obtenir la première observation corrézienne. Quant aux derniers oiseaux du printemps, ils sont notés le 30/06/03 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV). Ensuite, il n'y a plus de contacts avant le 18/10/03 où un individu est identifié à Châlus (87-CouC). Le dernier de l'année est noté à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

Le début d'année 2004 permet d'observer dès le 02/01 cette espèce en bordure de plan d'eau à Saint-Pardoux (87-SotJ). Un groupe de 15 oiseaux émettent des cris posés au sol le 15/02/04 à Veyrac (87-ChaG). Ils ne seront plus que 10 sur le même site le 01/03/04 (87-ChaG).

7 individus sont présents le 20/03/04 à Lussat (23-DupE). Un mois plus tard, c'est un total de 18 individus qui sont observés le 18/04/04 sur le Limousin en deux sites : Liginiaac (19-BarJ) et Lussat (23-VirA). Puis, le 24/04/04, le dernier individu de la saison est contacté en Haute-Vienne marquant ainsi la fin de la présence de l'espèce sur la région (NauD).

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava flava*)

La première migratrice est contactée le 18/08/02 à Nexon (87-LabB) et la migration monte vite en nombre, comme les 30 individus présents le 05/09/02 à Perpezac-le-Blanc (19-LabD) ou encore les 36 autres dénombrés en une heure de comptage simultané le 20/10/02 à La-Bazeuge (87-CavP). Cette journée là sera d'ailleurs la dernière en 2002 à offrir un contact de l'espèce en Limousin.

Le premier contact en 2003 nous parvient le 18/02/03 de Moissannes (87-BarJ), mais la migration est nettement plus présente la première décade d'avril avec notamment le 09/04/03 avec 14 individus présents à l'étang de Landes (23-VinS). Sur le même site, 10 oiseaux sont toujours présents 11 jours plus tard (23-NorT).

Seulement 7 mentions de l'espèce en période de reproduction, toutes situées en Creuse, avec notamment un site d'observation privilégié : l'étang de Landes. La reproduction est à suspecter, toutefois sans preuves flagrantes.

La migration active redémarre dès le 24/08/03 à Flavignac (87-PreP) avec 1 individu isolé. Elle monte très rapidement en puissance, puisque 155 individus sont comptés les 30 et 31/08/03 à Flavignac (87-PreP) et 25 autres le sont en une demi-heure le 06/09/03 sur ce même site (87-EyrO). Le 15/10/03 à 18h00, un groupe de 47 individus se rassemble en dortoir sur un toit de supermarché à Bellac (87-CavP). Au même endroit, il ne reste plus qu'un seul individu le 07/11/03, constituant ainsi la dernière mention de l'année pour l'espèce (87-CavP).



La première de l'année 2004 est détectée le 18/03 à Lestard (19-RogJ) et les premiers groupes sont observés avec 8 individus le 04/04/04 à Le-Châtenet-en-Dognon (87-MerC), puis 9 individus à Lussat (23-VirA). Le maximum de contacts est enregistré entre le 10/04/04 et le 15/04/04 en Creuse et en Haute-Vienne uniquement.

Seulement 2 contacts pour la période de reproduction. Ceux-ci n'apportent pas d'éléments de précision sur le statut de l'espèce dans notre

région. Le 25/07/04, un vol migratoire est enregistré à Lussat (23-DubG) annonçant de manière précoce le passage diffus mais classique de l'espèce sur le Limousin.

Bergeronnette printanière flavissima

(*Motacilla flava flavissima*)

- Il n'y a pas de données pour les années 2002 et 2003.

La première migratrice est notée de manière isolée le 04/04/04 à l'étang de Landes (23-VirA). Un autre individu est contacté le 25/04/04 à Oradour-sur-Glane (87-BouP) et un groupe de 5 oiseaux le 09/05/04 à l'étang de Landes (23-HubP).

Bergeronnette printanière nordique

(*Motacilla flava thunbergi*)

- Il n'y a pas de données pour les années 2002 et 2003.

Deux étangs creusois accueillent l'espèce en 2004 :

- 1 ind. le 17/04 à l'étang de la Chaume (23-MerC),
- 2 ind. le 02/05 à l'étang de Landes (23-SauJ),
- 1 ind. le 09/05 à l'étang de Landes (23-HubP).

Bergeronnette des ruisseaux (*Motacilla cinerea*)

7 individus sont observés le 16/08/02 à Saint-Léger-Magnazeix (87-HubP) et 5 autres le lendemain à Argentat (19-SchL), offrant aux observateurs les derniers groupes familiaux de l'été jusqu'en début septembre. Dès fin septembre, les observations ne concernent plus que des individus isolés ou par paires, et le 06/10/02, le premier migrateur est noté à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA) lors du suivi de la migration. Peu d'observations dans cette période, mais elles concernent toujours des individus isolés.

La dernière observation de 2002 est celle d'oiseau à Limoges (87-ArnL).

Le 05/01/03, la première bergeronnette est notée à Azat-le-Ris (87-HubP), et 10 autres sont contactées du 10 au 12/01/03 en Corrèze, par 4 observateurs différents (CreD et al.). La première construction de nid est détectée le 25/03/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et au 10/04/03, 4 œufs sont présents dans le nid (87-PreP). Le 04/05/03, un juvénile est observé entrain d'être nourrit à Limoges (87-EyrO) en bords de Vienne, tandis que 5 poussins de quelques jours sont vus dans un nid le 28/05/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Le 14/06/03, une femelle présentant une plaque incubatrice est baguée dans le cadre du protocole « STOC-Capture » du MNHN de Paris à la tourbière des Dauges de Saint-Léger-la-Montagne (87-SelP). Les derniers jeunes volants de l'année sont détectés le 27/08/03 à Saint-Jean-Ligoure (87-VirA).

Le 25/09/03, le premier migrateur en vol actif est noté à Flavignac (87-EyrO). Peu d'observations durant les mois d'hiver, avec à peine 11 individus, dont 95 % des citations proviennent de Haute-Vienne. Le 06/03/04, 5 oiseaux sont enregistrés en bord de Vienne à Limoges (87-EyrO). La migration printanière n'est pas sensible dans le jeu de données enregistrées. Le premier mâle chanteur est entendu le 04/04/04 à Châteauneuf-la-Forêt (87-HubP), puis le 23/04/04, un nid est découvert à Saint-Léger-Bridereix (23-BieJ), suivi d'un autre garni de 5 poussins le 02/05/04 à Meilhac (87-PreP). La reproduction sera prouvée moins d'une dizaine de fois sur la région. Le dernier nourrissage de jeunes constaté provient de Saint-Viance le 20/06/04 (19-GauR), ensuite seuls des individus isolés sont observés en bordure de cours d'eau, comme le 15/08/04 à Saint-Junien (87-DouA), dernière observation de la période de reproduction.

Bergeronnette grise (*Motacilla alba*)

Les rassemblements postnuptiaux débutent le 07/09/02 à Lissac-sur-Couze (19-FauB) ou le 12/09/02 à Flavignac (87-PreP). Le premier migrateur est signalé le 05/10/02 à Flavignac (87-PreP) et dès le lendemain, ce sont près de 40 individus qui passent au-dessus du site d'étude en deux heures d'observations. Le 12/10/02 en une heure, 33 individus sont observés à Moissannes (87-BarJ) et 51 autres le lendemain sur deux heures de comptage. Le comptage simultané en Limousin du 20/10/02 permet de dénombrer 336 individus de passage sur notre région. Ensuite, un rassemblement en dortoir pour une centaine d'individus est signalé le 27/11/02 à Limoges (87-ChaJ) tandis que le 20/12/02, un groupe de 14 oiseaux cherche sa nourriture sur un tas de sable à Saint-Panthaléon-de-Larche (19-CorP), et un groupe de 26 oiseaux fréquente les bords de l'étang Saint-Fortunat (87-PreP).

En 2003, le premier retour est enregistré le 22/02 à Flavignac (87-PreP), suivi d'une observation originale le 04/04 à Saint-Léger-Magnazeix, avec 3 individus harcelant une Buse variable (87-EyrO).

Les premières preuves de reproduction sont apportées par un transport de nourriture le 21/04/03 à Lussat (23-DumA) et un autre le 28/04/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF). Un jeune est nourrit le 07/05/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA), et un nid garni d'œufs est détecté le 28/05/03 au camping d'Aix-sur-Vienne dans un trou de mur (87-PreP).

Le 11/08/03 à Moissannes, les 3 premiers migrateurs sont observés (87-BarJ) et le 22/09/03, un dortoir de 65 individus est noté sur le barrage de la Triouzoune (19-BarJ). Le 09/10/03, 41 bergeronnettes passent en migration à Oradour-sur-Glane (87-NauD). Et ce sont 62 individus qui sont comptabilisés en migration le 10/10/03 sur la matinée à Flavignac (87-EyrO), et 195 autres sur le même site d'étude le 15/10/03 montrant la montée en puissance du mouvement postnuptial.

Le 13/02/04, un platane au bord de Vienne accueille un dortoir de 50 individus à Aix-sur-Vienne (87-Pral), tandis que 30 individus se rassemblent en dortoir le 22/02/04 à Vignols (19-CelJ). Par la suite, 3 bandes d'une trentaine d'oiseaux se mélangent aux autres espèces sur les toits de granges du village de Chabreyroux à Oradour-Saint-Genest le 07/03/04 (87-CavP).

Les observations printanières débutent avec ce premier migrateur le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA), suivit de 2 individus s'accouplant le 03/04/04 à Vigeois (19-CreD). Un nid est en construction le 12/04/04 à Saint-Priest-sur-Vienne (87-BarP), un autre est garni le 08/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ). Des jeunes sont nourris le 15/05/04 à Dampniat (19-GauR) tout comme le 14/06/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Mais le transport de nourriture du 14/08/04 à Ambazac démontre que l'élevage s'étale sur une grande période (87-LanJ).

Bergeronnette de Yarrell (*Motacilla alba yarrellii*)

● Pas de données recueillies en 2002.

Une seule donnée pour l'année 2003 avec l'observation le 31/12 d'un individu à Couzeix (87-BouP).

Comme l'année d'avant, la seule donnée de 2004 concerne un individu isolé, posé dans un champ et présentant un plumage nuptial le 21/03 à Dournazac (87-EyrO).



CINCLIDÉS

Cincla plongeur (*Cinclus cinclus*)

● Très peu d'observations sont relevées pour le début de la période, en automne et hiver 2002. Il s'agit, en effet, le plus souvent d'individus isolés notés sur différents cours d'eau de la région. L'espèce est signalée sur la Vienne à Saint-Junien le 01/09/02 (87-DouA), puis plusieurs observations début septembre à Saint-Jean-de-Ligoure où, par exemple, 2 individus sont vus en vol le 20/09/02 (87-VirA). Sur la rivière Creuse, 1 oiseau est signalé le 29/10/02 à Aubusson (23-DupE). Le bassin de la Petite Creuse n'est pas en reste, puisqu'un individu est noté le 14/11/02 (23-FeuB et ColD). En Corrèze, on retiendra,

deux observations avec respectivement 1 individu le 02/11/02 à Chasteaux (19-GauR) et 1 individu le 07/11/02 à Viam (19-LabB et LabD).

En 2003, le Cincle plongeur est trouvé nicheur certain sur les trois départements dans des secteurs habituels pour l'espèce. Un nid est découvert le 28/03/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP), un second est en construction le 09/04/03 au Chalard (87-LabB), et sur la rivière Creuse, un dernier est trouvé le 21/04/03 à Crozant (23-NorT). Le nourrissage des jeunes est signalé le 28/04/03 au barrage de Chauvant (87-GuiV), alors qu'un nid vide est découvert le 07/06/03 à Meymac, en aval de la digue de l'étang de la Garenne (19-Pral).

La période d'automne et d'hiver 2003 reste peu fournie en observations, avec seulement neuf mentions comprises entre fin août et début décembre, réparties sur les habitats classiques de Corrèze et Haute-Vienne.

La première construction de nid en 2004 est localisée sur la Gartempe, où un couple exerce ses talents de bâtisseur, observé une première fois le 21/02/04 puis le 03/04/04 à Folles (87-VinS). Le nourrissage de jeunes par un couple est noté le 08/04/04 au pont de Solignac (87-EyrO), alors que des jeunes volants sont observés le 10/04/04 à Flavignac, au Moulin de la Borde (87-PreP). Les deuxième couvées sont découvertes dès le 16/05/04 au Moulin de la Borde à Flavignac, avec cinq poussins dans un nid situé sous un pont (87-PreP). Un couple est observé au nourrissage des jeunes de sa seconde couvée, le 30/05/04 sur la Gartempe à Folles (87-VinS). En Creuse, un nid est découvert le 15/05/04 à Lafat sur le bassin de la Sédelle (23-BieJ). Le nid vide trouvé le 29/05/04 à Meymac (19-DouA) reste la seule donnée pour l'ensemble du plateau de Millevaches où, pourtant, de très nombreuses rivières sont favorables à l'installation du Cincle plongeur !

TROGLODYTIDÉS

Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)

● En 2002, 2003 et 2004, l'espèce est présente sur l'ensemble de la région limousine, et son chant est enregistré très souvent quelque soit la saison et la météorologie.

Très actif dans ses activités, le troglodyte fréquente les bâtiments pour y construire un nid typique, bien qu'il utilise parfois ceux d'Hirondelles rustiques comme support. Il se montre persévérant à l'occasion, comme le 22/04/03 à Vignols (19-CelJ) où un individu tente d'explorer la maison de l'observateur à plusieurs reprises dès qu'une fenêtre s'ouvre. Le 18/06/03, la première preuve de reproduction est enregistrée à Ambazac (87-LanJ), avec deux jeunes duveteux posés l'un à côté de l'autre. Sur le même site, le 02/03/04 un cadavre est découvert suite à une collision routière (LanJ). Un nid garni avec 2 œufs est trouvé le 13/06/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR) et 6 poussins morts dans le nid sont signalés le 30/06/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).

La recherche des preuves de nidification certaine est à privilégier dans les années à venir pour affiner le caractère commun de celle-ci ainsi que sa répartition

Accenteur mouchet (*Prunella modularis*)

● Le premier de la saison 2002 est noté le 30/08 à Saint-Sornin-le-Lac (87-LabG). Bien que très présente sur le Limousin, cette espèce se fait bien discrète, et il faut attendre le 15/11/02 pour qu'un mâle chanteur soit entendu à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Dès le 01/01/03, les oiseaux fréquentent sporadiquement les mangeoires, comme à Limoges (87-EyrO), tandis qu'un premier chant est entendu le 19/01/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

La première preuve de reproduction est enregistrée le 21/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP) avec un nid garni de 4 poussins dans un tuya à 1,80 m de hauteur, ou encore garni de 7 poussins dans un nichoir le 16/05/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Le dernier individu de la saison est signalé le 29/12/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA), et le même site enregistre un accouplement le 09/04/04. Finalement, la reproduction n'est prouvée de manière certaine que sur 6 mentions en 2004 malgré la densité de données concernant des mâles chanteurs isolés ou des chants simultanés ... la discrétion de l'espèce fait qu'elle est peu étudiée de manière générale.

Accenteur alpin (*Prunella collaris*)

● Il n'y a pas de donnée en 2002.

La seule mention de 2003 concerne un individu posé au sol à côté de l'église le 30/12 à Yssandon (19-Pral). L'espèce reste rarement observée en Limousin, mais un oiseau est tout de même noté posé dans une haie le 07/03/04 à Yssandon (19-CreD), et un autre l'est le 07/04/04 à Voutezac (19-FacP).



Etienne Dupoux


Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*)

La preuve de nidification la plus précoce n'en est pas la moins nette : un nichoir accroché sur un mur contient neuf œufs le 30/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), puis les 9 poussins débarrassés de leur duvet sont toujours présent dans le nichoir le 27/04/03 (87-BusR). En 2004, il faudra attendre le 01/05 pour constater la reproduction, toujours dans un nichoir à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Cinq jeunes sont récupérés le 27/06/03 par le centre de soins La Loutre, dont trois seront relâchés un mois plus tard (87-CenS). Un individu transportant de la nourriture est observé le 20/06/04 à Concèze (19-GauR).

Les rougegorges nous égayent de leur chant toute l'année, avec toutefois deux pics : un premier en mars (les chanteurs concentrent alors une forte proportion de l'effectif total), et le second fin mai début juin. En juillet-août, l'espèce est très peu contactée (baisse de la pression d'observation à cette saison ?), et reprend son activité vocale à l'automne.

Nombre de citations totales et "chanteurs" du Rougegorge par décades



*même s'il n'y a pas de continuité réelle pour permettre une représentation de l'activité vocale par une courbe, cette dernière permet toutefois d'illustrer plus simplement le phénomène en complément du nombre de citations.

Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*)

● En 2003, les premiers chants annoncent son retour dès le mois de mars : le 14/03/03 à Nieul (87-RouA) et le 19/03/03 à Saint-Gence (87-LanL), mais il faut patienter jusqu'au 10/04/03 avec un chanteur à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), avant que n'arrive la majorité des individus. En 2004, le premier chant est entendu le 04/04/04 à Lussat (23-VirA) et un oiseau est vu le 09/04/04 à Limoges (87-EyrO).

Des chants simultanés retentissent le 20/04/03 à Lussat (23-DubG), et la reproduction est certaine en 2004, puisque le nourrissage des jeunes est d'abord constaté le 17/05 à Flavignac (87-PreP), puis le 26/06 à Lussat (23-MerC).

L'espèce se fait discrète en été et les observations deviennent rares. Notons toutefois un individu qui se toilette les plumes le 10/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Les suivis STOC-EPS ont fourni 77 % des citations pour la période couverte par cette centrale, d'où leur importance pour les futures cartes de répartition.

Gorgebleue à miroir (*Luscinia svecica*)

● Ce beau turdidé n'avait donné lieu qu'à 4 citations lors des trois précédentes centrales et le voilà cité à cinq reprises en 2003 (concernant probablement trois ou quatre individus différents) et aucune citation pour l'année 2004. Un mâle, en migration pré-nuptiale, est observé le 06/04 à l'étang de la Ramade (23-LerT) et deux autres, en migration postnuptiale, découverts le 04/09 à l'étang de Landes (23-BarJ). Un oiseau sera encore signalé sur ce site le 28/09 (23-DubG).

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*)

● Les premiers chants retentissent le 22/02/03 à Nexon (87-DumA), puis le 15/03/04 à Flavignac (87-PreP), à Oradour-Saint-Genest (87-CavP) et à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).


Les preuves de nidification les plus précoces concernent d'abord un nid abritant cinq œufs le 24/04/03 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP), puis un nid garni le 05/05/04 à Nieul (87-RouA). Des jeunes sont encore nourris le 14/08/03 à Ussel (19-ThoF) et le 02/08/04 à Saint-Robert (19-GauR).

Les effectifs, les plus importants, sont notés le 20/10/02 à Linards (87-LabC) avec 10 individus posés sur un fil de clôture et le 15/03/03 à Moissannes (87-BarJ) avec 15 individus en halte migratoire.

Après une reprise d'activité vocale en septembre / octobre, le chanteur le plus motivé est sans doute celui entendu le 14/12/03 à Saint-Robert (19-GauR) !

Comme le montraient les centrales précédentes, le Rougequeue noir se rencontre rarement l'hiver (et surtout dans la partie Ouest du Limousin (Cf. carte). Pour la période couverte par cette centrale, 95,5 % des citations sont réalisées de mars à octobre.

**Carte de répartition du Rougequeue noir de novembre à février
pour les deux années considérées en région limousine.**



Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)

Certains s'attardent dans notre région à l'automne, comme l'indique cet individu vu le 23/10/02 à Saint-Sylvestre (87-BouM) ainsi qu'un mâle et une femelle le 12/10/03 à Gumond (19-ChaJ).

Réapparition ensuite des premiers rougequeuees le 15/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Il faut patienter encore jusqu'au 29/03/03 pour entendre le premier chant à Limoges (87-VirJ), puis le 28/03/04 à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ) où un mâle chante tandis qu'une femelle est observée à proximité. Un nid contient 4 poussins le 23/05/03 à Objat (19-CreD) et un mâle approvisionne sa nichée le 29/05/04 à Nexon (87-DumA). Une femelle nourrit encore ses jeunes le 15/07/03 à Limoges (87-VirA) et le 24/07/04 à Davignac avec un nid garni (19-ChaG).

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)


La migration postnuptiale débute le 17/08/02 à Moissannes (87-BarJ) et le 05/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), mais le pic est atteint en septembre. Les derniers à partir sont observés le 19/09/02 avec 10 individus présents à Voutezac (19-FacP), puis d'autres le sont le 03/10/02 à Flavignac (87-PreP) et le 11/11/03 à Glandon (87-CelJ). Les plus gros effectifs sont notés au cours de cette migration, moins discrète que celle des retours (Cf. Graphique) : 12 ind. le 30/08/02 à Flavignac (87-PreP) et 10 ind. le 12/09/03 à Séréilhac (87-CouC).

Les premiers contacts printaniers s'effectuent le 07/03/03 à Saint-Vaury (23-DubG) et le 04/04/04 à Lussat (23-VirA). Quant à la reproduction, elle est suspectée le 28/05/04 à Gentioux-Pigerolles, où deux mâles isolés chantent (23-LanJ). Un couple est également observé le 16/05/04 à Videix (87-LabB). Enfin, un mâle est également vu le 09/06/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-Pral).



Raphaël Bussière

Nombre de citations et effectifs du Tarier des prés par décade



Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*)

● C'est en mars que se font entendre les premiers chanteurs : le 02/03/03 à Peyrilhac (87-BouP) et le 06/03/04 à La Roche-l'Abeille (87-DumA).

Les données les plus précoces de nidification certaine nous parviennent le 01/04/03 de Flavignac avec un œuf dans le nid (87-PreP), et le 12/04/04 de Saint-Yrieix-la-Perche où des poussins sont nourris (87-CelJ). Si la plupart des jeunes ont quitté le nid au mois de juin (Cf. Tableau), une nichée tardive est signalée le 19/08/02 à Flavignac (87-PreP) avec deux poussins au nid.

Les mois de novembre à février ne représentent que 8% du total des citations, confirmant bien la faible présence de l'espèce au cours de l'hiver.

Les regroupements, les plus importants, sont constatés avec 14 ind. le 30/08/02 à Flavignac (87-PreP), 10 ind. le 20/08/03 à La Roche-l'Abeille (87-EyrO) et 10 ind. le 03/03/04 à Ussel (19-ThoF).

Décades	Construction du nid	Couvaison	Nourrissage des jeunes au nid	Jeunes à l'envol ou non émancipés
9	1	0	0	0
10	0	2	0	0
11	0	4	1	0
12	1	1	1	1
13	1	0	4	0
14	1	0	2	1
15	0	0	1	0
16	0	0	1	0
21	0	0	0	2
24	0	0	1	0
total	4	7	11	4

Nombre de citations du Tarier pâtre pour les différentes phases de la reproduction, selon les décades.

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)

Les prémices de la migration postnuptiale sont signalées le 25/08/02 avec un individu à Flavignac (87-Pral), et 2 autres le 15/08/03 sur la même commune (87-PreP). C'est également à Flavignac que sont vus les derniers migrateurs : le 16/10/02 (87-PreP) et le 15/11/03 (87-PreP). Cette commune concentre, à elle seule, 41% des citations de l'espèce ! 80% des citations proviennent de Haute-Vienne (Cf. Carte).


Les traquets reviennent le 31/03/03 à Flavignac (87-Pral) et le 27/03/04 à Dournazac (87-CouC).

Les groupes les plus nombreux concernent :

- 10 ind. le 18/09/03 à Châlus (87-CouC),
- 15 ind. le 15/04/04 sur la Zone Industrielle Nord de Limoges (87-MerC),
- 9 ind. le 24/04/04 à Châlus (87-CouC).

Aucun indice ne permet de soupçonner la nidification au cours des deux années couvertes par cette centrale.

Nombre de citations du Traquet motteux par commune en Limousin



Merle à plastron (*Turdus torquatus*)

● C'est lors des périodes de migration que l'on peut espérer observer l'espèce dans notre région.

Sur le chemin de ses quartiers d'hivernages, l'espèce sera contactée à 10 reprises en 2002, s'étalant du 30/08 à Ahun (23-RobS) au 20/10 à La Bazeuge (87-CavP), Davignac (19-VilO), Château-Chervix (87-CouR) et Saint-Gilles-les-Forêts (87-BosG). 2003 ne compte que 5 contacts, du 30/09 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK) au 19/10/03 à La Bazeuge (87-CavP) et Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS). La « bande » la plus nombreuse est vue le 01/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne où 15 individus sont posés sur un arbre (87-GueK).

Les données printanières sont moindres :

- 2 mâles et 1 femelle le 06/04/03 à Bonnefond (19-LabD),
- 1 mâle le 18/04/03 à Limoges (87-LabC),
- 1 ind. le 28/03/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-NutJ),
- 1 mâle le 04/04/04 à Lussat (23-VirA),
- 6 ind. le 09/04/04 à Soumans (23-NorT),
- 8 ind. le 12/04/04 à Tarnac (19-JuiR).


Merle noir (*Turdus merula*)

Les comptages de la migration d'automne permettent de repérer des oiseaux en migration active, avec notamment 16 individus le 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ) et 10 individus le 15/10/03 à Flavignac (87-PreP). Au cœur de l'hiver, les merles ne dédaignent pas les mangeoires, notons 28 oiseaux sont présents le 26/01/03 à Mautes (23-LerJ).

Les premiers chanteurs se risquent dès janvier : le 21/01/03 à Ambazac (87-LanJ) et le 10/01/04 à Limoges (87-MerC).

Ce ne sont pas moins de 103 citations en 2003 et 40 en 2004 qui relatent de la nidification du merle, la plupart étant fournies par Patrick Précigout et Raphaël Bussière. Les couvées découvertes renferment en moyenne 3 ou 4 œufs (Cf. Graphique), la littérature indiquant généralement des pontes de 3 à 5 œufs.

Trois cas d'albinisme sont recensés : le 28/01/03 à Limoges (87-DohR), le 14/05/03 à Saint-Méard (87-MorS) et le 23/12/03 à Limoges (87-VirA).



Grive litorne (*Turdus pilaris*)

Les premiers migrateurs postnuptiaux sont aperçus le 20/10/02 à Davignac (19-ViO) et le 15/10/03 à Ussel (19-VarC). L'hivernage étant régulier dans la région, la litorne sera contactée jusqu'au 12/04/03 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), et au 12/04/04 à Flavignac (87-PreP), les observations plus tardives entrant alors dans la fourchette de reproduction. Les troupes les plus importantes sont vues le 28/12/02 à Ambrugeat (19-AlbD), et le 01/03/03 à Meymac avec 300 individus (19-CelJ), puis le 19/02/04 à Lussat avec 463 individus (23-SauJ).

En période de reproduction, la litorne est présente en 2003 avec trois mentions : le 20/04/03 à Tarnac (19-SauJ), à Saint-Loup (23-DubG) ainsi que le 30/06/03 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV). Une observation tardive est notée le 25/04/04 à Flavignac avec un groupe de 26 individus (87-PreP).

Grive musicienne (*Turdus philomelos*)

Les vols migratoires vers le Sud sont d'abord notés à Flavignac le 21/09/02 (87-PreP) et le 25/09/03 (87-EyrO). Des grives, en migration active, sont repérées jusqu'au 30/10/02 et au 26/10/03 à Flavignac (87-PreP). Pas moins de 1 090 individus sont notés en migration pendant la journée du 13/10/03 à Gentioux-Pigerolles (23-AlbD), ce qui constitue l'effectif record.

Mis à part un chant entendu le 17/12/03 à Veyrac (87-ChaG), c'est un peu plus tard que les grives commencent à réciter leur répertoire : le 11/02/03 à Turenne (19-DauR) et le 06/01/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP). Il faut attendre le 07/06/03 à Turenne pour voir un individu afféré au nourrissage (19-CorP), et seulement le 25/04/04 à Nexon pour compter 4 poussins au nid (87-DumA).

Ses talents d'imitatrice sont repérés le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA) où l'engoulevent n'a qu'à bien se tenir !

Grive mauvis (*Turdus iliacus*)

Elle se montre en premier lieu le 13/10/02 à Bussière-Galant (87-DouA) et le 06/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-GueK). Présente durant tout l'hiver, elle sera observée jusqu'au 25/03/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP), et au 12/04/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Alors que la Centrale 1997-2000 mentionnait des troupes de 800 et 1 000 oiseaux, les plus grosses entre 2002 et 2004 atteignent seulement 170 oiseaux le 01/03/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et 200 individus le 22/02/04 à Folles (87-VinS). Notons enfin une observation assez remarquable de 30 individus le 30/06/03 à Saint-Bonnet-de-Bellac (87-NicV).

La carte ci-contre permet de cerner la répartition des deux «grives d'hiver» dans notre région.

Répartition des citations de «grives d'hiver» pendant la période considérée.



Grive draine (*Turdus viscivorus*)

● La migration débute le 09/10/02 à Moissannes avec 6 oiseaux (87-BarJ) et le 23/09/03 à Flavignac avec 18 oiseaux (87-PreP). Le comptage du 20/10/02 totalise 608 oiseaux en migration active en Limousin. C'est à l'automne que les premiers mâles chantent se font entendre le 12/11/02 à Montgibaud (19-MorS) et le 14/12/03 aux Cars (87-LanJ).

Quatre œufs sont trouvés dans un nid construit sur une armature métallique sous un pont le 05/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP), puis 6 poussins sont découverts le 24/04/04 à Nexon (87-DumA). La reproduction est démontrée jusqu'au 07/06/03 à Meymac par un transport de nourriture (19-Pral), et jusqu'au 27/06/04 à Saint-Auvent où un jeune n'est pas encore émancipé (87-LabB).

SYLVIIDÉS

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)

● L'essentiel des observations provient de Haute-Vienne. Quelques individus se manifestent par des chants postnuptiaux comme le 06/09/02 à Verneuil-sur-Vienne (87-NauD) et le 18/08/03 à Gorre (87-LabB). Des hivernants sont notés le 16/11/02 à Limoges (87-VirA) et le 02/02/03 à Cieux (87-LacB et al.), puis ensuite le 09/12/03 et le 03/01/04 à Flavignac avec un maximum de 3 individus (87-PreP).

Des chanteurs isolés sont localisés à partir du 18/04/03 et du 22/04/04 sur un même site à Verneuil-sur-Vienne (87-NauD), sans preuve de reproduction certaine. L'espèce semble s'être reproduite à l'étang de Lavaud où une famille est observée le 27/07/03 (87-SotJ).



Raphaël Bussiére

Locustelle tachetée (*Locustella naevia*)

- Aucune observation en migration postnuptiale.

Des chants annoncent le retour des migrateurs le 20/04/03 à Lussat (23-NorT), le 30/04/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et le 07/04/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-TeuJ). L'espèce est surtout contactée à l'étang de Landes où un nourrissage est observé le 15/06/04 (23-DupE). Des chanteurs sont présents sur d'autres sites favorables à la reproduction (tourbières, landes sèches), sans que celle-ci ne puisse cependant être relevée.

Phragmite des joncs (*Acrocephalus schoenobaenus*)

- Seuls quatre citations d'un (même ?) chanteur isolé entre le 12/04/04 et le 04/07/04 à l'étang de Landes (23-DupE et al).

Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*)

- En 2002, la migration postnuptiale échappe aux sépoliens. Une rousserolle, porteuse d'une bague du muséum de Madrid, est trouvée morte le 10/09/03 à Limoges (87-BouP).

Les retours se déroulent classiquement fin avril avec des chants entendus le 27/04/03 et le 21/04/04 à Lussat (23-DupE). La reproduction certaine n'est pas prouvée au cours de la période considérée. Ce sont l'étang de Landes et ses étangs satellites qui concentrent la majorité des citations.

Hypolaïs polyglotte (*Hippolais polyglotta*)

- Les dernières observations de l'espèce sont notées le 30/08/02 à Guéret (23-RobS) et le 22/08/03 à Lussat (23-DupE).

Les premiers chants se font entendre dès le 21/03/03 à Saint-Mathieu (87-LanJ) et le 16/04/04 à Saint-Laurent-les-Églises (87-EyrO) tandis que les arrivées se généralisent fin avril / début mai. Quelques rares indices de reproduction existent : un nid découvert le 24/05/04 à Naillat (23-BieJ), un transport de nourriture le 01/07/04 à Montrol-Sénard (87-LabB) et des jeunes nourris le 04/07/03 à Dournazac (87-EyrO).

Fauvette pitchou (*Sylvia undata*)

- L'espèce semble fréquenter en toute saison la butte de Frochet à Bussière-Boffy (87) et les landes de la Flotte et du Cluzeau à Château-Chervix et Meuzac (87). Un maximum de 3 individus est présent le 18/10/03 et 19/12/03 à Bussière-Boffy (87-DouA). Des hivernants sont également contactés à Cieux (87-DouA) et à Montrol-Sénard (87-DouA) pendant l'hiver 2002-2003.

Si les chants reprennent ensuite le 07/02/03 à Bussière-Boffy (87-DouA) et le 26/04/03 à Château-Chervix (87-SEPOL), ils se taisent au cours de la période de reproduction 2004. Un individu est signalé le 01/07/04 à La Roche-l'Abeille (87-CorA).

Fauvette grisette (*Sylvia communis*)

● Deux juvéniles en dispersion sont encore observés le 17/09/03 à la lande du Cluzeau à Meuzac (87-BarJ). La première grisette est notée le 06/04/04 à Limoges (87-EyrO) et les premiers chants sont entendus le 12/04/03 à Cieux (87-LacB) et le 12/04/04 à Flavignac (87-PreP). Les arrivées se généralisent ensuite fin avril / début mai sur l'ensemble de la région. Mais, ce sont les mâles chanteurs qui retiennent surtout l'attention des sépoliens. Par contre, peu d'indices de reproduction sont rapportés : un nid contenant 3 poussins le 21/05/03 à Bussière-Galant (87-CouC), un nourrissage le 29/05/04 à Videix (87-LabB) et une famille observée le 01/07/04 à Montrol-Sénard (87-LabB).



Etienne Dupoux

Fauvette des jardins (*Sylvia borin*)

● Espèce discrète quand elle ne chante pas. La dispersion et la migration postnuptiale passent inaperçue. Les derniers oiseaux sont observés le 25/08/02 à Guéret (23-RobS), ensuite d'autres le sont le 21/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ).

L'espèce est rarement de retour avant le 15 avril. Deux chanteurs précoces sont entendus le 05/04/03 et le 08/04/04, respectivement à Neuvic (19-DupE) et à Saint-Jean-Ligoure (87-EyrO). Elle est notée sur l'ensemble de la région mais reste difficile à trouver nicheuse. Néanmoins, un indice laisse à penser à une reproduction réussie, avec la trouvaille d'une coquille d'œuf le 14/06/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ). Une seule preuve certaine est mentionnée, celle d'un transport de nourriture le 30/06/03 à Saint-Martin-Château (23-FleL).

Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)

● Des jeunes volants sont encore notés le 19/08/02 à Voutezac (19-Chal) et le 20/08/03 à Magnac-Bourg (87-EyrO), au moment où les derniers chants sont entendus, deux familles sont observées le 03/09/02 à Saint-Priest-Taurion (87-EyrO). La plupart des individus quittent la région en septembre, laissant place à quelques hivernants fréquentant assidûment les mangeoires.

Les retours sont massifs en mars, avec les premiers chants le 05/03/02 à Voutezac (19-FacP) et à Oradour-Saint-Genest (87-CavP), puis le 13/03/04 à Peyrilhac (87-BouP), le 17/03/04 à Brive-la-Gaillarde (19-CorP) et enfin le 20/03/04 à Lussat (23-DupE). De nombreux indices de reproduction sont rapportés : un premier transport de matériaux observé le 28/03/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS), un premier nid garni de 3 œufs trouvé le 08/04/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP), un premier nourrissage observé le 25/05/04 à Flavignac (87-EyrO) et pour finir ces premiers jeunes volants le 07/06/03 à Limoges (87-EyrO).

Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*)

● Les premiers chants sont entendus à partir du 09/04/03 et du 10/04/04 sur l'Ouest de la région limousine, et seulement à partir de mi-mai en Creuse. L'espèce semble d'ailleurs fréquenter l'Ouest Haut-viennois et corrézien. L'espèce est trouvée nicheuse à Nespouls avec un nourrissage de jeunes le 07/06/03 (19-CorP).

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*)

● Les dernières mentions proviennent le 03/09/02 avec un mâle chanteur à Saint-Priest-Taurion (87-EyrO), et un autre le 14/07/03 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).

Les premiers chants se font entendre le 23/04/03 à Noailles (19-CorP) et à Sauviat-sur-Vige (87-BarJ), puis le 20/04/04 à Rochechouart (87-LabD). Il n'existe pas d'indices probants de reproduction, à l'exception de la découverte d'un nid contenant un poussin le 15/05/03 à Saint-Martin-Château (23-FleL).

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)

● L'espèce est notée régulièrement jusqu'en octobre, puis les derniers chants seront notés le 01/11/02 à Ambazac (87-LanJ) et le 02/10/03 à Meymac (19-DupE).

Ensuite, les observations hivernales sont éparées :

- 1 ind. le 30/12/02 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- 1 ind. le 23/11/03 à l'étang de Landes (23-DupE),
- 1 ind. le 30/12/03 sur les bords de Vienne à Limoges (87-GauR).

Les effectifs augmentent à nouveau fin février, et les premiers chants sont notés le 04/03/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP) et le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA). Le chant est le comportement le plus fréquemment cité. Les indices de reproduction certaine sont en revanche plus rares : un transport de nourriture le 23/05/03 à Lestards (19-RogJ), et des jeunes nourris le 24/05/03 à Naillat (23-BieJ).

Pouillot véloce ibérique (*Phylloscopus collybita brehmii*)

● Un individu est repéré par son chant une première fois le 31/05/04 (DouA et al.), et le sera pour la dernière fois le 02/06/04 à Tarnac (19-EyrO).

Roitelet huppé (*Regulus regulus*)

● On ne constate pas de groupes internuptiaux très importants : un maximum de 6 individus le 02/09/02 à Châteauneuf-la-Forêt (87-LanJ). Un groupe de 10 migrateurs est observé le 19/10/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-GenG). Ensuite, l'espèce est observée çà et là en hiver, et devient plus active en février. Un couple se poursuit le 04/02/04 à Merlines (19-DouA). Les premiers chanteurs sont entendus le 02/02/03 à Limoges (87-NedS) et le 23/03/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Pas facile de découvrir l'espèce nicheuse : des jeunes volants sont observés le 29/07/03 à Ambazac (87-LanJ) et... c'est tout !

Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*)

● Le dernier chant retentit le 30/10/02 à Limoges (87-EyrO) et le 15/09/03 à Saint-Jean-Ligoure (87-VirA). Puis, l'espèce vocalise à nouveau le 06/02/03 à Limoges (87-DumA), et seulement le 21/03/04 à Dournazac (87-EyrO). Il n'y a pas de reproduction certaine prouvée, toutefois 4 données font l'objet d'un statut probable :

- 1 couple le 16/05/04 à Limoges (87-VirA),
- 2 chanteurs simultanés le 26/05/04 à Eymoutiers (87-RogJ),
- 2 chanteurs simultanés le 28/05/04 à Janaillat (23-RogJ),
- 1 couple le 25/07/04 à Sainte-Fortunade (19-SchL).



Raphaël Bussière

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Les dernières observations sont notées le 13/09/02 à Guéret (23-RobS) et le 21/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ). Les mentions printanières les plus précoces sont relevées le 20/04/03 en Creuse (BieJ) et le 01/05/04 en Haute-Vienne (GauR).

Au cours de la période de reproduction, un couple est observé le 04/06/04 à Compreignac (87-SotJ) et un nid est découvert le 06/06/04 à Rosiers-de-Juillac (19-GauR).

Les derniers relevés de l'espèce en Limousin font état de 4 individus le 11/08/03 à Moissannes (87-BarJ) et de 7 individus le 25/08/03 à Saint-Loup (23-DubG).

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)

Les premiers contacts avec l'espèce en période de migration postnuptiale se font à partir de la mi-août, alors que les dernières mentions datent de fin septembre.

- 7 ind. le 19/08/02 à Voutezac (19-ChaL),
- 1 ind. le 03/09/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 1 ind. le 15/09/02 à Ayen (19-FauB),
- 4 ind. le 25/08/03 à Saint-Loup (23-DubG),
- 4 ind. le 06/09/03 à Limoges (87-VirA),
- 1 ind. le 29/09/03 à Flavignac (87-EyrO),
- 1 ind. le 14/08/04 à Oradour-Saint-Genest (87-CavP).

À noter qu'un individu est retrouvé mort au pied d'une baie vitrée le 04/09/03 à Limoges (87-VirA).

Quant à la migration prénuptiale, la majorité des observations relevées sont concentrées sur les mois d'avril et mai.

- 1 ind. le 14/04/03 à Chameyrat (19-CorP),
- 1 ind. le 08/04/04 à Objat (19-LafJ),
- 2 ind. en plumage nuptial le 01/05/04 à Fontanières (23-DupE),
- 1 ind. le 02/05/04 à Maussac (19-ChaG).

Mésange à longue queue (*Aegithalos caudatus*)

● Cette espèce grégaire (24 % des citations supérieures à 5 individus) présente des rassemblements postnuptiaux parfois importants, notamment au mois de juin :

- 18 ind. le 11/06/03 à Limoges (87-EyrO),
- 20 ind. le 20/06/04 à Azérables (87-MerC),
- 35 ind. le 16/06/03 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).

Les observations de troupes, de plus de 15 oiseaux, ont surtout lieu en décembre et janvier, les plus remarquables étant :

- 24 ind. le 30/12/02 à Videix (87-BusR),
- 30 ind. le 07/01/03 à Azat-le-Ris (87-DouA),
- 23 ind. le 14/01/04 à Saillat-sur-Vienne (87-HubP).

Dès février, les groupes se dispersent et les premières constructions de nids sont notées début mars. C'est le cas le 10/03/03 à Aix-sur-Vienne où un adulte transporte de la mousse dans le bec (87-PreP). Les premières pontes ne tardent pas. Ainsi, deux œufs sont découverts le 28/03/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Les premiers poussins sont vus le 25/04/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR), au nombre de neuf, dans un nid situé dans un roncier à 1,4 m du sol. Avril et mai marquent la pleine saison de la reproduction sur l'ensemble du Limousin. Les nids découverts sont souvent situés dans la strate arbustive entre 1,10 m et 2,30 m de hauteur. Chèvrefeuille, genévrier, ronce, chêne, houx, genêt et lierre servent régulièrement de support. Les premiers jeunes volants (8 ind.) sont observés le 23/05/03 à Fontanières (23-DupE).

PARIDÉS

Mésange nonnette (*Parus palustris*)

● Sédentaire et casanière, l'espèce se montre rarement en grand nombre, et ce, même aux mangeoires qu'elle fréquente souvent. Ainsi, 93 % des observations de la période concernent 1 ou 2 individus.

Les premiers chants retentissent dès les mois de décembre et janvier :

- 2 mâles chanteurs le 23/01/04 à Bersac-sur-Rivalier (87-LabG),
- 1 mâle chanteur le 25/01/03 à Flavignac (87-LabB).

Il existe peu de données concernant la nidification, hormis 2 oiseaux transportant des matériaux le 29/03/04 à Vayres (87-LanJ), et l'observation d'une famille de 10 individus le 21/08/02 à La Souterraine (23-LabG). À noter aussi la capture, lors d'une session de baguage, d'une femelle adulte présentant une plaque incubatrice à Saint-Léger-la-Montagne (87-SelP).

Mésange boréale (*Parus montanus*)

● Seulement 20 données concernant cette espèce, et aucune reproduction n'est constatée durant la période considérée.

Presque toutes les observations ont été faites entre 410 et 856 mètres d'altitude au sein du Massif des Agriers (19), des Monts de Guéret (23), et du Plateau de Millevaches (au sens large). Les Monts d'Ambazac sont également fréquentés par l'espèce avec deux observations :

- 1 ind. le 15/06/03 à Compreignac (87-SotJ),
- 1 ind. le 29/02/04 à Compreignac (87-SotJ).

Un mâle chanteur est contacté le 02/05/04 à Lussat (23-DupE), ce qui fournit la seule donnée «en plaine» (380 m d'altitude). À noter, deux mâles chantant simultanément le 25/02/04 à Treignac (19-JuiR).

Mésange huppée (*Parus cristatus*)

● Cette centrale n'offre pas de nouveauté quant à la répartition de l'espèce en Limousin. La seule preuve de nidification, au cours de la période, est apportée par 1 individu transportant de la nourriture le 31/05/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ).



Pierre Marthon

Mésange noire (*Parus ater*)

● L'essentiel des données proviennent des reliefs de la région (montagne limousine, Monts de Guéret, Monts d'Ambazac...). Une seule note fournit une preuve de nidification. Il s'agit de la découverte de coquilles d'œufs le 09/12/03 à Cussac (87-DouA). Également à relever, deux individus recherchant une cavité le 15/03/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ).

Le chant le plus précoce est entendu le 07/02/04 à Fontanières (23-DupE), quant au plus tardif, il est noté le 26/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-EyrO).

Le mouvement postnuptial est signalé par deux individus en migration active observés le 20/10/02 à Davignac (19-ViLO).

Le 25/12/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ), 12 mésanges sont perchées en groupe sur un résineux, constituant le plus gros groupe hivernal observé sur cette période de 2 ans.

Mésange bleue (*Parus caeruleus*)

● Elle est présente dans l'ensemble de la région limousine tout au long de l'année. De petits mouvements migratoires postnuptiaux sont observés le 20/10/02 à Davignac avec 9 individus (19-ViO) et 2 autres, le même jour, à Allasac (19-CorP).

Le premier chant est entendu le 04/01/04 à Limoges (87-MorS), et le dernier date du 02/10/03 à Meymac (19-DupE).

Un individu est vu transportant des matériaux le 25/03/03 à Vars-sur-Roseix (19-CreD) et la première ponte, comptant 2 œufs, est contrôlée le 14/04/03 à Meymac (19-AlbD). Par ailleurs, le 24/04/03, 9 poussins sont dénombrés dans un nichoir à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). Les premiers envols sont ensuite notés début mai. D'abord un jeune quitte le nid le 06/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ) et 12 autres s'envolent d'un nichoir le 12/05/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

L'hiver, la Mésange bleue fait parfois preuve de gréganisme, comme le montre l'observation d'un groupe de 23 individus posés dans des arbres le 15/02/04 à Couzeix (87-LanJ).

Mésange charbonnière (*Parus major*)

● Présente toute l'année, cette espèce commune se fait voir et entendre régulièrement au fil des mois, comme ce mâle qui prospecte une cavité le 06/02/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Sur la période considérée, la première construction de nid a été observée le 24/03/03 à Flavignac (87-PreP) dans un nichoir. On note, comme à l'accoutumée, l'utilisation d'infractuosités variées pour l'édification du nid : mâts de candélabres, mobilier urbain, boîtes aux lettres, trous dans les murs, bidons... La première ponte, comptant 5 œufs, est contrôlée le 29/03/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). L'espèce peut être prolifique, comme le montrent les 11 poussins découverts le 16/05/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP), ou encore l'envol de 10 juvéniles d'un nichoir le 20/05/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Des mouvements migratoires postnuptiaux sont observés le 20/10/03 à Davignac (19-ViO) où 61 individus seront comptés sur une demi-journée d'observation. C'est également le cas à Jalesches (23-NauP) avec 15 oiseaux comptés en 1h30 d'observations.

L'hiver venu, la Mésange charbonnière forme des petits groupes, tels ces 11 individus posés sur une haie le 21/01/04 à Châtelus-le-Marcheix (23-RogJ).

Sittelle torchepot (*Sitta europaea*)

● Peu discrète, cette espèce est visible toute l'année.

Le premier indice de reproduction nous parvient de Saint-Sylvestre (87-LanJ) le 16/03/03, lorsqu'un individu entre dans une cavité avec des matériaux dans le bec. Une ponte de 3 œufs est ensuite contrôlée le 15/04/03 à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Le premier poussin est signalé le 24/04/04 à Nexon (87-DumA). Un couple a utilisé un nichoir pour élever sa nichée à Chaillac-sur-Vienne, et le 01/05/04, 5 jeunes duveteux sont présents (87-BusR). Ils prendront par la suite leur envol le 15/05/04 (BusR). D'autres jeunes se font encore nourrir le 30/08/02 à Saint-Sornin-Leulac (87-LabG).

TICHODROMADIDÉS

Tichodrome échelette (*Tichodroma muraria*)

● Toutes les observations concernent des individus isolés en hivernage. Le plus précoce est noté le 26/10/03 à Bort-les-Orgues (19-DouB), et le plus tardif le 13/04/04 à Tarnac (19-JuiR).

La Corrèze est le département le plus fréquenté par l'espèce, avec des observations sur 9 communes différentes : Bort-les-Orgues (19-PinD, DouB), Châteaux (19-CorP, ChJm, DauR, FauB, RenD), Ligniac (19-ThuB), Lissac-sur-Couze (19-CorP), Saint-Robert (19-CreD, FacP, CelJ, GauR), Soursac (19-BarJ), Tarnac (19-JuiR), Tulle (19-Blal), Turenne (19-DauR).

La Creuse apporte seulement deux données, concernant certainement un même individu observé à Aubusson (23-NutJ) le 27/03/04, puis 5 jours plus tard au même endroit.

En Haute-Vienne, seule la cathédrale de Limoges fournit des données : 1 ind. présent le 07/12/03 (87-TulY), puis du 08/02/04 (87-ChaG) au 18/03/04 (87-MerC). De nombreuses observations, toujours sur cet édifice, laissent à penser là encore, qu'il s'agit d'un seul individu.



Raphaël Bussière

CERTHIIDÉS

Grimpereau des bois (*Certhia familiaris*)

● Seulement 7 données transmises dont 2 provenant de Creuse pour cette espèce discrète et présente uniquement au-dessus de 450 m d'altitude :

- 1 ind. le 11/11/02 à Liginiaç (19-ThuB), altitude 659 m,
- 1 ind. le 05/06/03 à Viam (19-HubP), altitude 700 m,
- 1 ind. le 03/03/04 à Eygurande (19-DouA), altitude 850 m,
- 2 ind. le 04/03/04 à Saint-Martin-la-Méanne (19-NorT), altitude 500 m,
- 1 ind. le 17/03/04 à Sardent (23-NorT), altitude 513 m,
- 1 ind. le 19/03/04 à Saint-Hilaire-le-Château (23-NorT), altitude 450 m,
- 1 ind. le 02/05/04 à Soursac (19-NorT), altitude 495 m

Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*)

● Omniprésent, il se fait entendre tôt dans la saison, et les premiers chants sont notés dès le 14/01/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS) et à Azat-le-Ris (87-EyrO).

Puis deux individus sont observés paradant le 13/03/03 à Dournazac (87-BouM). Le 03/04/03, un nichoir est occupé à Saint-Martin-le-Vieux (87-PreP). Ensuite à Saint-Germain-les-Belles, un adulte nourrit des jeunes au nid le 26/05/03 (87-MorS). Le dernier indice de nidification de l'espèce est donné le 01/07/03 par l'observation de deux jeunes volants à Limoges (87-EyrO). Durant l'été, le grimpereau est contacté en petit nombre dans l'ensemble de la région. La fin des chants est marquée par un mâle chanteur entendu le 29/09/02 à Saint-Junien (87-DouA). En octobre, novembre et décembre, l'espèce reste silencieuse.

ORIOLIDÉS

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*)

● Voici quelques données concernant la reproduction de cette espèce :

- 1 jeune volant le 09/06/03 à Dournazac (87-LanJ),
- 1 femelle transportant de la nourriture le 28/06/03 à Séreilhac (87-CouC),
- 3 jeunes volants le 20/07/03 à Limoges (87-VirA),
- 1 famille observée le 27/07/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS),

- 1 famille observée le 28/07/03 à Panazol (87-CelJ),
- 1 famille observée le 06/08/03 à Mansac (19-GauR),
- 3 jeunes volants le 08/08/03 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- 4 jeunes volants le 03/07/04 à Cieux (97-BouH),
- 3 juvéniles vus le 18/07/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-LanJ).

Les premiers chants sont entendus le 15/04/03 lors d'un STOC-EPS en Corrèze (19-FacP), et le 06/04/04 à Dampniat (19-LecE). Pour les dernières mentions, on retiendra : 1 ind. le 22/08/03 à La Roche-l'Abeille (87-NedS) et 1 ind. le 11/08/04 à Saint-Panthaléon-de-Larche (19-GauR).

À noter la donnée originale d'un mâle trouvé mort le 15/05/04 à Châlus (87-CouC), avec une énorme tique sur la gorge.

LANIIDÉS

Pie-grièche écorcheur (*Lanius collurio*)

Les dernières données de 2002 sont des preuves de nidification certaine, avec des juvéniles observés le 31/08/02 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP) et le 04/09/02 à Flavignac (87-PreP). Puis, il faudra ensuite attendre fin avril pour apercevoir les premiers mâles. La donnée la plus précoce nous parvient le 20/04/03 de Saint-Vaury (23-BieJ). Le premier nid garni de 5 poussins est découvert le 20/05/03 à Bussière-Galant (87-CouC), bien que les indices de reproduction soient plus fréquemment observés au mois de juillet. 3 juvéniles sont ainsi notés le 29/07/03 à Ambazac (87-LanJ), et il s'agit du nombre maximal observé. La dernière mention de l'espèce concerne un juvénile, présent le 12/09/03 à Flavignac (87-PreP).

Le retour prénuptial est noté en Creuse le 25/04/04 lors d'un point d'écoute EPS (23-Cold). Le 17/05/04, le premier indice de nidification est signalé à Flavignac (87-PreP), avec un nid en construction à 60 cm de hauteur dans un roncier, et un transport de nourriture est constaté le 02/06/04 à Lussat (23-RogJ). Le premier jeune volant est observé le 02/07/04 à La-Meyze (87-PreP), et 4 autres sont découverts le 25/07/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

L'espèce est notée pour la dernière fois le 13/08/04 à Bessines-sur-Gartempe (87-MerC), avec 3 individus.

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

● L'espèce est observée en hivernage en 2002 et 2003, en Creuse et en Corrèze, et seulement sur deux communes de Haute-Vienne, à Folles (87-VinS) et à Flavignac (87-PreP), où elle fait halte.


Pour ce qui est de la nidification, peu de preuves sont observées. Un couple est signalé le 31/05/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ), un autre le 13/06/04 à Saint-Quentin-la-Chabanne (23-LaqE) et un dernier le 03/07/04 à Millevaches (19-LaqE).

Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)

● La dernière mention de l'espèce pour 2002 concerne 2 mâles et 1 femelle contactés le 31/08/02 à Flavignac (87-Pral). Sur cette même commune, le retour printanier est observé le 27/04/03 (87-PreP), et toujours sur ce site, un couple a fait l'objet d'un suivi en période de nidification (87-PreP et Pral). Ainsi, la construction d'un nid est notée le 03/05/03, dans un chêne à 6,8 mètres de hauteur, avec ensuite la femelle couvant le 10/05/03, et 5 juvéniles sont vus le 12/07/03. La dernière mention estivale de l'espèce date du 17/08/03 à Flavignac (87-Pral).

En 2004, le retour du premier migrateur est noté le 27/04/04 à Lupersat (23-YveJ). Un transport de matériaux signale la nidification le 25/05/04 à Flavignac (87-PreP), puis c'est ensuite un transport de nourriture le 04/07/04 à Budelière (23-BruB). Le nombre maximal de jeunes contactés cette année là est de 3 à Flavignac (87-PreP et Pral). La dernière observation concerne un nourrissage de 2 jeunes le 15/08/04 à Flavignac (87-Pral).

Carte de répartition de la Pie-grièche à tête rousse en Limousin du 16/08/02 au 15/08/04




Geai des chênes (*Garrulus glandarius*)

83 observateurs ont noté cette espèce dans leur carnet. On remarque que la reproduction probable est notée sur 30 citations tout de même, mais seulement 4 prouvent la reproduction de manière certaine !

- nourrissage de jeunes par le couple le 06/07/03 à Bort-les-Orgues (19-DouA),
- nid découvert le 06/05/04 à Saint-Agnant-de-Versillat (23-BieJ),
- couvaison le 05/06/04 à Lussat (23-MorS),
- transport de nourriture le 06/07/04 à Ambazac (87-LanJ).

Une observation de migration active est réalisée d'un groupe de 20 individus le 08/12/03 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Enfin, 4 mentions concernent des oiseaux bagués en 2003 à la tourbière des Dagues dans le cadre du protocole «STOC Capture» du CRBPO/MNHN de Paris (87-TeuJ et Selp). Le mois d'avril représente 25% des données collectées, liées aux points d'écoute du protocole «STOC-EPS».

Nombres de citations du Geai des chênes par décade



Pie bavarde (*Pica pica*)

● Au cours de la période considérée, l'espèce peut se rassembler en dortoir, le plus important pour l'année 2003 étant observé le 04/03 à Moissannes, avec 50 individus (87-BarJ). Pour 2004, une cinquantaine d'oiseaux en groupe sont présents le 21/02 à Limoges (87-ChaJ). En ce qui concerne la nidification, elle débute au mois février pour l'année 2003 avec un transport de matériaux le 09/02/03 à Nexon (87-



Raphaël Bussière

DumA). Il faut attendre ensuite le 04/03/03 pour observer un nid occupé à Saint-Sornin-la-Marche (87-DouA). Le premier juvénile est noté le 29/05/03 à Ambazac (87-LanJ), et les derniers de l'année sont vus le 23/06/03 à Limoges (87-LanJ). Pour l'année 2004, la nidification débute au mois de janvier avec des constructions de nids, d'une part à Limoges le 14/01/04 (87-EyrG) et d'autre part le 22/01/04 à Aixe-sur-Vienne (87-PreP). Pour cette année là, une donnée de couvaison est citée le 28/03/04 à Verneuil-sur-Vienne (87-ThoF). Le premier jeune volant est enregistré le 10/06/04 à Ambazac (87-LanJ), et le dernier est mentionné le 05/07/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Un juvénile est noté plus tard le 25/07/04 à Ambazac (87-LanJ). Signalons le cas de cette prédation un peu particulière avec la donnée du 03/03/03 à Limoges, d'une Pie bavarde déplumant un mâle de Tarin des aulnes (87-EyrO).

Choucas des tours (*Corvus monedula*)

● L'espèce se reproduit sur l'ensemble du Limousin. Au cours de la période hivernale, le Choucas des tours a tendance à se rassembler en dortoir, le plus grand relevé étant le 02/08/03 à Rochechouart avec 400 individus (87-LabB).

La période de nidification débute au mois de mars, le 19/03/03, avec un transport de matériaux à Ambazac (87-LanJ). La construction de nid se poursuit durant tous le mois de mars et jusqu'en avril, avec de très nombreuses données de transports de matériaux. À la fin avril et pendant le mois de mai, les premiers jeunes sont détectés : nourrissage le 04/05/03 à Limoges (87-EyrO) et nids garnis le 25/04/04 à Segonzac (19-GauR). L'espèce est nicheuse certaine sur 5 communes de Haute-Vienne (Ambazac, Bellac, Le Dorat, Limoges et Rochechouart), 3 communes corréziennes (Chamberet, Saint-Robert et Segonzac), en revanche aucune donnée ne provient de Creuse.

Corbeau freux (*Corvus frugilegus*)

● Plus de 200 citations sont enregistrées dans la base. Elles concernent des individus migrateurs, nicheurs et hivernants. 29 observateurs ont mentionné l'espèce dans leur carnet.

Le plus gros groupe hivernant est noté à Lagraulière le 01/02/03 avec 200 individus (19-ChJm).

34 citations concernent des observations d'oiseaux en migration active, avec des premiers vols signalés autour du 20 octobre pour 2003 et 2004.

En période de reproduction, l'espèce niche majoritairement en Haute-Vienne par rapport en Creuse, et aucune donnée ne parvient de Corrèze.

Ainsi en Haute-Vienne, 5 communes accueillent l'espèce :

- Bellac, avec 4 colonies comptabilisant 32 nids occupés en 2003,
- Blanzac, avec 2 colonies comptabilisant 24 nids occupés en 2003,
- Droux, avec 1 colonie comptabilisant 20 nids occupés en 2003,
- Le Dorat, avec 7 colonies comptabilisant 254 nids occupés en 2003,
- Limoges, avec 5 colonies comptabilisant 17 nids occupés en 2003.

En Creuse, seule une colonie a été repérée en 2004 le 14/04 à La Souterraine, avec 14 nids occupés (RogJ).

Corneille noire (*Corvus corone*)

● Au cours de l'hivernage, l'espèce peut parfois se rassembler. Les plus gros effectifs sont notés au mois de janvier, avec 500 individus présents le 07/01/03 à Azat-le-Ris (87-DouA) et 500 autres le 27/01/04 à Ligniac (87-BarJ). En 2003, la nidification débute avec l'observation d'une femelle au nid le 24/02/03 à Lussac-les-Église (87-LanJ), puis se poursuit avec une construction de nid le 01/03/03 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP). Le dernier indice de reproduction pour cette année est noté le 19/05/03 à Limoges, avec un transport de nourriture (87-LanJ).

En 2004, les premiers signes d'un comportement de reproduction se manifestent le 05/02/04 à Bort-les-Orgues par l'observation d'un transport de matériaux (19-DouA). Le premier nid en construction est signalé le 04/03/04 à Isle (87-GauR). L'année se clôt avec cet ultime indice certain le 16/05/04 à Videix d'un adulte en position de couveur (87-LabB).

Selon plusieurs données, la Corneille noire se querelle fréquemment avec d'autres espèces, la plus régulière étant la Buse variable (11 données) mais aussi avec d'autres espèces moins communes, comme cette note du 22/05/03 à Saint-Priest-Taurion, l'opposant à un Grand corbeau (87-EyrO).

Retenons également une observation assez particulière, celle d'une Corneille noire qui va dérober un oeuf dans un nid de Héron cendré le 20/03/03 à Mézières-sur-Issoire (87-DouA). Enfin, deux cas insolites sont rapportés faisant état d'une corneille mangeant un poisson le 25/07/03 à Lussat (23-VirA) et le 09/09/03 à Limoges (87-ArnL).

Grand Corbeau (*Corvus corax*)

● Présent sur l'ensemble du Limousin, il semble cependant se cantonner en période de nidification aux vallées encaissées et aux carrières. La reproduction en 2003 débute fin février avec un transport de matériaux le 24/02/03 à Aubusson (23-ThiP). Puis début mars, un adulte est observé en position de couveur sur un nid le 09/03/03 à Saint-Priest-Taurion (87-MerC). Cependant, il faut attendre la fin du mois pour voir les premiers nourrissages, comme celui du 30/03/03 à Saint-Priest-Taurion (87-MerC). Des jeunes duveteux peuvent être ainsi observés au nid, comme le 19/04/03 à Saint-Priest-Taurion, et sont toujours présents le 27/04/03 (87-MerC). En 2004, un couple a niché à Turenne comme le montre cette mention du 23/02/04 d'un corbeau sur le nid (19-DauR). Début mars, un transport de matériaux est assuré par un adulte tandis que l'autre est en couaison le 01/03/04 à Aubusson (23-ThiP). Ce n'est que fin avril où les premiers poussins sont observés le 26/04/04 à Compreignac, avec un nid garni de 5 (87-SotJ), et ce pratiquement pendant un mois, puisqu'ils y sont encore présents au nid le 22/05/04 (87-SotJ).

STURNIDÉS

Etourneau sansonnet (*Sturnus vulgaris*)

● Des oiseaux sont observés en migration du 21/09/02 à Ayen (19-FauB) au 11/11/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA), puis du 12/10/03 à Guéret (23-RobS) au 04/11/03 à Davignac (19-RogJ).

Les plus grands rassemblements sont notés l'hiver :

- 3 000 ind. le 19/12/02 à Saint-Hilaire-les-Places (87-LabB),
- 5 210 ind. le 08/02/03 à Flavignac (87-Pral),
- 2 000 ind. le 13/03/04 à Flavignac (87-PreP).

Et c'est au cours de cette saison que se font entendre les premiers chants le 04/02/03 à Limoges (87-BarG) ou encore le 11/01/04 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ).

Des nourrissages de jeunes sont observés le 25/04/03 à Limoges (87-EyrO), et le 15/04/04 à Naves (19-ChMa) où le nid se trouve dans un châtaignier. Ces deux mentions de nidification sont les plus précoces chez l'espèce au cours de la période considérée. Enfin, une nichée de six poussins dans un nichoir est vue le 01/05/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Le rassemblement postnuptial le plus important dénombre 800 oiseaux le 22/08/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).



PASSÉRIDÉS

Moineau domestique (*Passer domesticus*)

● L'espèce est toujours aussi régulièrement notée, toute l'année, et dans toute la région. Le rassemblement le plus important compte 120 individus observés le 17/07/03 à Flavignac (87-Pral). Seulement 24 cas de reproduction certaine sont prouvés pour cette espèce commune.

En 2003, le premier transport de nourriture est noté le 11/05/03 à Larche (19-GauR), et les 2 premiers jeunes volants sont observés le 13/05/03 à Limoges (87-EyrO), tandis qu'un poussin est trouvé mort le 29/07/03 à Ambazac (87-LanJ).

En 2004, le premier nid occupé est découvert le 14/04/04 à Ambazac, et le dernier nid garni est trouvé le 29/06/04 à Ambazac (87-LanJ).



Etienne Dupoux

Moineau friquet (*Passer montanus*)

● Le Moineau friquet, moins anthropophile que son cousin domestique, fournit peu de citations.

On note malgré tout, quelques troupes relativement importantes en hiver et au printemps :

- 30 ind. observés les 06/01/03, 13/01/03 et le 29/02/04 à Flavignac (87-Pral),
- 20 ind. notés le 08/04/03 à Saint-Aulaire (19-CreD).

4 reproductions sont par ailleurs mentionnées certaines :

- un transport de nourriture le 05/04/03 à Flavignac (87-Pral),
- 2 couples avec des jeunes présents au nid le 01/06/04 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR),
- des jeunes volants le 04/07/04 à Sionac (19-GauR),
- un nourrissage de 2 jeunes assuré par un adulte le 25/07/04 à Maisonnais-sur-Tardoire (87-RayA).

La reproduction de l'espèce est probable sur 3 communes pour l'ensemble de la région limousine abritent : Limoges (87-EyrO), Saint-Pantaléon-de-Larche (87-Pral) et Ségonzac (19-GauR).

À noter également que sur les 80 citations de l'espèce, une seule se situe en Creuse avec un individu observé le 26/02/04 à Fontanières (23-DupE).

Moineau soulcie (*Petronia petronia*)

● Ce passéridé inféodé aux milieux chauds et secs ne trouve son bonheur qu'en Basse Corrèze. Il fournit 5 citations sur trois communes :

- Saint-Robert, avec 1 ind. le 25/05/03 (19-GauR),
- Chauffour-sur-Vell, avec 2 ind. le 20/06/03, 1 nid garni trouvé le 20/06/03 et 8 ind. le 17/07/03 (19-MouE et RogJ),
- Végennes, avec 1 ind. le 06/07/03 (19-GauR).

Il n'existe pas de mention de l'espèce pour l'année 2004.

Pinson des arbres (*Fringilla coelebs*)

Sur la période considérée, les premiers vols migratoires sont signalés le 30/09/02 à Ambrugeat (19-AlbD), et le 21/09/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-LanJ). Un pic de migration est relevé les 08 et 09/10/02 sur les sites de Gentioux-Pigerolles et Féniers (23-AlbD), où plus de 13 000 individus sont comptabilisés en deux jours. Plusieurs milliers d'autres oiseaux sont dénombrés en migration active à Bussière-Boffy (87-DouA), Flavignac (87-PreP) et Saint-Sulpice-les-Bois (23-AlbD). Les passages les plus importants ayant lieu les 2e et 3e semaines d'octobre.

Le pinson côtoie par ailleurs d'autres espèces, et c'est ainsi que l'on note : 9 ind. le 17/10/02 à Cessaguet (87-PreP) et 19 ind. le 20/10/02 à Davignac (19-VilO) en compagnie de Vanneaux huppés, 16 ind. avec des Étourneaux sansonnets le 20/10/03 à Bussière-Boffy (87-DouA).

Les premiers chants sont entendus le 09/02/03 à Azat-le-Ris (87-LabB) et le 15/02/04 à Couzeix (87-LanJ). Le dernier chant entendu est noté le 05/09/03 à Berneuil (87-EyrO).

Les prémices de la nidification sont constatées en avril. Lorsqu'à Aix-sur-Vienne un couple construit activement son nid le 04/04/03 et dans lequel 5 œufs sont déposés le 24/04/03 (87-PreP). À Flavignac ensuite, un nid contenant 6 œufs est découvert le 02/05/03 (87-PreP), puis un autre à Lupersat avec 5 œufs le 28/05/04 et au 09/06/04, 2 oisillons auront éclos (23-ColD).

Pinson du Nord (*Fringilla montifringilla*)

Il est présent en Limousin dès le mois d'octobre. Les premiers arrivants sont observés le 06/10/02 à Moissannes (87-BarJ) puis le 11/10/03 à Flavignac (87-EyrO). Le plus gros vol en migration active est alors signalé à Rhillac-Lastours le 08/11/02 avec 100 individus (87-LabB).

Selon les conditions climatiques, l'observation d'oiseaux hivernants est souvent unitaire ou par petits groupes, mais peut-être constatée en gros rassemblements :

- 500 ind. le 25/12/03 à Fontanières (23-DupE),
- 200 ind. le 18/01/04 à Videix (87-SotJ).

La migration vers les zones de reproduction scandinave débute au mois de mars : plusieurs vols sont observés le 09/03/03 à Bussière-Boffy (87-DouA), et les derniers migrateurs sont signalés le 25/04/04 en Corrèze (19-GauR).



Raphaël Bussière

Serin cini (*Serinus serinus*)

● L'espèce commence à quitter nos régions relativement tôt, au cours de la deuxième quinzaine de septembre. Des migrateurs sont ainsi signalés le 26/09/03 à Flavignac (87-PreP), et le maximum observé est de 10 le 20/10/02 à La Bazeuge (87-CavP).

Les retours sont signalés par un premier chant entendu le 11/03/03 à Saint-Yrieix-la-Perche (87-CelJ), le dernier étant noté le 25/07/03 à Limoges (87-VirA).

Bien que plusieurs couples aient été vus au cours de cette période, très peu de données de reproduction certaine ont été répertoriées. Une preuve certaine est constatée le 03/07/03 aux Cars (87-CouC) et une autre le 05/07/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)

● Il est présent en Limousin toute l'année, et les migrateurs viennent grossir les effectifs locaux dès la première quinzaine d'octobre. Toutefois, les premières arrivées sont signalées au 11/08/03 à Moissannes (87-BarJ). Au cours de l'hivernage, de gros rassemblements se constituent, comme celui noté à Azat-le-Ris avec 1 000 individus le 03/01/04 (87-SotJ). Au mois de mars, la migration prénuptiale débute ensuite le 09/03/03 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS). Plus précoces, les premiers chants sont entendus dès le mois de février, précisément le 10/02/03 à Ambazac (87-LanJ). Les parades nuptiales débutent un peu plus tard, comme celle constatée le 26/03/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). Le premier transport de nourriture est observé le 20/04/03 à Nexon (87-DumA), puis 5 jeunes volants notés le 26/05/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS). On retiendra la donnée, la plus tardive répertoriée, de la construction de ce nid le 21/06/04 à Aix-sur-Vienne (87-PreP).

Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*)

● Les premiers migrateurs sont signalés dès la fin de septembre avec 3 individus le 06/10/02 et 2 autres le 27/09/03 à Flavignac (87-PreP). Le passage se termine le 24/11/02 à Flavignac où 9 individus sont signalés (87-PreP), et le 11/11/03 à Saint-Léger-la-Montagne avec 2 individus (87-DouA).

L'hivernage donne lieu à de gros rassemblements pouvant atteindre 2 000 oiseaux, comme à Bellac le 16/02/03 (87-ChaL), bien que la plupart des citations dénombrent moins de 100 individus.

La dispersion des groupes hivernants, due à la migration prénuptiale, se produit début mars et se poursuit en avril :

- 8 ind. le 08/03/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 14/03/03 à Bussière-Boffy (87-DouA).
- 1 ind. le 06/04/03 à Flavignac (87-PreP),
- 3 ind. le 01/04/04 à Saint-Dizier-Leyrenne (23-RogJ).

Le chant le plus précoce est entendu le 29/02/04 à Limoges (87-VirA), et le dernier le sera le 15/07/04 à Saint-Hilaire-les-Courbes (19-HubP). La nidification débute ensuite avec cette première construction de nid signalée le 24/04/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP). Un autre, occupé de 4 œufs, est découvert à Lupersat (23-ColD), tandis qu'une donnée de 4 jeunes au nid est transmise le 15/08/04 à Bétête (23-MorD).

Tarins des aulnes (*Carduelis spinus*)

● Dès la fin septembre, les premiers hivernants sont signalés le 27/09/03 à Ahun, avec 1 individu (23-RobS). La migration postnuptiale se prolonge ensuite avec de petits groupes rencontrés inférieurs à 100 unités, et ce jusqu'au mois de novembre. En deux ans, la mention la plus tardive est celle de 3 individus le 16/11/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-SauJ).

L'hivernage permet de contacter des groupes importants :

- 100 ind. le 02/11/02 à Ambazac (87-LanJ),
- 100 ind. le 03/02/03 à Châlus (87-CouC).

Les oiseaux repartent ensuite vers le nord dès le début du mois de février, comme cet individu signalé le 05/02/04 à Saint-Sornin-Leulac (87-LabG). Un mâle chanteur est exceptionnellement entendu le 06/03/04 à Limoges (87-EyrO).

Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)

● La donnée la plus précoce sur les 2 années traitant du passage postnuptial vient d'Ayen, avec 9 individus en migration active le 15/09/02 (19-FanB). Le maximum d'oiseaux étant de 185, comptabilisés le 12/10/03 à Moissannes (87-BarJ).

Il n'existe que très peu de données concernant l'hivernage, tels ces 100 individus notés le 18/02/04 à Videix (87-SotJ), ou encore ce rassemblement en dortoir de 23 individus le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA). La migration prénuptiale débute ensuite la première quinzaine de mars, avec 1 individu le 08/03/03 à Flavignac (87-PreP), et le 14/03/04 à Bussière-Boffy (87-DouA), pour se clôturer vers mi-avril avec ces 2 oiseaux le 19/04/03 à Flavignac (87-PreP). Sans attendre la fin de la migration, des chants simultanés se font entendre dont deux mâles chanteurs mentionnés le 12/04/04 à La Roche-l'Abeille (87-DumA). À noter également cette construction de nid observée le 13/06/04 à Cieux (87-DouA). Le dernier chant de la saison est signalé le 31/08/02 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).



Etienne Dupoux

Sizerin flammé (*Carduelis flammea*)

● Sur les deux années concernées, seules trois données sont parvenues :

- 6 ind. le 07/02/03 à Compreignac (87-SotJ),
- 1 ind. en plumage nuptial le 12/03/03 à Veix (19-LabD et LabB),
- 1 ind. le 12/10/03 à Moissannes (87-BarJ).

Bec-croisé des sapins (*Loxia curvirostra*)

● Il est observé sporadiquement en Limousin tout au long de l'année, et les groupes les plus importants ne dépassent pas les 20 oiseaux :

- 20 ind. le 08/09/02 à Saint-Léger-la-Montagne (87-DouA),
- 20 ind. le 27/02/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-LabD).

Seulement cinq citations en migration active ont été référencées. La plus importante étant celle de 12 individus le 20/10/02 à Moissannes (87-BarJ). Enfin, un mâle chanteur est signalé dans un groupe de 13 individus le 20/04/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ), tandis qu'un couple est observé le 12/03/03 à Veix (19-LabD).

Bouvreuil pivoine (*Pyrrhula pyrrhula*)

● Les données d'oiseaux migrateurs se situent sur une période de trois semaines, de mi-octobre à début novembre, par groupes n'atteignant jamais plus de dix oiseaux, comme ces 5 individus le 20/10/02 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-BosG). Par ailleurs, un rassemblement de 15 oiseaux en hivernage est signalé le 05/02/04 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS).

Bien que les chants se fassent entendre toute l'année, ceux liés à la reproduction débutent dès le mois de février. Ainsi, un mâle chanteur se noté le 21/02/03 à Verneuil-sur-Vienne (87-EyrO), puis un autre le 05/02/04 à Saint-Gilles-les-Forêts (87-MorS). Une seule preuve de nidification certaine est répertoriée, celle d'un juvénile le 01/08/04 à Laurière (87-VinS).

Grosbec casse-noyaux (*Coccothraustes coccothraustes*)

● Les premiers migrateurs postnuptiaux sont vus le 06/10/02 avec 2 individus à Rilhac-Lastours (87-LabB), alors que les plus tardifs sont notés le 11/11/03 à Flavignac (87-PreP).

L'hivernage donne lieu à de rares rassemblements importants :

- 100 ind. le 29/12/02 à Saint-Geniez-O-Merle (19-BarJ),
- 35 ind. le 30/01/04 à Saint-Germain-les-Belles (87-MorS).

Pour ce qui est de la nidification, on retiendra ce couple transportant des matériaux le 09/04/03 à Bussière-Galant (87-CNG), ou bien ce mâle chanteur le 07/04/04 à Saint-Junien (87-DouA), ou enfin ces 2 jeunes au plumage duveteux signalés le 30/06/03 au Vigen (87-RogJ).



Raphaël Bussière

Bruant jaune (*Emberiza citrinella*)

La migration postnuptiale s'étend depuis la fin de septembre jusqu'en octobre. Elle débute en 2002 à Moissannes avec 11 individus le 12/10/02 (87-BarJ) et s'échève le 20/10/02 avec 2 oiseaux (87-BarJ). En 2003, le premier oiseau migrateur est vu le 25/09/03 à Flavignac (87-EyrO), et les deux derniers sont mentionnés le 21/10/03 sur cette même commune (87-PreP). À noter ces 18 individus, en halte migratoire, observés le 21/10/03 à Flavignac (87-PreP).

Des rassemblements hivernaux importants sont rapportés :

- 100 ind. le 09/01/02 à La Meuze (87-LabG),
- 100 ind. parmi un groupe de Fringillidés le 02/01/04 à Saint-Pardoux (87-SotJ),
- 60 ind. le 27/01/03 à Gouzon (23-SauJ).

La migration pré-nuptiale est peu marquée. Sur la période considérée, un seul individu est noté le 08/03/03 à Flavignac (87-PreP). La période de chant s'étale ensuite du mois de février au mois d'octobre. Les premiers oiseaux sont notés le 07/02/03 à Bussière-Galant (87-PreP), et l'année suivante ils le sont le 28/02/04 à Lussat (23-DupE). Les derniers chants de bruants se font entendre le 26/10/03 à Saint-Léger-la-Montagne (87-EyrO).

L'espèce compte plusieurs mentions de reproduction certaine, parmi lesquelles on révèle :

- nid garni d'un œuf le 10/05/03 à Flavignac (87-PreP),
- nourrissage de jeunes le 19/05/03 à Châlus (87-CouC),
- nid avec 3 poussins âgés de 3-4 jours le 27/05/03 à Pageas (87-CouC),
- nid contenant 4 œufs le 15/06/04 à Bussière-Galant (87-PreP).

Les derniers jeunes observés sont au nombre de 4, le 09/07/04 à Saint-Sylvestre (87-LanJ).

Bruant zizi (*Emberiza cirlus*)

L'espèce, qui est présente en petit nombre sur quasiment toute la région, est peu notée au passage postnuptial :

- 1 ind. le 20/10/02 à Linards (87-LabG),
- 1 ind. le 19/10/03 à Jalesches (23-NauP).

Quelques petits groupes sont mentionnés au cours de l'hiver, comme l'observation de 8 individus le 07/12/03 à Voutezac (19-CorA), et de 7 autres le 23/12/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR). En revanche, aucune donnée en ce qui concerne la migration pré-nuptiale.

La reproduction est prouvée à 5 reprises :

- transport de nourriture le 23/04/03 à Berneuil (87-RogJ),
- nid contenant trois œufs le 29/04/03 à Aix-sur-Vienne (87-PreP),
- nourrissage de jeunes le 03/06/03 à Jourgnac (87-LabB),
- transport de nourriture le 16/05/04 à Glandon (87-CelJ),
- 2 jeunes volants se font nourrir le 15/07/04 à Soudaine-Lavinadière (19-HubP).

Bruant fou (*Emberiza cia*)

● Assez peu de citations pour cette espèce discrète et relativement peu commune dans notre région, bien qu'elle soit notée toute l'année sur la période considérée. Deux noyaux de populations ressortent très nettement : l'Est corrézien et les monts d'Ambazac.

Il est noté qu'une seule donnée de migration postnuptiale, avec 2 individus observés le 20/10/02 à Davignac (19-ViO). Par la suite, des groupes plus importants sont visibles lors des froids hivernaux où les oiseaux peuvent se regrouper en petites troupes :

- 10 ind. le 19/01/03 à Compreignac (87-HubP),
- 5 ind. le 30/01/04 à Compreignac (87-SotJ).

Il n'existe pas de données de reproduction certaine, mais quelques observations de mâles chanteurs ou de couples en période de nidification :

- mâle chanteur le 12/04/03 à Compreignac (87-SotJ),
- mâle chanteur le 28/05/04 à Sérandon (19-BarJ),
- couple le 17/05/04 à Pérois-sur-Vézère (19-BarJ).

Bruant ortolan (*Emberiza hortulana*)

● Uniquement 2 données sont répertoriées pour cette espèce :

- 1 ind. le 20/04/03 au Lac du Chammet (19-SauJ),
- 1 ind. le 09/05/04 à l'étang de Chavaignac (87-BouP).

Bruant des roseaux (*Emberiza schoeniclus*)

● Si l'espèce est bien représentée en Creuse et en Haute-Vienne, c'est moins le cas en Corrèze.

La migration postnuptiale est bien visible à l'automne 2002, avec les 3 premiers migrateurs le 06/10/02 à Moissannes (87-BarJ), tandis que le plus gros groupe en migration active fait état de 7 individus le 13/10/02 à Moissannes (87-BarJ). Le mouvement s'achève avec cet oiseau aperçu le 29/10/02 à Rilhac-Lastours (87-LabB).

En 2003, le phénomène est moins net. La migration postnuptiale débute avec un individu le 15/09/03 à Meuzac (87-BarJ) et se termine par un individu le 19/10/03 à Bussière-Galant (87-DouA). À noter qu'un groupe de 19 oiseaux est présent le 24/10/03 à Saint-Merd-les-Oussines (19-SauJ).

Quelques rassemblements importants sont relevés sur la période, uniquement à l'étang de Lavaud :

- 39 ind. le 31/12/03 (87-BusR),
- 150 ind. le 18/01/04 (87-SotJ),
- 100 ind. les 18/02/04 et 13/03/04 (87-SotJ).

La migration prénuptiale est très peu marquée :

- 1 ind. le 09/03/03 à Bussière-Boffy (87-DouA),
- 2 ind. le 13/03/03 à Flavignac (87-PreP),
- 1 ind. le 19/03/04 à Flavignac (87-MarQ).

Peu avant le printemps, un premier chant est entendu le 09/03/03 à Lussat (23-PalG). Un couple est observé le 13/02/04 à l'étang de Landes (23-LanJ). Aucun indice de reproduction certaine.

Bruant proyer (*Miliaria calandra*)

● L'espèce est notée tous les mois de l'année dans les trois départements (27 citations au total sur la période), où elle trouve des milieux et des climats lui convenant dans le Nord de la Haute-Vienne d'une part, mais aussi à l'Ouest Corrèzien et Creuse.

Ainsi, un maximum de 11 individus peut être observé le 13/09/02 à Chaillac-sur-Vienne (87-BusR).

Quelques autres citations de l'espèce sont rapportées, tels ces 2 oiseaux le 27/11/02 à Verneuil-Moustiers (87-EyrO) et celui du 07/12/03 à Voutezac (19-CorA).

Le premier chant retentit le 22/03/04 à Saint-Léger-Magnazeix (87-SotJ).

Aucun indice de reproduction certaine n'est répertorié, mais on peut toutefois suspecter le 27/06/04 sur les sites d'uranium de Bessines-sur-Gartempe, avec 5 mâles chanteurs (87-HubP).



Etienne Dupoux



Direction Régionale de l'Environnement
LIMOUSIN

