



©François Desbordes/LPO

Effraie des clochers

Tyto alba

Rapace nocturne de taille moyenne au corps élancé prolongé de longues pattes et aux ailes larges et longues.

Dos roux clair, dessous blanc. Yeux sombres

Ordre : Strigiformes

Famille : Tytonidés

Genre : Tyto

Espèce : alba

Statut UICN en France : Préoccupation mineure

Statut de protection en France : Espèce protégée



Biométrie

Longueur : 33 - 39 cm

Envergure : 91 - 95 cm

Poids : 290 – 340 g


Longévité

≈ 10 ans

Présence en Limousin :

Toute l'année — Nicheur régulier, Migrateur rare, Hiver-
nant régulier

On la retrouve partout sauf dans la montagne limousine au-
dessus de 800 m.



Répartition en Limousin en période de reproduction
(2012—2021)



Habitat & Comportement

Elle habite généralement des **milieux ouverts** et **bocagers** situés à **proximité des constructions humaines**. En effet, les sites de nidification et de re-
mises diurnes se situent le plus souvent dans des hameaux, villages et jus-
qu'au cœur des villes. Autrefois rupestre, elle **niche** maintenant dans de
vieux édifices (clochers, granges, pigeonniers...). Elle accepte volontiers
les **nichoirs** qu'on lui propose en substitut des bâtiments devenus inacces-
sibles.

Oiseaux généralement **sédentaires** et **fidèles** au site de reproduction. Les
jeunes se dispersent en évitant les zones montagneuses.



Reproduction

L'Effraie des clochers s'installe sur le site de nidification en **février/mars**.
C'est le début des **parades nuptiales**.

Elle ne bâtit pas de nid et se contente d'aménagements sommaires.

Ponte : 2 à 14 œufs (en moyenne 6) de mars à août

L'**incubation** est assurée uniquement par la **female** pendant environ 32
jours. Contrairement aux autres rapaces nocturnes, elle peut fréquemment
effectuer **deux pontes** dans l'année si les conditions sont favorables.

Les jeunes **s'envolent** à l'âge de 8-10 semaines et sont autonomes un mois
plus tard.



Régime alimentaire

C'est une espèce très **opportuniste**, mais qui se nourrit principalement de
micromammifères (campagnols, muridés et musaraignes).

Les **autres proies** sont **diverses** : passereaux (moineaux, étourneaux et hi-
rondelles), et plus rarement des insectes, chauves-souris et amphibiens.