



Les Oiseaux Rares dans le Limousin en 2010



Huîtrier pie, *Haematopus ostralegus*, Saint-Sylvestre (87), février 2010 (J. Sottier).

**2^{ème} rapport du Comité d'Homologation
Régional du Limousin**

RAPPORT DU COMITE D'HOMOLOGATION DU LIMOUSIN 2010

Pierre Marthon et le CHR du Limousin

Ce deuxième rapport du CHR du Limousin présente les données reçues pour l'année 2010. Les données non parvenues depuis le 01/01/2009 sont toujours prises en compte, elles seront rajoutées. Les données publiées dans ce rapport peuvent être utilisées en mentionnant la source et l'observateur.

Les fiches d'homologation renseignées sont à retourner par messagerie électronique à chrlimousin@hotmail.fr ou par courrier à l'adresse : SEPOL – CHR, 11 rue Jauvion 87000 Limoges.

Sur le site internet www.sepol.asso.fr rubrique " Enquêtes" vous trouverez le règlement du CHR, la fiche d'homologation vierge, la liste des espèces à homologuer en Limousin et les rapports annuels. Ces informations sont aussi consultables sur le site <http://correze.lpo.fr>.

La réunion plénière s'est tenue à Limoges le 25 juin 2011. Gilles Pallier a souhaité quitter son poste de président ; Anthony Virondeau a accepté de le remplacer. Le comité est composé de 9 membres : Raphaël Bussière, Christian Doucelin, Pascal Duboc, Nicolas Gendre, Philippe Hubert, Pierre Marthon (Secrétaire), Gilles Pallier, Jérôme Sottier et Anthony Virondeau (Président).

Après discussion, le processus d'homologation a été assoupli. Les modifications suivantes ont été apportées au règlement :

1^{er} tour : plus de 2 abstentions sont nécessaires avant le renvoi en 2^{ème} tour.

2^{ème} tour : après apport de nouveaux éléments par le rédacteur de la fiche, ou de compléments d'informations demandés à des "spécialistes", plus de 2 abstentions sont nécessaires avant le renvoi en séance plénière.

Rappel : un 2^{ème} tour doit permettre à ceux qui se sont abstenus au 1^{er} tour de mieux se renseigner sur l'espèce, afin de pouvoir émettre un avis sur la fiche.

Séance plénière : à partir de 2 refus ou de 4 abstentions, l'observation sera ainsi refusée.

Afin de simplifier la prise en compte des dernières dates de présence d'un oiseau soumis à homologation, si une fiche est rédigée puis validée, le CHR ne redemande pas de nouvelle fiche pour la / les dernières dates de présence (sauf cas particulier).

Pour 2012, la liste des espèces à homologuer en Limousin reste inchangée. Toutefois, sur les étangs de la commune de Lussat (23), (étang des Landes, étang de la Tête-de-Bœuf, étang de la Bastide), il a été décidé de ne plus demander de fiche d'homologation à partir du 1^{er} janvier 2012 pour les espèces suivantes : Echasse blanche, Avocette élégante, Bécasseau minute, Mouette pygmée, Gorgebleue à miroir et Phragmite des joncs. Cette dérogation a pour objectif de ne pas multiplier les fiches sur ce secteur, ces espèces y étant vues régulièrement. Sur les étangs précités, ces 6 espèces seront toujours prises en compte dans les rapports annuels du CHR après extraction de la base de données de la SEPOL.


L'hiver 2010-2011 a été marqué par un afflux important de Bouvreuils des Komis (*Pyrrhula pyrrhula pyrrhula*). Il s'est avéré que la description d'un cri ou d'un chant engendrait une difficulté dans la traduction et la rédaction des onomatopées sonores. Il a été rappelé qu'une fiche peut être validée sur la seule description d'un cri ou d'un chant si celle-ci est correcte et que l'observation semble cohérente. Après relecture des fiches, il apparaît que chaque observateur a été interpellé par les manifestations vocales, et que les descriptions fournies correspondent bien au cri typique de ce taxon, et non au cri habituel bien connu des bouvreuils locaux (cri fluté et mélancolique). Nous avons donc décidé d'homologuer ces fiches.

Par anticipation sur 2011, année pour laquelle le Harle bièvre (*Mergus merganser*) et le Plongeon imbrin (*Gavia immer*) sont ajoutés à la liste des espèces soumises à homologation, les observations de ces espèces effectuées lors du 3ème trimestre 2010 sont intégrées dans le présent rapport.

Pour l'année 2010, 74 fiches décrivant 77 observations ont été examinées, contre 48 fiches traitées en 2009. Le taux d'acceptation est de 96%. 3 observations n'ont pas été homologuées, dont 2 pour absence de description ou description insuffisante.

29 fiches concernent la Corrèze, 23 la Creuse et 25 la Haute-Vienne.

65% des mentions (n=50) concernent des espèces inféodées aux milieux aquatiques, les étangs de Lussat totalisant 20 données.



Présentation des données :

- Nom français et scientifique, classement selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de France ⁽¹⁾.
- Nombre de données homologuées et le nombre d'individus pour l'année 2010,
- Classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements,
- Commune/Localité,
- Nombre d'individus (si un, non mentionné),
- Sexe, âge, forme,
- Précision si l'oiseau a été bagué ou photographié,
- Date,
- Commentaires éventuels,
- Les données sont la propriété des observateurs et sont citées comme telles ; figurent dans l'ordre : le nom du rédacteur, puis celui des observateurs cités sur la fiche.

Abréviations utilisées :

ad. : adulte - fem. : femelle - cple : couple - juv. : juvénile - imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1^{er} hiver - 1A : 1^{ère} année - +1A : plus d'un an - 2A : 2^e année - nupt. : nuptial - internup. : internuptial.

(1) COMMISSION DE L'AVIFAUNE FRANÇAISE (2007). *Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C)*. Ornithos 14-4 : 234-246.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2010 DES ESPECES DES CATEGORIES A et C

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (1, 2).

Migratrice, 3 populations nordiques différentes hivernent en Europe de l'Ouest. Celle de l'est du Groenland migre dans l'ouest de l'Ecosse et en Irlande, celle du Spitzberg dans le golfe de Solway après avoir suivi la côte norvégienne et celle de Nouvelle-Zemble aux Pays-Bas après avoir traversé la Baltique. Une population nicheuse est implantée dans la Baltique sur Gotland.

Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, 2 ad., le 21/02/2010, photo (P. Marthon, Ch. et S. Barbier).



Photo 2 :

Bernaches nonnettes, *Branta leucopsis*, Aubazine (19), février 2010 (Ch. Barbier)

L'observation des ces 2 oiseaux, lors de leur migration prénuptiale, fait suite à l'afflux de Bernaches nonnettes noté en France lors de l'hiver 2009/2010.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (2, 3).

Nicheuse rare en France et migratrice partielle. Les populations continentales passent l'hiver en région méditerranéenne.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 fem., le 25/09/2010, photo (N. Deschaume).

Haute-Vienne – Saint-Sylvestre/Plan d'eau de la Croisille, fem., ad., du 26/12/2010 au 31/12/2010 (I. Pradier et D. Naudon).

Niche à proximité du Limousin, en Brenne et depuis peu dans l'Allier, mais reste rare en Limousin.



Photo 3 :

Nette rousse, *Netta rufina*, Lussat (23), septembre 2010 (N.Deschaume).

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (1, 1).

Niche de la Scandinavie à la Sibérie, et descend le long des côtes pour hiverner jusqu'en Espagne. Les migrations ont lieu en octobre-novembre et en mars-avril.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Lac de la Triouzoune, mâle, H1, le 10/01/2010, photo (S. Heinerich, M. Chapelier et M. Rossi).

Espèce rarement contactée à l'intérieur des terres, très éloignée de ses voies migratoires traditionnelles.

HARLE PIETTE *Mergus albellus* (1, 1).

Niche sur les lacs et cours d'eau de la taïga. Peu commun, il fréquente en petites bandes les sites de passage et d'hivernage européens.

Haute-Vienne – Razès/Lac de Saint-Pardoux, fem., le 10/12/2010, photo (A. Salesse).

Date classique pour cette citation hivernale de ce petit harle, les femelles étant plus souvent observées que les mâles.

HARLE BIEVRE *Mergus merganser* (3, 10).

Migrateur partiel ; niche dans le nord de l'Europe et en Europe centrale. Quelques oiseaux nichent dans l'est de la France. Hivernent au sud de la Grande-Bretagne et sur le continent de manière ponctuelle jusqu'à l'Adriatique.

Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, type fem., H1, du 12/12/2010 au 17/01/2011, photo (P. Marthon, SEPOL)

Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Etang de St-Pardoux, 8 types fem., du 15/12/2010 au 06/01/2011, photo (J. Sottier).

- Peyrat-le-Château/Lac de Vassivière, type fem., H1, du 27/12/2010 au 10/01/2011 (A. Virondeau et J.-P. Virondeau).

Un afflux de Harles bièvres est survenu lors de l'hiver 2010/2011 à nos latitudes, on notera que tous les oiseaux cités sont de type femelle.



Photo 6 : Harles bièvres, *Mergus merganser*, Saint-Pardoux (87), décembre 2010 (J. Sottier)

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (2, 2).

Niche en Islande et est présent principalement le long des côtes au passage et en hiver, parfois sur les grands plans d'eau. Il arrive en Europe occidentale de la fin octobre à décembre et remonte en mars-avril.

Corrèze – Chasteaux-Lissac/Lac du Causse, H1, du 14/11/2010 au 28/11/2010, photo (P. Eymard, P. Soulier).

Creuse – Chambon-sur-Voueize/Etang du Domaine Neuf, H1, du 09/12/2010 au 18/12/2010, photo (P. Duboc).

Apparition classique en migration postnuptiale, toutefois l'observation de l'espèce dans le sud corrézien est exceptionnelle.



Photo 8 : Plongeon imbrin, *Gavia immer*, Chasteaux/Lissac (19), décembre 2010 (P. Eymard).

GREBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (2, 3).

Migrateur partiel ; il niche dans le nord de l'Europe. Passage postnuptial de septembre à novembre, passage pré-nuptial en février-mars. Il hiverne dans le nord-ouest de l'Europe et en Méditerranée.

Haute-Vienne – Peyrat-le-Château/Lac de Vassivière, ad., internupt., du 21/12/2010 au 29/12/2010 (A. Virondeau, Ch. Bordier et J.-P. Virondeau).

- Limoges/Pont neuf, 2ad., internupt., le 25/12/2010 (A. Salesse).

Ces 2 observations de Grèbes esclavons surviennent après un début d'hiver particulièrement rigoureux.



Photo 9 :

Grèbe esclavon, *Podiceps auritus*, Peyrat-le-Château (87), décembre 2010 (Ch. Bordier).

GREBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (1, 1).

Migrateur partiel, les nicheurs du centre et du nord de l'Europe hivernent plus à l'ouest sur les côtes scandinaves, baltes, de la mer du Nord et de la Manche ; certains vont jusqu'aux côtes de l'Atlantique et de l'Adriatique. Ses séjours en Europe de l'Ouest vont d'août à avril.

Haute-Vienne – Peyrat-le-Château/Lac de Vassivière, ad., internupt., du 21/12/2010 au 29/12/2010 (A. Virondeau, Ch. Bordier et J.-P. Virondeau).

Sur le lac de Vassivière on notera la présence concomitante de ce grèbe avec le Grèbe esclavon mentionné précédemment.



Photo 10 :

Grèbe jougris, *Podiceps grisegena*, Peyrat-le-Château (87), décembre 2010 (Ch. Bordier).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (3, 3).

Niche en Europe mais de plus en plus rare en Europe de l'Ouest. Migrateur partiel ; hiverne plus au sud jusqu'en Afrique du Nord.

Corrèze – Palisse/Etang de Charreneuve, ind., du 13/03/2010 au 14/03/2010, photo (S. Heinerich, M. Rossi, R. Sustac, Y. Labarussias, C. Patinaud et G. Onfray).

- Tarnac/Etang de Chabanne, ind., 11/11/2010 (J.-M.& M.-L. Chastanet, Ch. Variéras, A. Lacour et C. Renault).

Haute-Vienne – Saint-Bonnet-Briance/Etangs d'Aigueperse et de Sivergnat, ind., du 17/01/2010 au 17/02/2010 (G. Labidoire et N. Chamarat).

Chaque hiver, quelques individus sont observés en Limousin où l'espèce n'est plus nicheuse.



Photo 11 :

Butor étoilé, *Botaurus stellaris*, Palisse (19), mars 2010 (S. Heinerich).

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (1, 1).

Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord. Hiverne principalement en Afrique tropicale.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., internup., le 08/08/2010 (P. Duboc et C. Michaud).

Depuis quelques années, l'espèce est observée en période de reproduction sur les étangs du bassin de Gouzon.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (1, 1).

Migratrice ; niche du Danemark au sud du Portugal en passant par la France. Hiverné en Europe en jusqu'en Afrique tropicale. Les passages migratoires ont lieu en août-octobre et de février à mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., du 16/07/2010 au 18/07/2010 (R. Grignon)

En Limousin, l'espèce est généralement mentionnée au passage postnuptial.

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (1, 1).

D'origine africaine, il étend peu à peu son domaine vers le nord : jusqu'en Aquitaine (bassin de l'Adour notamment).

Haute-Vienne – Flavignac/Faye, ind., le 29/08/2010 et le 31/08/2010, photo (D. Naudon, I. Pradier, B. Labidoire, P. Précigout, J.-L. Vareille et al.).

Ce petit rapace, pour la première année soumis à homologation régionale, est cité à la même période et pour la seconde année consécutive à Flavignac (Source Obs Limousin).



Photo 12 :

Elanion blanc, *Elanus caeruleus*, Flavignac (87), août 2010 (I. Pradier).

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (1, 1).

Réintroduit avec succès dans les Grands Causses, puis dans le sud-est de la France. Les populations augmentent lentement mais régulièrement. Erratique dans le reste du pays, à l'image du Vautour fauve.

Corrèze – Neuvic/Les Plaines, +1A, le 03/06/2010 (S. Heinerich).

Observation concomitante avec un groupe de Vautours fauves. Il s'agit seulement de la seconde mention limousine.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (4, 9).

Niche en Europe entre 35° N et 45° N, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En France, en dehors des zones de réintroduction (Grands Causses, Alpes du sud) et des Pyrénées où l'espèce se reproduit, le Vautour fauve est erratique. Des mouvements vers le nord de l'Europe ont lieu régulièrement depuis quelques années au printemps et en début d'été.

Corrèze – Neuvic/Les Plaines, au moins 6 ind., le 03/06/2010 (S. Heinerich).

- Aubazine/Moulin de Mercier, ind., le 28/07/2010 (P. & P. Marthon).

- Ayen/Les Chaumonts, imm., du 06/09/2010 au 08/09/2010 (B. Faurie, F. Perdrix et al.).

Haute-Vienne – Compreignac/Le Malagnac, ind., le 12/06/2010 (J. Sottier).

Les observations de cette espèce sont de plus en plus fréquentes en Limousin, les populations françaises étant en expansion et les Grands Causses n'étant pas si loin.



Photo 13 :

Vautour Fauve, *Gyps fulvus*, Ayen (19), septembre 2010 (B. Faurie).

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (1, 1).

Niche dans les régions montagneuses d'Europe où il est rare. Les adultes sont sédentaires, sauf dans le nord de l'Europe. Les jeunes sont de tendance erratique et ceux d'Europe septentrionale migrent vers le sud en hiver.

Corrèze – Saint-Merd-les-Oussines/Etang de Chabannes, H1, le 19/04/2010 (P. Soulier).

L'espèce fréquente de plus en plus régulièrement les départements limitrophes du Puy de Dôme et du Cantal, et niche au sud du Massif Central.



Photo 14 :

Aigle royal, *Aquila chrysaetos*, Saint-Merd-les-Oussines (19), avril 2010 (P. Soulier).

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (2, 3).

Migratrice ; hiverne surtout en Afrique tropicale, rarement dans le sud-ouest de l'Europe ; départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ad. chanteurs, mâles, le 03/03/2010 (A. Virondeau, S. Heinerich, L. Pomier et R. Petit).

– Lussat/Etang des Landes, ad., le 18/07/2010 (A. Virondeau).

Les contacts répétés, en période de nidification, laissent envisager que la nidification est régulière à l'étang des Landes.

HUITRIER PIE *Haematopus ostralegus* (1, 1).

Migrateur partiel ; il est présent sur toutes les côtes de l'Europe occidentale. On observe les hivernants de juillet à mai.

Haute-Vienne – Saint-Sylvestre/Retenue de La Crouzille, ad., nupt., photo, le 28/02/2010 (J. Sottier).

Cette espèce, essentiellement maritime, est très rarement observée à l'intérieur des terres. Cette observation fait suite à une forte tempête.

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta* (4, 28).

Migratrice, passe l'hiver principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Niche dans les estuaires, les baies, les marais salants et autres zones humides. Passages migratoires étalés.

Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, 2 ad., le 21/02/2010, photo (P. & P. Marthon).

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 17 ind., le 29/11/2010, photo (J. Moulinat).

Haute-Vienne – Limoges/Lac d'Uzurat, 8 ind., le 28/03/2010 (Ph. Goursaud et ONCFS).

- Limoges/Lac d'Uzurat, ind., le 29/11/2010 (R. Beaubert).

Ces observations correspondent à des oiseaux en halte migratoire. On notera que fin novembre un groupe de 99 avocettes stationnait à l'étang de Sault dans l'Allier, à 30 km de l'étang des Landes (Obs Stéphane Combaud, LPO Auvergne).



Photo 15 : Avocettes élégantes, *Recurvirostra avosetta*, Lussat (23), novembre 2010 (J. Moulinat).

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (1, 2).

Nicheur arctique migrateur ; hiverne sur les côtes méditerranéennes et surtout en Afrique. S'observe surtout de août à octobre lors de la migration postnuptiale ; plus rare en migration pré-nuptiale d'avril à mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 juv., le 23/09/2010 et le 02/10/2010 (A. Virondeau, F. Desage et B. Brunet).

Données non parvenues au CHR – Source Obs Limousin : dates d'autres observations du même oiseau : le premier Bécasseau minute de la saison fut signalé le 4 septembre par R. Grignon, puis 2 juvéniles dont 1 prédaté par un épervier (A. Audevard), puis 3 juv. (donc 2 de plus au moins) le 23 septembre, (F. Desage), et enfin 2 juv. les 1 et 2 octobre (A. Virondeau). Très difficile bien sûr de savoir quel est le renouvellement.

La migration de printemps s'effectue plus à l'est. L'espèce est régulière à l'étang des Landes lors du passage postnuptial.

BECASSEAU TACHETE *Calidris melanotos* (1, 1).

Niche dans les régions les plus septentrionales du nord-est de la Sibérie et de l'Amérique du

Nord. Hivernent principalement en Océanie et en Amérique du sud. Migrateur rare en Europe.
Creuse – Lussat/Etang des Landes, juv., le 01/10/2010 (F. Desage, A. Virondeau et B. Brunet).
Seconde mention limousine pour cette espèce bien loin de ses trajets migratoires traditionnels.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (1, 3).

Nicheur en Sibérie arctique, il hiverne principalement en Afrique, et parfois sur le pourtour méditerranéen. En France, fréquente essentiellement le littoral au passage (notamment façade atlantique en migration postnuptiale).

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 3 juv., le 01/10/2010 et le 02/10/2010 (A. Virondeau, F. Desage et B. Brunet).

Observation concomitante avec l'espèce précédente. Ces 2 espèces de bécasseaux nichent dans les régions les plus septentrionales de la Sibérie.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (1, 1).

Niche en Arctique et sur les côtes scandinaves. Hivernent le long du littoral européen, dans le Bassin Méditerranéen et en Afrique. Les déplacements migratoires ont lieu de la mi-mars à début juin, et de fin juillet à novembre.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ind., le 18/09/2010, photo (Ph. Hubert et R. Grignon).

Observation exceptionnelle de cette espèce à l'intérieur des terres lors de ses déplacements migratoires.

MOUETTE PYGMEE *Larus minutus* (1, 1).

Migratrice ; niche dans le nord de l'Europe centrale et orientale, hiverne sur toutes les côtes d'Europe de l'Ouest, du Maghreb et de la mer Noire.

Corrèze – Aubazine/Moulin de Mercier, ad., le 04/12/2010 (P. Marthon).

Le nombre d'observations de cet oiseau reste faible en dehors des étangs du Bassin de Gouzon.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (1, 1).

Migratrice partielle ; niche en Europe méridionale mais en augmentation vers le nord-ouest du continent. Elle hiverne le long de toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.

Corrèze – Neuvic-Liginiac/Le Lac, ad., le 30/03/2010, photo (S. Heinerich).

Déjà observée sur le lac de Neuvic à cette période l'année précédente.



Photo 16 :

Mouette mélanocéphale, *Larus melanocephalus*, Neuvic (19), mars 2010 (S. Heinerich).

GOELAND CENDRE *Larus canus* (1, 1).

Espèce nicheuse dans le nord de l'Europe. Hivernent sur l'ensemble des côtes scandinaves et d'Europe de l'Ouest jusqu'à la hauteur de Bordeaux, sur celles de Grande-Bretagne et d'Islande, à l'intérieur des terres en Finlande du Sud, en Ecosse et en Irlande.

Haute-Vienne – Limoges/Etang de Beaune-les-Mines, H2, nupt., le 13/01/2010 (A. Virondeau).

L'espèce est citée chaque hiver en Limousin, mais les observations restent rares et portent généralement sur des oiseaux isolés.

STERNE NAINNE *Sternula albifrons* (1, 1).

Migratrice ; niche sur les côtes d'Europe de l'Ouest et le long des cours d'eau ; hiverne en Afrique tropicale. Départs de juillet à novembre, retours en avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Etang du Coiroux, ad., le 29/05/2010 (P. Marthon et Ch. Barbier).

Date de passage classique pour cette sterne au passage prénuptial.

STERNE CASPIENNE *Hydroprogne caspia* (1, 1).

Migratrice ; niche sur les côtes de la Baltique et du golfe de Botnie ; après la mue postnuptiale descend le long des côtes d'Europe pour hiverner en Afrique tropicale. Départs en août-septembre, retours en avril-mai.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., le 01/08/2010, photo (R. Grignon).

Date de passage précoce pour cette grande sterne en migration postnuptiale.



Photo 17 :

Sterne caspienne, *Hydroprogne caspia*, Lussat (23), août 2010 (R. Grignon).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (1, 1).

Migratrice ; niche dans la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest, y compris le long des fleuves et autour des lacs. Hiverne sur les côtes de l'Afrique tropicale, éventuellement au large. Arrive en avril et repart en septembre.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, ad., internupt., le 02/10/2010 (A. Virondeau et B. Brunet).

Cet oiseau est rarement mentionné en Limousin.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (1, 1).

Migrateur partiel ; niche dans le nord et le nord-est de l'Europe, localement dans l'ouest de la France. Hiverne du Danemark au Maroc, dans les îles Britanniques, localement en pays méditerranéen.

Corrèze – Sadroc/Le Temple, mâle probable, le 01/01/2010 (J.-M. Chaumeil).

Cet oiseau fait régulièrement l'objet de quelques citations dans la région en hiver.

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (2, 2).

Migrateur ; niche dans l'Europe de l'Ouest sauf sur les îles Britanniques et la Scandinavie ; hiverne au Sahel et en Afrique de l'Est. Départ en août-octobre, retour en avril-mai.

Corrèze – Beynat/La Brande, ad., le 23/03/2010 (P. Marthon).

Haute-Vienne – Flavignac/Cessaguet, ind., le 26/09/2010 (A. Virondeau, J.-P. Virondeau, P. Précigout, J.-L. Vareille et al.).

Ces deux dates d'observation correspondent à des passages migratoires.

BERGERONNETTE PRINTANIERE BRITANNIQUE *Motacilla flava flavissima* (1, 2).

Migratrice, elle hiverne en Afrique ; départ septembre-octobre, retour fin mars à mai vers ses sites de nidification en Grande-Bretagne.

Haute-Vienne – Saint-Junien/Les Essarts, 2 ad., mâles, le 21/04/2010 (Ch. Doucelin).

Observées parmi un groupe de 11 bergeronnettes printanières, il est possible que le nombre d'oiseaux de cette sous-espèce dans le groupe soit sous-estimé.

BERGERONNETTE PRINTANIERE SCANDINAVE *Motacilla flava thunbergi* (5, 8).

Migratrice, elle hiverne en Afrique ; départ septembre-octobre, retour fin mars à mai vers ses sites de nidification en Fennoscandie.

Corrèze – Liginiac/Le Theil, ad., mâle, le 17/04/2010, photo (S. Heinerich).

- Neuvic-Liginiac/Le Theil, ad., mâle, le 26/04/2010 (A. Virondeau, S. Heinerich, J. Roger et B. Tranchant).

- Liginiac/Le Theil, ad., mâle, le 27/04/2010, photo (S. Heinerich).

- Sérandon/Douniol, 2 ad., mâles, le 09/05/2010 (S. Heinerich).

- Liginiac/Le Theil, 3 ad., mâles, le 10/05/2010 (S. Heinerich).

Tous les oiseaux observés sont des mâles, les femelles étant beaucoup moins évidentes à identifier avec certitude. Les citations émanent du même secteur. Les observateurs ne pensent pas toujours à rechercher cette sous-espèce dans les groupes de bergeronnettes posés.



Photo 18 :

Bergeronnette printanière scandinave, *Motacilla flava thunbergi*, Neuvic (19), avril 2010 (S. Heinerich).

BERGERONNETTE GRISE DE YARELL, *Motacilla alba yarrelli* (1, 1).

Cette sous-espèce, nichant en Grande-Bretagne et en Irlande, se rencontre en France en migration ou en hivernage.

Haute-Vienne – Limoges/Beaune-les-Mines, ad., mâle, le 17/01/2010 (P. Duboc).

La présence de Bergeronnettes de Yarell en Limousin est exceptionnelle.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* (1, 1).

Niche dans l'extrême nord-est de l'Europe. Hiverné vers le sud et l'ouest jusqu'en Belgique, dans le nord de la France, les îles Britanniques, la Suisse et en Europe centrale. Certaines années des invasions périodiques se produisent de décembre à mars.

Haute-Vienne – Saint-Léonard/Marnigot, ind., le 27/12/2010 (A. Virondeau).

Cette observation coïncide avec l'invasion de Jaseurs boréaux constatée en France lors de l'hiver 2010/2011.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris* (2, 2).

Niche dans les massifs montagneux d'Europe de l'Ouest où il est en grande partie sédentaire. D'octobre à avril, il a tendance à descendre hiverner dans la plaine proche de ses massifs ou

plus au sud.

Corrèze – Condat-sur-Ganaveix/Le Mons, ind., le 04/12/2010 (A. Gendeau).

Creuse – Toulx-Sainte-Croix/Station sismographique, ind., le 09/04/2010 (Ch. Doucelin).

Ces 2 observations s'inscrivent aux dates habituelles d'observation de l'espèce dans la région.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (1, 1).

Largement répandue en Europe, migratrice. Niche ponctuellement en Europe de l'Ouest sauf en Italie et sur les îles Britanniques. Hiverné en Espagne, au Maroc, du Sahel à la Somalie.

Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, 1 ad., mâle nupt., le 28/03/2010 (A. Virondeau).

Il s'agissait d'un mâle à miroir blanc, probablement de la sous-espèce *cyaneacula*. Cette observation dans un marais minuscule en pleine ville est originale.

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (1, 2).

Sédentaire dans les pays méditerranéens et sur une large bande côtière le long de l'Atlantique et de la Manche. Certaines années survient un mouvement invasionnel vers le nord.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 ad., (1 mâle chanteur et 1 ind.), le 20/07/2010 (A. Virondeau).

Observation probable d'un couple en période de reproduction.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (5, 10).

Migrateur total, l'espèce hiverné en Afrique tropicale. Départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 2 mâles chanteurs simultanés, le 05/04/2010 (A. Virondeau et J. Moulinat).

- Lussat/Etang des Landes, ind., le 12/04/2010 (A. Virondeau).

- Lussat/Etang des Landes, cple et juv, du 24/06/2010 au 20/07/2010 (A. Virondeau, J.-P. Virondeau et A. Desternes).

- Lussat/Etang des Landes, 3 juv, le 27/07/2010 (A. Virondeau).

- Limoges/Station d'épuration, 1 ad., mâle, le 26/04/2010 (F. Desage).

La nidification est avérée 2 fois à l'étang des Landes. L'oiseau contacté à Limoges est très probablement un migrateur.

REMIZ PENDULINE *Rémiz pendulinus* (1, 7).

Migratrice partielle en expansion en Europe de l'Ouest ; très localisée en France ; commune sur la péninsule ibérique et à l'est d'une ligne Italie-Suisse-Hollande-Danemark.

Creuse – Lussat/Etang des Landes, 7 ind., le 11/10/2010 (F. Desage).

Si cette observation est faite à une date assez classique en automne, l'importance du groupe est remarquable.

MOINEAU SOULCIE *Petronia petronia* (1, 1).

Espèce sédentaire dans les pays méditerranéens, en France se rencontre sur le pourtour méditerranéen, dans le Massif Central et les Alpes, et ponctuellement jusqu'en Vendée.

Corrèze – Naves/La Combotte, ad, mâle chanteur, le 09/05/2010 (J.-M. Chaumeil)

L'espèce niche à proximité, dans le sud corrézien.

BOUVREUIL DES KOMIS *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* (4, 13).

Ces oiseaux émanant de la taïga russe envahissent périodiquement l'Europe de l'Ouest en automne - hiver. En nature, seul leur cri décrit comme un coup de klaxon sonore les distingue de la sous-espèce nominale.

Creuse – Evaux-les-Bains/Ayen, 1 mâle, le 09/12/2010 (P. Duboc).

- Lussat/Etang des Landes, 4 ind., 1 mâle, 3 fem., le 10/12/2010 (F. Desage).

Haute-Vienne – Châteauneuf-la-Forêt/ Village, 2 mâles, le 11/12/2010 (R. Beaubert).

- Thiat/ Moulin de Bram, 6 ind., le 11/12/2010 (R. Beaubert et S. Ginesta).

Une invasion exceptionnelle de Bouvreuils des Komis a été constatée en France durant l'hiver 2010/2011.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (3, 4).

Migrateur ; niche en Europe de l'Ouest à l'exception de la Bretagne, du nord de la France, des îles Britanniques et méditerranéennes. Hiverné du Sahel au Soudan. Départ fin août-octobre, retour avril-mai.

Corrèze – Aubazine/Moulin de Mercier, ad, le 27/05/2010 (P. Marthon).

- Beynat/Chassancet, 1 ad., mâle, le 06/06/2010 (P. & P. Marthon, A. Reynier et LPO 19).

Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, 2 ad., (1 mâle et 1 ind.), le 26/04/2010 (F. Desage).

Ces 3 observations, en période pré-nuptiale, sont dans la continuité de l'année 2009 où un groupe de 11 bruants ortolans avaient stationné une semaine fin mai à Aubazine.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2010 DES ESPECES DES CATEGORIES D et E (espèces dont l'origine sauvage est douteuse).

CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (1, 2).

Espèce asiatique, populations férales installées en Europe occidentale, à l'état sauvage fréquente les lacs et les rivières aux berges boisées.

Haute-Vienne – Châteauponsac/pont sur la Gartempe, cpl, le 20/03/2010 (J. Sottier).

Nidification possible vu le comportement arboricole.

DONNEES NON HOMOLOGUEES

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* : **Corrèze** – Clergoux/Sédières, 33 ind., le 07/06/2010, probablement cette espèce mais pas de description pour cette observation.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* : **Corrèze** – Beynat/Brugaille, 1 ind., le 08/07/2010, description insuffisante, confusion possible avec un Vautour fauve.

TRAQUET MOTTEUX, SOUS-ESPECE DU GROENLAND ET DU CANADA, *Oenanthe oenanthe leucorhoa* : **Haute-Vienne** : La Roche l'Abeille/Lande de Saint-Laurent, 1 ind., le 10/05/2010, pour une identification certaine nécessité d'avoir l'oiseau en main.

Rappel : La description est très importante, sa lecture permet aux membres du CHR de se prononcer, une photo ne saurait la remplacer totalement.

REMERCIEMENTS

Le CHR du Limousin remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à sa bonne marche :

- **Tous les observateurs et les photographes qui sont à la base de son fonctionnement,**
- **La SEPOL pour son soutien logistique et matériel,**
- **Mme Françoise Quillard pour sa participation à la diffusion des fiches au sein du CHR.**

BIBLIOGRAPHIE

Dubois Ph.J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, 560 pages.

SEPOL, 1993. *Atlas des Oiseaux Nicheurs en Limousin*. Editions Lucien Souny.

Svensson L, Mullarney K. & Zetterstrom D., 2010. *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé.

Encyclopédie multimédia des oiseaux GEO. A la découverte de tous les oiseaux d'Europe. Edition 2004, Montparnasse multimédia.

Site internet : <http://www.oiseaux.net/>

