



Les Oiseaux Rares dans le Limousin en 2011



Accenteur alpin, *Prunella collaris*, Limoges (87), déc. 2011 à fév. 2012 (F. Desage).

**3^{ème} rapport du Comité d'Homologation
Régional du Limousin**

Pierre Marthon et le CHR du Limousin

Ce troisième rapport du Comité d'Homologation Régional répertorie les données parvenues lors l'année 2011.

Les données publiées dans ce rapport peuvent être utilisées en mentionnant la source et l'observateur.

Les fiches d'homologation renseignées sont à retourner par messagerie électronique à chrlimousin@hotmail.fr ou par courrier à l'adresse : SEPOL – CHR, 11 rue Jauvion 87000 Limoges.

Sur le site internet www.sepol.asso.fr rubrique "Enquêtes" et sur le site <http://correze.lpo.fr>, vous trouverez le règlement du CHR, la fiche d'homologation vierge, la liste des espèces à homologuer en Limousin et les rapports annuels.

Mi-décembre 2011, Philippe Hubert a souhaité quitter son poste, Fabrice Desage a accepté de le remplacer. Nous remercions Philippe pour sa participation active aux travaux du comité, et surtout nous n'oublions pas qu'il est l'initiateur de la mise en place du CHR du Limousin ; nous souhaitons la bienvenue à Fabrice parmi nous.

Neuf membres composent le CHR régional : Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Christian Doucelin, Pascal Duboc, Nicolas Gendre, Pierre Marthon (secrétaire), Gilles Pallier, Jérôme Sottier, Anthony Virondeau (président).

La réunion plénière s'est tenue à Limoges le 09 juin 2012.

Après avoir examiné les fiches en suspens, nous avons examiné la mise en forme et le contenu du rapport 2011. Dans chaque monographie, en plus des citations et des données de l'année 2011, celles des années précédentes seront incluses. Dans ce cadre, il a été décidé que pour les données de baguage des espèces soumises à homologation, une citation correspondait à une journée de baguage.

La liste des oiseaux de France selon la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO et le MNHN, nous sert de référence pour l'ordre taxonomique et le nom des espèces.

Les données soumises à homologation nationale seront reprises dans la base de données du Comité d'Homologation National pour figurer sur le rapport annuel du CHR afin d'être diffusées auprès des observateurs locaux.

Pour 2013, la liste des espèces à homologuer en Limousin restera inchangée. Nous attendons d'avoir plus de recul pour établir une règle d'ajout ou de retrait d'espèces de cette liste.

Fin 2011, la base de données du CHR est riche de 256 citations, 75 espèces ou taxons sont concernés.

L'année 2011 a été marquée par l'observation de nombreuses espèces méditerranéennes, Faucons crécerelletes, Glaréole à collier, Petit-duc scops, Rolliers d'Europe, Coucou geai et Goéland railleur. Parmi les hivernants, dans la continuité de la fin de l'année 2010, un nombre important de citations de Bouvreuils trompetteurs et d'Harles bièvres nous est parvenu.

Parallèlement, **une Buse pattue**, *Buteo lagopus*, observée le 20/02/2011 à Ajain (23- Pascal Duboc) a été homologuée par le Comité d'Homologation National.

Au titre de l'année 2011, 87 fiches ont été examinées dont 6 fiches concernant les années 2009 et 2010. Le taux d'acceptation est de 94%. Rappelons que les observations non homologuées sont toutefois présentées en fin de rapport. En 2009 et en 2010, 48 et 74 fiches avaient été traitées pour des taux d'acceptation respectifs de 94% et de 96%. Les causes de refus sont soit l'absence de description, soit le manque de critères essentiels d'identification engendrant une confusion possible avec une autre espèce. Dans la majorité des cas, l'espèce proposée est probablement la bonne mais l'absence de critères déterminants ne permet pas d'en être certain.

Présentation des données :

- *Nom français et scientifique, classement selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux*

de France ⁽¹⁾ .

- Entre parenthèses les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi du nombre d'individus homologués depuis 2009 année de création du CHR, 2011 exclu.
Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre d'individus homologués pour l'année 2011,
- Classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements,
- Commune/Localité,
- Nombre d'individus (si un, non mentionné),
- Sexe, âge, forme,
- Précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a été l'objet d'un enregistrement,
- Date du premier contact, et éventuellement celle du dernier,
- Pour les données de baguage, une citation correspond à une journée de capture,
- Commentaires éventuels,
- Les données sont la propriété des observateurs et sont citées comme telles ; figurent dans l'ordre : le nom du rédacteur, puis celui des observateurs cités sur la fiche.

Abréviations utilisées :

ad. : adulte - fem. : femelle - cple : couple - juv. : juvénile - imm. : immature - ind. : individu - H1 : 1^{er} hiver - 1A : 1^{ère} année - +1A : plus d'un an - 2A : 2^e année - nupt. : nuptial - internup. : internuptial.

(1) COMMISSION AVIFAUNISTIQUE FRANÇAISE (2010). *Liste officielle des Oiseaux de France.*

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2011 DES ESPECES DES CATEGORIES A et C

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (1/2 - 1/9).

Niche à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble ; également en mer Baltique et depuis le début des années 1970, en mer du Nord, notamment aux Pays-Bas où les populations férales sont en forte augmentation. Hivernante rare en France, elle hiverne de l'Irlande à l'Écosse et de la Belgique au Danemark.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 9 ind., le 24/11/2011 (J. Sottier).

La présence de ces 9 oiseaux est d'autant plus remarquable qu'elle survient lors d'un automne exceptionnellement doux, l'espèce apparaissant généralement lors des vagues de froid ou au printemps.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (3/5 - 1/1).

Migratrice partielle, niche ponctuellement en Espagne et en France, jusqu'en Europe centrale et en Anatolie ; les populations les plus importantes se concentrent de l'est de la Mer Noire à l'Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans le bassin méditerranéen.

Haute-Vienne – Azat-le-Ris/Le Grand Etang, 1 mâle, +1A, le 14/01/2011 (A. Salesse).

Nichant dans les régions voisines, la Nette rousse reste rare en Limousin.

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula* (0/0 - 1/1).

Niche du nord de l'Europe, à travers la Sibérie, jusqu'au Kamtchaka et au nord-est de la Chine. Les migrations ont lieu en octobre-novembre et en mars-avril. Hivernent sur les plans d'eaux ouverts, le long des fleuves et en mer près des côtes.

Haute-Vienne – Azat-le-Ris/Le Grand Etang, ad., mâle, nupt., le 11/02/2011 (Ph. Goursaud).

En France, les rares hivernants sont généralement observés au nord de la Loire, cette observation en Limousin est d'autant plus remarquable.

HARLE BIEVRE *Mergus merganser* (3/10 - 7/32).

Niche de l'Islande, des îles Britanniques et de l'est de la France vers l'est, à travers l'Eurasie, surtout au-delà du 5°N, mais aussi au pied de la chaîne himalayenne. En hiver, fréquente les cours d'eau et les lacs, plus rarement les côtes.

Corrèze – Sérandon/Pont de Vernéjoux, ad., fem., 28/02/2011 (J. Barataud).

– Neuvic/Le Lac, 3 ad., fem., le 21/03/2011 (J. Barataud).

– Soursac/Barrage de l'Aigle, 4 ad., mâles, le 07/11/2011 (R. Jourde).

Creuse – Saint-Priest la Feuille/La Berthonnerie, 5 ind. (4 fem., 1 mâle), le 05/01/2011 (Ch. et J. Lyons).

Haute-Vienne – Bersac-sur-Rivallier/Le Moulin de Gérald, type fem., le 19/01/2011 (Ph. Goursaud, J.M. Maillat).

– Saint-Pardoux/Lac de Saint-Pardoux (Site de Fréaudour), 15 ind. (type fem.), le 27/02/2011, photo (Ph. Hubert, P. et P. Joffre).

– Saint-Pardoux/Lac de Saint-Pardoux (Site de Fréaudour), 3 ind. (type fem.), le 18/12/2011, (Ph. Hubert).

Les cinq mentions du début de l'année s'inscrivent dans la continuité de l'afflux des Harles bièvres noté en novembre et décembre 2010. Les deux mentions de fin 2011 sont conformes à la période de présence de l'espèce en Limousin. Le groupe de 15 individus est remarquable.



Harles bièvres, *Mergus merganser*, Saint-Pardoux (87), février 2011 (Ph. Hubert)

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (2/2 - 1/1).

Niche en Islande et est présent principalement le long des côtes au passage et en hiver, parfois sur les grands plans d'eau. Il arrive en Europe occidentale de la fin octobre jusqu'en décembre et remonte en mars-avril. Hiverné le long des côtes du nord de la Scandinavie, à la Grande-Bretagne et de la Mer du Nord jusqu'au Portugal.

Corrèze – Saint-Merd les Oussines/étang des Oussines, H1, du 24/12/2011 au 02/02/2012, photo (R. Petit, G. Labidoire).

Apparition à une date classique, l'observation de cet oiseau sur le plateau de Millevaches durant une grande partie de l'hiver est assez inattendue.



**Plongeon imbrin, *Gavia immer*,
Saint-Merd-les-Oussines (19),
décembre 2011 (R. Petit).**

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (3/3 - 1/1).

Niche de l'Europe à l'Asie et ponctuellement en Afrique du Nord, inféodé aux grandes roselières avec un régime hydrique stable. Les populations d'Europe occidentale sont migratrices partielles.

Corrèze – Tarnac/étang du Moulin de Chabanne, ind., le 02/03/2011, photo (R. Petit).

L'espèce est régulière en migration sur ce site, un individu y a déjà été observé le 11 octobre 2010, mais le Butor étoilé n'est plus nicheur dans la région.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (3/5 – 3/3).

Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord. Hiverné principalement en Afrique subsaharienne.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., internup., le 29/08/2011 (J. Moulinat).

Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, ad., le 02/05/2011 (F. Desage).

– Lussac-les-Eglises/étang de Murat, ad., nupt., le 04/06/2011, photos (C. Luciano, M. Menant).

Si l'observation du Crabier chevelu devient régulière sur les étangs du bassin de Gouzon, les 2 autres données, bien que conformes à la phénologie migratoire de l'espèce, sont assez exceptionnelles avec notamment cet individu observé en plein centre-ville de Limoges.



**Crabier chevelu, *Ardeola ralloides*,
Lussac-les-Eglises (87), juin 2011
(M. Menant).**

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (2/2 – 1/1).

Niche de façon ponctuelle dans le Paléarctique et en Inde au-dessous de 55° de latitude nord. Les populations d'Europe occidentale hivernent principalement sur le pourtour méditerranéen et en

Afrique du nord.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., internup., le 17/08/2011 (D. Naudon *et al.*).

Ces 3 dernières années, la R.N.N. de l'étang des Landes est le seul site du Limousin où la Spatule blanche a été observée.

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (1/1 - 1/1).

D'origine africaine, généralement sédentaire, il étend peu à peu son domaine vers le nord jusqu'en Aquitaine (bassin de l'Adour notamment).

Haute-Vienne – Flavignac/Cessagnet, le 21/10/2011 (P. Précigout, Ch. Couartou, J.-L. Vareille *et al.*)

Ce petit rapace, pour la seconde année soumis à homologation régionale, est mentionné pour la troisième année consécutive à Flavignac.

VAUTOUR PERCNOPTERE *Neophron percnopterus* (0/0 - 1/1).

Se reproduit en Afrique, des Iles du Cap-Vert jusqu'à l'Asie centrale en passant par le sud de l'Europe. Les populations européennes hivernent au sud du Sahara.

Haute-Vienne – Flavignac/Eynanças, ad., le 10/05/2011 (P. Précigout).

Une des toutes premières mentions limousines pour cette espèce bien rare, en France, au-delà de la chaîne pyrénéenne et des collines méditerranéennes.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (6/34 – 2/6).

Niche en Europe entre 35° N et 45° N, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En France, en dehors des zones de réintroduction (Grands Causses, Alpes du sud) et des Pyrénées où l'espèce se reproduit, le Vautour fauve est erratique. Des mouvements vers le nord de l'Europe ont lieu régulièrement depuis quelques années au printemps et en début d'été.

Corrèze – Peyrelevade/La Jasse, ad., le 22/04/2011, photo (F. Taboury).

Creuse – Noth/Puy de Roche, Puy de Feyre, 2 imm., le 25/05/2011 et le 26/05/2011, 5 ind. observés sur le même site le lendemain (M. Richer).

Cette espèce est de plus en plus fréquente en Limousin, les populations françaises étant en expansion et les Grands Causses ne sont pas si loin.



**Vautour fauve, *Gyps fulvus*,
Peyrelevade (19), avril 2011
(F. Taboury).**

AIGLE ROYAL *Aquila chrysaetos* (1/1 - 1/1).

Se reproduit des Pyrénées et des Iles Britanniques jusqu'à la Sibérie occidentale et à l'Altai. Niche dans les régions montagneuses du sud de la France où il est rare. Les jeunes sont de tendance erratique et ceux d'Europe septentrionale migrent vers le sud en hiver.

Corrèze – Monceaux-sur Dordogne/Vallée du ruisseau du Malefarge, ad., le 27/04/2011 (P. Marthon, A. Reynier).

En Auvergne, les observations d'Aigles royaux sont de plus en plus fréquentes. L'observation de cet individu adulte au mois d'avril en Corrèze est peut-être à relier avec la présence d'un couple nouvellement implanté dans le Cantal.

FAUCON CRECERELLETTE *Falco naumanni* (0/0 – 1/1).

En Europe, reproduction dans la péninsule ibérique et çà et là entre l'Espagne et la Grèce. Suite à l'effondrement des populations, l'espèce fait l'objet de plans de restauration et de conservation sur ses sites de reproduction mais aussi au Sénégal sur les lieux d'hivernage.

Corrèze – Beynat/Chassancet, 1 ad., mâle, et 1 fem. probable (non identifiée avec certitude), le 16/03/2011 et le 17/03/2011, (2 jours supplémentaires pour la probable fem.), photos (P. Marthon).

Première mention régionale pour cette espèce, sa présence est probablement imputable à un fort vent du sud qui a poussé ces oiseaux bien au-delà de leur aire de répartition classique.

Faucon crécerellette, *Falco naumanni*, mâle, Beynat (19), mars 2011 (P. Marthon).



Faucon crécerellette, *Falco naumanni*, probable femelle, Beynat (19), mars 2011 (P. Marthon).

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (3/4 - 1/1).

Migratrice ; niche de l'Europe à la Sibérie centrale ; hiverne surtout en Afrique tropicale, rarement dans le sud-ouest de l'Europe ; départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ind., le 28/08/2011 (R. Bussière).

La répétition des contacts, chaque été, à la R.N.N. de l'étang des Landes, laisse envisager une nidification régulière sur le site.

ECHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (1/3 - 2/4).

Niche en Eurasie et en Afrique, migratrice assez commune sur le littoral atlantique et méditerranéen. Les oiseaux européens hivernent généralement en Afrique, très rarement en France.

Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, mâle, + 1A, le 02/04/2011, photo (P. Marthon).

– Aubazine/étang du Coiroux, 3 ind. (mâle et 2fem.) + 1A, le 21/04/2011, photo (P. Marthon).

Ces 2 mentions sont conformes à la phénologie de la migration prénuptiale pour cette espèce rare mais régulière dans la région.



Echasses blanches, *Himantopus himantopus*, Aubazine (19), avril 2011 (P. Marthon).

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta* (7/41 - 2/7).

Migratrice, passe l'hiver principalement en Afrique, mais aussi en Europe. Niche dans les estuaires, les baies, les marais salants et autres zones humides. Les passages migratoires sont étalés.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 5 ind., le 01/04/2011 (M. & J. Coq *et al.*).

Haute-Vienne – Saint-Pardoux/Lac de Saint-Pardoux (Site de Fréaudour), 2 ind., le 17/12/2011, photo (L. Fleytou).

L'observation printanière est conforme à la logique migratoire de l'espèce, par contre le contact hivernal est plus étonnant, il fait suite à une période particulièrement tempétueuse sur la côte Atlantique.



Avocettes élégantes, *Recurvirostra avosetta*, Saint-Pardoux (87), décembre 2011 (L. Fleytou).

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola* (0/0 – 1/1).

Espèce très rare et menacée, niche du sud de l'Europe au Pakistan. En migration, fréquente tout type de milieux humides. Hiverné en Afrique.

Haute-Vienne – Saint-Martin-le-Mault/étang de la Mazère, ad., du 14/04/2011 au 17/04/2011,

photo (S. Vincent, découvreur Th. Chatton, Ph. Hubert, J. Sottier, *et al.*).

Cette observation, la première mention régionale de l'espèce, est particulièrement précoce à nos latitudes où la majorité des contacts s'effectue généralement en mai.



Glaréole à collier, *Glaucopis pratincola*, Saint-Martin-le-Mault (87), avril 2011 (J. Sottier).

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (0/0 - 1/2).

Se reproduit dans l'Arctique : en Sibérie, au nord-est du Canada et au Groenland. En France, cet oiseau est un hivernant commun sur le littoral mais rare à l'intérieur des terres.

Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, 2 ind., 1A ou ad., mue, du 03/05/2011 au 04/05/2011 (G. Caucau).

Cette observation est remarquable, l'espèce est très rare à l'intérieur des terres.

BECASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (2/4 - 1/2).

Niche dans l'Arctique, de l'extrême nord de la Norvège jusqu'en Sibérie orientale. Hiverné sur les côtes méditerranéennes et surtout en Afrique. S'observe surtout d'août à octobre lors de la migration postnuptiale ; plus rare en migration pré-nuptiale d'avril à mai.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 ind., le 04/09/2011 (E. Dupoux).

Lors du passage postnuptial, l'espèce est régulière à l'étang des Landes, plus rare ou moins documentée ailleurs. La migration de printemps s'effectue plus à l'est.

BECASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii* (1/2 - 1/1).

Niche dans l'Arctique, du sud de la Norvège à l'extrême est de la Sibérie, contacté généralement lors de la migration postnuptiale. Hiverné essentiellement en Afrique sahélienne.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ind., le 26/10/2011 (A. Virondeau, J.P. Lécivain).

Mention tardive pour cette espèce dont le passage postnuptial a principalement lieu en août / septembre.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (1/3 - 2/6).

Nicheur à l'extrême nord de la Sibérie centrale, il hiverné principalement en Afrique, et parfois sur le pourtour méditerranéen. En France, il fréquente essentiellement le littoral au passage (notamment façade atlantique en migration postnuptiale).

Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, 4 juv., le 09/09/2011, photo (G. Caucau *et al.*)

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 juv., du 12/09/2011 au 15/09/2011 (F. Desage, Ch. Mercier, P. Marthon).

Ces observations s'inscrivent dans la logique migratoire de cette espèce en Limousin où généralement des juvéniles sont notés à cette période.



**Bécasseau cocorli, *Calidris ferruginea*,
Neuvis (19), septembre 2011 (G.
Caucal).**

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (3/3 - 1/1).

Reproduction de la Fennoscandie à la Sibérie orientale, l'essentiel de l'hivernage se déroule en Afrique centrale, quelques cas d'hivernage sont relevés en France au sud d'une ligne Bordeaux Lille.

Corrèze – Aubazine/Rochesseux, ind., le 28/02/2011 (P. Marthon).

Les passages migratoires sont peu ressentis, mais cette espèce très discrète passe probablement inaperçue.

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (0/0 – 1/1).

Niche du nord de la Scandinavie et de la Russie d'Europe jusqu'à l'Ienisseï. En France, migrateur et hivernant régulier le long du littoral atlantique et de la Manche, rare à l'intérieur des terres.

Corrèze – Neuvis/Lac de Neuvis, ind., +1A., le 17/04/2011 et le 18/04/2011, photo (J. Barataud, S.Heinerich).

Ce contact est d'autant plus notable que l'est corrézien est éloigné du couloir migratoire traditionnel de cette espèce.



Barge rousse, *Limosa lapponica*, Neuvis (19), avril 2011 (J. Barataud)

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (1/1 - 1/1).

Niche ponctuellement en Alaska, au nord-est du Canada et sur le littoral arctique du Groenland à l'Eurasie. Hiverné le long du littoral européen, dans le Bassin Méditerranéen et en Afrique. Les déplacements migratoires ont lieu de la mi-mars à début juin, et de fin juillet à novembre.

Corrèze – Soursac/Le Mons, ind., juv., du 31/08/2011 au 06/09/2011, photo (R. Jourde).

La présence de cet oiseau immature durant une semaine à proximité des bâtiments d'une ferme est vraiment surprenante !



Tournepierrre à collier, *Arenaria interpres*, Soursac (19), septembre 2011 (R. Jourde).

GOELAND RAILLEUR *Chroicocephalus genei* (0/0 - 1/1).

Niche du Sénégal à la mer Méditerranée et jusqu'au Moyen-Orient, Kazakhstan et Pakistan, hiverné en Méditerranée.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ind., le 12/05/2011 (M. Thévenet).

Seconde mention régionale de cette espèce, les rares observations à nos latitudes sont généralement réalisées au printemps.

MOUETTE PYGMEE *Hydrocoloeus minutus* (5/6 - 3/4).

Migratrice ; niche de l'est de la Finlande à la Sibérie orientale, et ponctuellement en Europe centrale jusqu'au Pays-Bas à l'ouest. Hiverné sur toutes les côtes d'Europe de l'Ouest, du Maghreb et de la mer Noire.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., nupt., le 12/04/2011 (A. Virondeau).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., le 17/04/2011 (S. Vincent).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2ind, ad. et H1, le 23/12/2011 (A. Virondeau).

La R.N.N. de l'étang des Landes est un des rares sites du Limousin où la Mouette pygmée est contactée chaque année lors des deux phases migratoires.

MOUETTE MELANOCEPHALE *Larus melanocephalus* (4/6 - 2/2).

Migratrice partielle ; niche en Europe méridionale mais en augmentation vers le nord-ouest du continent. Elle hiverné le long de toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.

Corrèze – Troche/indéfinit, ind., juv., conduit au Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage, le 26/07/2011 (D. Naudon, M. Maury).

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., 2A., le 12/04/2011 (A. Virondeau).

Régulièrement l'espèce est observée en Limousin, mais toujours de manière très ponctuelle.

GOELAND BRUN *Larus fuscus* (2/2 - 1/1).

Migrateur partiel ; la sous-espèce "graellsii" niche de la Bretagne à la Grande-Bretagne et à la Scandinavie, localement sur la côte ibérique ouest ; en hiver, va au large jusqu'en Islande et au Canada. La sous-espèce "fuscus" nordique est séparée de la précédente par une population intermédiaire "intermedius" nichant aux Pays-Bas.

Haute-Vienne – Saint-Yreix-la-Perche/Ecole Ravel, ind., le 21/03/2011 (J.-M. Célérier).

Date classique pour l'observation de l'espèce en migration pré-nuptiale, rare à l'intérieur des terres. En général, la sous-espèce rencontrée dans nos contrées est *graellsii*.

GUIFETTE LEUCOPTERE *Chlidonias leucopterus* (0/0 - 1/1).

Migratrice ; niche du nord-ouest de l'Italie et de la Pologne jusqu'en Sibérie orientale (région de l'Amour) ; hiverne en Afrique tropicale. Départs de juillet à novembre, retours en avril-mai.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, ad., le 10/05/2011 (S. Bur).

Généralement l'espèce est observée en phase migratoire au printemps, mais elle est très rare dans notre région.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (1/1 - 1/1).

Migratrice ; niche dans la quasi-totalité de l'Europe de l'Ouest, y compris le long des fleuves et autour des lacs. Hiverne sur l'ensemble des côtes d'Europe et d'Afrique, éventuellement au large. Arrive en mars et repart en octobre.

Creuse – Noth/étang de la Grande Casine, ind., le 30/03/2011 (M. Richer).

En Limousin, cette espèce, bien que rare, est la plus commune des sternes. La date de l'observation est conforme à sa période migratoire.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius* (0/0 – 1/1).

Se reproduit dans quelques régions d'Europe méridionale, du Moyen-Orient et d'Afrique. En France quelques centaines de couples nichent dans le Languedoc et la Provence. Hiverne en Afrique centrale. Départ en juillet-septembre, retour en février-mars.

Corrèze – Aubazine/Pauliat-Haut, ind., 1A, les 23/07/2011 et 24/07/2011 (P. Marthon).

Première mention régionale pour cette espèce, ces dernières années, l'espèce fait l'objet de quelques mentions en Aquitaine et en Charente-Maritime.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (0/0 – 1/1).

Surtout migrateur, niche dans la moitié sud de l'Europe, hiverne principalement en Afrique centrale du Sénégal à la Somalie mais aussi dans le sud de l'Espagne, la Sardaigne, l'Italie et la Grèce. Il nous quitte en septembre-octobre pour revenir en février-avril.

Corrèze – Eyburie/Les Planches de Chaleix, ind., le 01/06/2011 (D. Crémoux, J. Lafond, F. Beylie, S. Chassagne).

Présence étonnante de cet oiseau au nord-ouest corrézien, l'espèce est probablement sous-prospectée au sud du département.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (2/2 – 4/4).

Migrateur partiel ; niche dans le nord et le nord-est de l'Europe, localement dans l'ouest de la France. Hiverne du Danemark au Maroc, dans les îles Britanniques, localement en pays méditerranéen.

Creuse – Genouillac, ind., du 27/11/2011 au 29/11/2012, (M. Bourdeaux).

Haute-Vienne – Flavignac/Eynanças, 2 ind., le 20/10/2011 (P. Précigout, J.-B. Couturier, J.-L. Vareille).

– Flavignac/Eynanças, ind., le 29/10/2011 (P. Précigout, J.-L. Vareille *et al.*).

Les 4 citations concernent des migrants. Depuis 2002, l'espèce a été contactée 8 fois sur le site de migration de Flavignac dont sept fois lors de la seconde quinzaine d'octobre.

ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (0/0 - 2/2).

Migrateur, il niche dans le sud et l'est de l'Europe (en France, confiné aux départements méditerranéens). Il hiverne dans la moitié sud de l'Afrique. Départs en août-octobre, retours en mars-mai.

Corrèze – Saint-Bonnet-les-Tours de Merle/Le Puy des Fourches, ad., le 18/08/2011 (V. et S. Marsaudon).

Creuse – Charron/Non précisé, ind., +1A., du 22/08/2011 au 24/08/2011 (E. Dupoux, A. Bodin).

Ces deux mentions concernent 2 individus observés au delà de leur aire de répartition habituelle. Ce phénomène se produit généralement lors de la dispersion postnuptiale.

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (3/3 - 2/2).

Migrateur ; niche dans le Paléarctique occidental jusqu'en Iran ainsi qu'en Sibérie et au nord-ouest du Kazakhstan. Hiverne au Sahel et en Afrique de l'Est, départ en août-octobre, retour en avril-mai.

Corrèze – Beynat/Chassancet, ad., le 17/04/2011, photo (P. et P. Marthon).

Haute-Vienne – Saint-Priest la feuille/La Berthonnerie, ad., le 14/04/2011 (Ch Lyons).

Ces contacts sont réalisés lors du pic migratoire de printemps, toutefois ce pipit pourrait être nicheur rare en Limousin, dans le sud corrèzien.

JASEUR BOREAL *Bombycilla garrulus* (1/1 - 1/2).

Niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Hiverne vers le sud et l'ouest jusqu'en Belgique, dans le nord de la France, les îles Britanniques, la Suisse et en Europe centrale. Certaines années des invasions périodiques se produisent de décembre à mars.

Haute-Vienne – Limoges/Hameau des Landes, 2 ind., le 06/01/2011 (D. Naudon).

Cette observation coïncide avec l'invasion de Jaseurs boréaux constatée en France lors de l'hiver 2010/2011, un autre oiseau avait été vu en Haute-Vienne fin décembre 2010.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris* (2/2 - 2/3).

Se reproduit des montagnes de l'Afrique du nord aux Carpates et à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France. Il est en grande partie sédentaire, mais d'octobre à avril, il a tendance à descendre hiverner dans la plaine proche de ses massifs ou plus au sud.

Haute-Vienne – Saint-Gilles-les-Forêts/Mont Gargan, 2 ind., le 30/10/2011 et le 31/10/2011, photo (A. Gendeau, L. Fleytou).

– Limoges/Jardins de l'évêché, ind., du 26/11/2011 au 09/02/2012, photo (F. Desage, *et al.*).

Année similaire à 2010, toutefois un afflux d'Accenteurs alpins est apparu dans les départements voisins (Vienne, Charentes) fin 2011.



Accenteur alpin, *Prunella collaris*, Saint-Gilles-les-Forêts (87), octobre 2011 (A. Gendeau).

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (16/31 – 1/1).

Largement répandue en Europe, migratrice. Niche ponctuellement en Europe de l'Ouest sauf en Italie et sur les îles Britanniques. Hiverne en Espagne, au Maroc, du Sahel à la Somalie.

Haute-Vienne – Saint-Priest-la-Feuille/La Berthonnerie, La Sabelle, ad., mâle, nupt. le 13/03/2011 (Ch Lyons).

Chaque année, essentiellement lors de la migration prénuptiale, la gorgebleue est mentionnée dans la région. Notons que les données de baguage de l'étang des Landes ne nous sont malheureusement pas parvenues.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (18/100 – 13/57).

Migrateur total. Niche de l'Afrique du nord à travers toute l'Europe jusqu'en Laponie et vers l'est jusqu'à la Sibérie occidentale, au sud atteint l'Iran et la Turquie. Hiverne en Afrique tropicale. Départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 14 ind. (+1A 4ind., 1A 10ind.), le 13/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 6 ind. (+1A ind., 1A 5ind.), le 14/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 1A, le 15/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 5 1A, le 16/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 11 1A, le 17/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 1A, le 18/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 11 1A, le 27/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 1A, le 28/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 4 1A, le 29/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 1A, le 30/08/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

– Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 1A, le 02/10/2011, bagué SPOL halte migratoire (G. Pallier).

Haute-Vienne – Limoges/Station d'épuration, ind., le 12/04/2010 (F. Desage).

– Verneuil-sur-Vienne/Mayéras, 1A, le 01/07/2011, bagué STOC capture (M. André).

L'espèce semble régulière en migration sur le site de Limoges, un individu avait déjà été observé en avril 2010. L'espèce n'était pas connue sur le site de Verneuil-sur-Vienne, où la présence d'un jeune début juillet est troublante. A l'étang des Landes, on peut considérer que la majorité des oiseaux bagués étaient en halte migratoire. Des adultes sont attrapés dans la première quinzaine d'août, puis ce sont principalement des jeunes qui migrent encore dans la seconde quinzaine d'août. A noter, un individu tardif début octobre.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca* (0/0 - 1/1).

Migratrice ; nicheuse du Nord-Est européen (manque en Espagne, en Italie et dans la moitié sud-ouest de la France, en Ecosse et en Irlande). Hiverne en région sahélienne du Niger à l'Ethiopie. Départs en juillet-octobre et retours en mars-mai.

Corrèze – Aubazine/étang du Coiroux, ind., le 10/03/2011 (P. Marthon).

Observation particulièrement précoce, cette fauvette est seulement de passage en Limousin, du fait de sa discrétion elle doit souvent passer inaperçue.

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1/1 - 1/1).

Sédentaire ou migratrice partielle ; niche dans les régions méditerranéennes sauf en ex-Yougoslavie et en Grèce. Remonte dans la moitié ouest de la France en Bretagne, dans le Cotentin, jusque dans le Sussex (Angleterre) et les îles anglo-normandes.

Haute-Vienne – Château-Chervix/Lande de la Flotte, ind., du 11/04/2011 au 22/01/2012, photo (S.

Morelon, J. Minjoulat).

Tout au long de l'année la Fauvette pitchou a été contactée sur la Lande de la Flotte, qui est un des rares sites du Limousin où il est possible de la rencontrer. Dans notre région, elle est représentée par la sous-espèce *dartfordiensis*.



**Fauvette pitchou, *Sylvia undata*,
Château-Chervix (87), avril 2011, (J.
Minjoulat).**

POUILLOT IBERIQUE *Phylloscopus ibericus* (0/0 - 1/1).

*Jusqu'à ces dernières années, ce taxon était considéré comme une sous-espèce du Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*. Sur la base de la génétique, de sa voix et de ses mœurs, récemment il a été élevé au rang d'espèce. Ce pouillot est essentiellement confiné à l'extrême ouest des Pyrénées et à l'ouest de la Péninsule ibérique, toutefois quelques bastions sont mentionnés dans le sud de l'Espagne et en Afrique du nord.*

Corrèze – Sérandon/Gratte Bruyère, ad., +1A, du 30/04/2011 au 31/05/2011, enregistrement du chant (J. Barataud).

Cette observation est d'autant plus remarquable que cet oiseau a été contacté régulièrement durant 1 mois.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (0/0 - 3/6).

Les oiseaux les plus septentrionaux sont migrants. Ce sizerin niche dans l'arc alpin et le nord de l'Europe (îles Britanniques, régions littorales de la mer du Nord, Scandinavie), jusque dans l'Arctique. Hiverné plus au sud et dans l'ouest de la France sans atteindre les régions méditerranéennes. Mouvements migratoires en septembre-novembre, retours en mars-mai.

Corrèze – Palisse/Petit étang au nord de "Palisse Haute", ind., le 15/01/2011 (S. Heinerich, *et al.*).

– Davignac/L'Arbre Fourat, 2 ind., le 03/03/2011 (R. Petit).

Creuse – Ajain/étang de Signolles, 3 ind. (peut-être 5), le 15/01/2011 (E. Dupoux).

Généralement, en Limousin, les contacts avec cette espèce se produisent lors du premier trimestre. Ces contacts s'inscrivent dans la période d'observation normale de l'espèce.

BOUVREUIL PIVOINE TROMPETTEUR *Pyrhula pyrrhula pyrrhula* (4/13 - 3/6).

Ces oiseaux émanant de la taïga russe envahissent périodiquement l'Europe de l'Ouest en automne et en hiver. Dans la nature, seul leur cri décrit comme un coup de klaxon sonore les distingue de la sous-espèce nominale.

Creuse – Evaux-les-Bains/Ayen, ind., fem, le 19/01/2011 (P. Duboc).

– Evaux-les-Bains/ Ayen, ind, dans un groupe de 4, seul un a crié, le 17/02/2011 (P. Duboc).

– Tardes/ Le Point du Jour, 4 ind, dont 1 fem., le 17/02/2011 (P. Duboc).

Déjà en décembre 2010, 13 individus avaient été signalés dans la région, cet hiver ayant été particulièrement attractif pour cet oiseau. Notons la répartition nord-est des observations.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (4/15 - 1/1).

Migrateur ; se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo et jusqu'à 100° de latitude est. Hiverné du Sahel au Soudan. Départ fin août-octobre, retour avril-mai.

Haute-Vienne – Saint-Priest-la-Feuille/Fermes des Grands Bois, ad, mâle, le 15/04/2011 (S. Vincent).

Chaque année, lors de la migration prénuptiale, quelques individus sont contactés dans la région.

DONNEES ACCEPTEES POUR L'ANNEE 2011 DES ESPECES DES CATEGORIES D et E (espèces dont l'origine sauvage est douteuse).

TADORNE DE CASARCA *Tadorna ferruginea* (2/2 - 2/2).

Rare à l'état sauvage, les individus observés en Europe occidentale sont souvent échappés de captivité.

Haute-Vienne – Azat le Ris/Le Grand étang, cple, le 11/02/2011 (Ph. Goursaud).

L'espèce est régulièrement contactée, souvent à proximité d'élevages.

CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (1/2 - 2/2).

Espèce asiatique, populations férales installées en Europe occidentale. A l'état sauvage, fréquente les lacs et les rivières aux berges boisées.

Corrèze – Malemort sur Corrèze/proximité supermarché, ind., mâle, le 16/01/2011 (C.Vidal, B. Faugeras).

– Aubazine/étang du Coiroux, ind., mâle, internupt. le 21/09/2011 et le 27/09/2011, photo (P. Marthon).

L'oiseau de Malemort est observé chaque hiver depuis 2008. Généralement ces oiseaux sont des échappés de captivité mais parfois certains individus sont issus des populations migratrices des îles britanniques.

PERRUCHE A COLLIER *Psittacula krameri* (0/0 - 2/2).

Nicheuse en Afrique de l'Ouest et centrale ainsi qu'en Asie, elle a été introduite dans différents pays d'Europe occidentale.

Haute-Vienne – Limoges/Parc Victor Thuillat, ind., le 24/03/2011 (Ph. Hubert).

Corrèze – Ussel/Av. Henri de Jouvenel, ind., mâle, du 14/07/2011 au 05/11/2011 (Ch. Variéras *et al.*).

Il s'agit probablement d'oiseaux échappés de captivité. Les populations s'accroissent considérablement dans de nombreuses régions notamment en Ile-de-France.



Perruche à collier, *Psittacula krameri*, Ussel (19), juillet 2011, (Ch. Variéras).

DONNEES DE 2011 NON HOMOLOGUEES

Le CHR rappelle que la non homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur. Elle est généralement induite par le manque d'éléments descriptifs, voir l'absence totale de description, il est donc conseillé d'apporter le plus d'informations possibles même si l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

Creuse – Chambon sur Voueize/bourg, ind., le 06/05/2011, très probablement cette espèce mais l'absence de description ne permet pas d'homologuer l'observation.

GLAREOLE A COLLIER *Glareola pratincola*,

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, imm., le 14/05/2011, description insuffisante et l'apparition d'un individu présentant un plumage juvénile à cette date est improbable.

BECASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea*

Corrèze – Neuvic/Lac de Neuvic, 1 juv., le 09/09/2011, confusion avec un Bécasseau variable.

GOELAND CENDRE *Larus canus*

Corrèze— Soursac/Amont Barrage de l'Aigle, ind., le 05/07/2011, la description est insuffisante pour certifier cette espèce à une date de présence très inhabituelle en Limousin.

COCHEVIS HUPPE *Galerida cristata*

Corrèze – Beynat/Chassancet, 3 ind., le 17/08/2011, les critères énoncés n'éliminent pas un risque de confusion avec l'Alouette des champs.

BOUVREUIL TROMPETTEUR *Pyrhula pyrrhula pyrrhula*

Haute-Vienne – Saint-Yreix la Perche/bourg, ind., le 07/02/2011, la description du cri ne correspond pas au cri typique du Bouvreuil trompetteur.

OBSERVATIONS HOMOLOGUEES DES ANNEES ANTERIEURES

Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la date de sa création le 01/01/2009.

OBSERVATIONS HOMOLOGUEES DE 2009

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

Haute-Vienne – Oradour sur Glane, 24 ind., le 25/08/2009 (D. Naudon, R. et M.-L. Naudon).

AVOCETTE ELEGANTE *Recurvirostra avosetta*

Haute-Vienne – Saint Pardoux/Lac de Saint-Pardoux, site de Santrop, 9 ind., le 11/01/2009 (D. Naudon).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata*

Haute-Vienne – Cieux/Lande de Ceinturat, ind., le 02/01/2009 (D. Naudon).

OBSERVATIONS HOMOLOGUEES DE 2010

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 ad., le 29/06/2010 (S. Bur, J. Moulinat).

MOUETTE PYGMEE *Hydrocoloeus minutus*

Creuse – Lussat/R.N.N. de l'étang des Landes, 2 ad, internup., le 29/11/2010 (S. Bur, J. Moulinat).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima*

Corrèze – Davignac/L'Arbre Fourat, ind., mâle, le 25/04/2010, photo (R. Petit).



**Bergeronnette printanière flavéole,
Motacilla flava flavissima, Davignac
(19), avril 2010 (R. Petit).**

REMERCIEMENTS

Le CHR du Limousin remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à sa bonne marche :

- *Tous les observateurs et les photographes qui sont à la base de son fonctionnement,*
- *La SEPOL pour son soutien logistique et matériel,*
- *Mme Françoise Quillard pour sa participation à la diffusion des fiches au sein du CHR,*
- *Marc Duquet pour son avis sur la détermination du Faucon crécerellette femelle.*

BIBLIOGRAPHIE

Dubois Ph.J., Le Maréchal P., Olios G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, 560 pages.

SEPOL, 1993. *Atlas des Oiseaux Nicheurs en Limousin*. Editions Lucien Souny.

Svensson L, Mullarney K. & Zetterstrom D., 2010. *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé.

Encyclopédie multimédia des oiseaux GEO. A la découverte de tous les oiseaux d'Europe. Editions 2004, Montparnasse multimédia.

Site internet : <http://www.oiseaux.net/>