



Les Oiseaux Rares en Limousin année 2012



Sizerin flammé, *Carduelis flammea ssp. cabaret*, mâle, Saint-Étienne-aux-Clos (19),
octobre et novembre 2012 Cl. et J. Pappalardo

4^{ème} rapport du Comité d'Homologation Régional du Limousin

Pierre Marthon et le CHR du Limousin

PRÉAMBULE

Ce quatrième rapport du Comité d'Homologation Régional (CHR) est la synthèse des observations ornithologiques rares survenues lors de l'année 2012 en Limousin. Par ailleurs, deux observations limousines homologuées par le Comité d'Homologation National (CHN) en 2012 sont répertoriées à la fin de ce document.

Le CHR a pour but de récolter et d'archiver des données circonstanciées d'espèces rares, occasionnelles et hors dates de présence normale dans la région Limousin, afin de préciser leur statut à l'échelle régionale. Ces observations donnent lieu à la rédaction et la publication d'un rapport, mis à disposition de l'ensemble de la communauté ornithologique. Le CHR du Limousin transmet également les observations régionales d'espèces rares sur le plan national au Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR).

Depuis sa création le 01/01/2009, la base de données du CHR est riche de près de 800 données, 89 espèces sont concernées.

La liste des espèces concernées ainsi que les fiches d'homologation sont disponibles sur les sites de la SEPOL et de la LPO Corrèze.

Les fiches renseignées doivent être transmises au secrétariat du CHR : chrlimousin@hotmail.fr ou par courrier à l'adresse : SEPOL - CHR, 11 rue Jauvion 87000 Limoges.

Le CHR Limousin est composé des 9 membres suivants : Raphaël Bussière, Fabrice Desage, Christian Doucelin, Pascal Duboc, Nicolas Gendre, Pierre Marthon (secrétaire), Gilles Pallier, Jérôme Sottier, Anthony Virondeau (président).

LA RÉUNION PLÉNIÈRE

Elle s'est tenue le 29 septembre 2013 à Limoges, les points suivants ont été abordés :

- Fiches en suspens et rapport 2012

Après avoir statué sur les fiches en suspens, nous avons examiné la mise en forme et le contenu du rapport 2012. Quelques remarques de syntaxe et précisions ont été apportées aux monographies. Le classement en catégories A, C, E pour la présentation du rapport est entériné. A l'avenir, si pour une espèce donnée, des individus d'origine captive (C ou E) et des individus d'origine sauvage (A) sont rencontrés la même année, les données seront réparties dans les deux catégories (avec une comptabilité adaptée).

- Aménagements apportés à la liste des espèces à homologuer :

- Suite au déclassement par le Comité d'Homologation National, 4 nouvelles espèces ont été intégrées à la liste régionale des espèces homologables : Busard pâle *Circus macrourus*, Buse pattue *Buteo lagopus*, Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* (à l'exception de la sous-espèce *kumlieni*, qui reste à homologuer nationalement), Étourneau roselin *Pastor roseus*. On notera que parmi ces 4 espèces, 3 ont déjà été observées en Limousin par le passé.

- A l'instar des 6 espèces déjà concernées (Echasse blanche, Avocette élégante, Bécasseau minute, Mouette pygmée, Gorgebleue à miroir et Phragmite des joncs), il a été décidé d'accepter les données sans fiche d'homologation à partir du 1^{er} janvier 2014 pour la Sterne pierregarin *Sterna hirundo* sur la commune de Lussat (23). Cette

déroger a pour objectif de ne pas multiplier les fiches sur ce secteur, ces espèces y étant vues de façon relativement régulière. Ces 7 espèces seront toujours prises en compte dans les rapports annuels du CHR, les données recueillies à Lussat étant incluses.

- la prise en compte des observations d'espèces plus communes effectuées à des dates extrêmes a été entérinée. La base de données de la SEPOL sert de référence pour déterminer le caractère extrême d'une date d'observation.

- **Les observations récurrentes** d'espèces échappées de captivité sur un même site seront acceptées sans fiche d'homologation et enregistrées dans la base de données.

- **Renouvellement des membres du comité d'homologation.**

- Le renouvellement des membres est abordé dans l'objectif d'instaurer une rotation et de permettre l'arrivée de nouveaux membres. Le nombre maximum de membres reste de 9. Le renouvellement du comité concernera un membre par an. Les membres sortants ont la possibilité d'être réélus s'ils se représentent. Le comité lance chaque année un appel à candidature par l'intermédiaire de la publication du rapport annuel. Les nouveaux membres sont choisis par le comité au cours de la réunion annuelle (vote) sur la base de leurs compétences dans le domaine de l'ornithologie de terrain.

- Un ordre de renouvellement basé sur l'arrivée de chaque membre dans le comité a été convenu.

- **Appel à candidature.**

Si vous désirez devenir membre du CHR du Limousin vous pouvez déposer votre candidature à chrlimousin@hotmail.fr Vous pouvez également prendre contact avec un membre du comité.

- Répartition des postes.

En 2013, les postes de secrétaire et de président étaient respectivement occupés par Pierre Marthon et Anthony Virondeau. A l'issue du vote, Pierre et Anthony ont été reconduits dans leurs fonctions.

BILAN DE L'ANNÉE 2012

Une nouvelle espèce a fait son apparition en Limousin : le Pouillot à grands sourcils. Parmi les surprises, on retiendra l'observation d'une Mouette de Sabine, espèce qui n'avait pas été observée dans la région depuis 1999. Pour la seconde année consécutive le Faucon crécerellette et le Rollier d'Europe ont été contactés. On notera aussi la 3^{ème} mention régionale du Vautour moine.

Durant l'année 2012, le CHR du Limousin a examiné 123 fiches dont 4 ayant trait aux années précédentes. Le nombre de fiches soumises a fortement augmenté depuis la mise en place du CHR : 2009 (48 fiches), 2010 (74 fiches) et 2011 (87 fiches). Le taux d'acceptation est de 98%. Il oscillait de 94% à 96% les années passées.

Décomposition des fiches reçues par département en 2012 :

départements	Corrèze	Creuse	Haute-Vienne
Nombre de fiches reçues	40	53 dont 52 concernant l'étang des Landes	30

La réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, site emblématique de notre région, est concernée par 52 fiches (44 %), auxquelles s'ajoutent 18 données pour les 6 espèces

qui n'y sont plus soumises à homologation (suite à la réunion plénière de 2012), ainsi que 399 données de baguage.

PRÉSENTATION DES DONNÉES

- Nom français et scientifique, selon l'ordre systématique de la liste des Oiseaux de France établie par la CAF (Commission Avifaunistique Française), diffusée par la LPO et le MNHN.
- Entre parenthèses, les 2 premiers nombres correspondent au nombre de citations suivi du nombre d'individus homologués depuis 2009, année de création du CHR, 2012 exclu. Les 2 derniers nombres représentent le nombre de citations et le nombre d'individus homologués pour l'année 2012,
- Classement selon l'ordre alphabétique des 3 départements,
- Commune/Localité,
- Nombre d'individus (si un, non mentionné),
- Sexe, âge, forme,
- Précision si l'oiseau a été bagué, photographié ou si son chant a été l'objet d'un enregistrement,
- Date du premier contact, et éventuellement celle du dernier,
- Pour les données de baguage, une citation correspond à une journée de capture,
- Les données de baguage sont inscrites en bleu et en italique,
- Commentaires éventuels,
- Les données sont la propriété des observateurs et sont citées comme telles ; figurent dans l'ordre : le nom du rédacteur, éventuellement des photographes puis celui des observateurs cités sur la fiche.
- ** précède les données de 6 espèces observées sur la commune de Lussat (23), où elles ne sont plus soumises à homologation : (Échasse blanche *Himantopus Himantopus*, Avocette élégante *Recurvirostra avosetta*, Bécasseau minute *Calidris minuta*, Mouette pygmée *Hydrocolopus minutus*, Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*, Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*).

Abréviations utilisées :

ad. : adulte - *fem.* : femelle - *cple* : couple - *juv.* : juvénile - *imm.* : immature - *ind.* : individu - *H1* : 1^{er} hiver - *1A* : 1^{ère} année - *+1A* : plus d'un an - *2A* : 2^e année - *nupt.* : nuptial - *internupt.* : internuptial. - *prob.* : probable, *repro* : reproduction, *env.* : environ, *s.p.* : sans précision.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES DES CATÉGORIES A (Espèces présentes en France à l'état sauvage).

OIE RIEUSE *Anser albifrons* (1/2 - 1/1).

Polytypique, l'espèce, nicheuse de l'Arctique, est migratrice. La ssp. flavirostris hiverne en Irlande et dans l'ouest de la Grande-Bretagne. La zone d'hivernage de la ssp. albifrons s'étend de l'Angleterre à la Turquie.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. +1A, du 01/11/2012 au 02/11/2012 (K. Guerbaa).

Hiverne sur le littoral atlantique et en Espagne d'où probablement la présence de cet oiseau. La dernière mention régionale pour cette espèce remonte à décembre 2009.

NETTE ROUSSE *Netta rufina* (4/6 - 1/5).

Monotypique. Migratrice partielle, niche en Espagne et en France, jusqu'en Europe centrale et en Anatolie ; les populations les plus importantes se concentrent de l'est de la Mer Noire à l'Asie centrale. Migrateur à migrateur partiel, hiverne essentiellement dans le bassin méditerranéen.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 5 ind. +1A (3 mâles et 2 fem.), le 22/03/2012 (K. Guerbaa, S. Bur, J. C. Cartes).

L'observation de l'espèce reste accidentelle en Limousin, la RNN de l'étang des Landes est un des rares sites régionaux à pouvoir envisager la reproduction de la Nette rousse qui niche depuis peu dans les régions voisines (Brenne, Auvergne).

GARROT A OEIL D'OR *Bucephala clangula* (1/1 - 2/3).

Polytypique. B. c. clangula niche du nord de l'Europe, à travers la Sibérie, jusqu'au Kamtchaka et au nord-est de la Chine. Les migrations ont lieu en octobre-novembre et en mars-avril. Hiverne sur les plans d'eaux ouverts, le cours des fleuves et en mer près des côtes.

Corrèze - Lissac sur Couze/lac du Causse, mâle ad., le 18/02/2012 (B. Faurie).

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem. ad., du 28/01/2012 au 05/03/2012, 2 fem. ad., le 06/03/2012, puis fem., ad., du 07/03/2012 au 15/03/2012, photo (C. Lambert, A. Virondeau, M. Thévenet, K Guerbaa *et al.*).

Les rares hivernants sont généralement contactés au nord de la Loire et en Charente-Maritime (île de Ré), l'observation du sud corrézien est d'autant plus remarquable. L'étang des Landes a vu la présence constante d'au moins une femelle de fin janvier à la mi-mars.



Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*, Lussat (23), février 2012, C. Lambert.

HARLE PIETTE *Mergellus albellus* (2/2 - 1/1).

Monotypique. Niche sur les lacs et cours d'eau de la taïga de la Suède à la Sibérie orientale. Migrateur et hivernant peu commun, il fréquente tout type de plans d'eau, fleuves et occasionnellement le littoral maritime.

Haute-Vienne - Limoges/sur la Vienne, fem. H1, du 16/02/2012 au 18/02/2012, photos (F. Desage, Ch. Mercier, J. Sottier et S. Touze).

La présence de cet oiseau est concomitante à une période de très grand froid. Notons la particularité de cette observation : cet oiseau a stationné en ville sur la Vienne, ce qui n'est pas habituel mais peut s'expliquer par des températures un peu supérieures, notamment en lien avec le chauffage urbain.



Harle piette *Mergellus albellus*, Limoges (87), février 2012, F. Desage.

HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (0/0 - 1/1).

Monotypique. Niche dans les zones boréales et océaniques d'Europe du Nord, d'Islande, de Grande-Bretagne, de Scandinavie, à l'est jusqu'au nord de la Sibérie. Hiverne le long des côtes d'Europe, d'Atlantique, de Méditerranée Orientale, de la Mer Noire jusqu'à la Mer Caspienne ; fréquente rarement les eaux douces intérieures.

Corrèze - Liginiaac/étang de Neuvic, mâle, ad., le 03/02/2012 (G. Caucal, M. Vérité et al.).

Première mention en Limousin depuis la création du CHR, cette observation dans l'est corrézien est exceptionnelle.

HARLE BIÈVRE *Mergus merganser* (10/42 - 3/7).

Polytypique. M. m. merganser niche de l'Islande, des îles Britanniques et de l'est de la France vers l'est, à travers l'Eurasie, surtout au-delà du 50°N, mais aussi au pied de la chaîne himalayenne. En hiver, fréquente les cours d'eau et les lacs, plus rarement les côtes.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind. ad, mâle et fem., le 22/12/2012 (C. Lambert).

Haute-Vienne - Saint-Junien/barrage de Grandmont, 3 ind., type fem., le 09/02/2012 (G. Labidoire),

- Aixe-sur-Vienne/sur la Vienne, 2 ind., fem. H1 et mâle, le 15/02/2012, photo (S. Touze).

Curieusement malgré un hiver 2011/2012 particulièrement froid, le nombre de mentions pour l'année 2012 est faible, contrairement aux 7 données pour 32 oiseaux de l'année précédente.



Harle bièvre *Mergus merganser*, Aix-sur-Vienne (87), février 2012, S. Touze.

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (3/3 - 2/2).

Monotypique. Niche principalement dans la partie septentrionale de l'Amérique du Nord ; en Europe se reproduit en Islande. Est présent principalement le long des côtes au passage et en hiver, parfois sur les grands plans d'eau. Il arrive en Europe occidentale de la fin octobre jusqu'en décembre et remonte en mars-avril.

Haute-Vienne - Bessines sur Gartempe/étang de la Villemichel, ind. H1, du 17/01/2012 au 18/01/2012 (M. Richer),

- Saint-Pardoux/lac de Saint-Pardoux (Fréaudour), ind., du 11/11/2012 au 29/12/2012 (L. Fleytou).

Espèce de plongeon la plus fréquemment observée en Limousin. Il est observé généralement de novembre à février. Les observations de 2012 ne dérogent pas à la règle.



Plongeon imbrin *Gavia immer*, Saint-Pardoux (87), novembre 2012, F. Taboury.

BUTOR ÉTOILE *Botaurus stellaris* (4/4 - 1/1).

Polytypique. B. b. stellaris, espèce paléarctique, niche en roselière dans l'ensemble de

l'Europe, où les bastions se situent essentiellement à l'Est (Pologne, Ukraine et Russie). Les populations d'Europe occidentale sont migratrices partielles. Celles d'Europe orientale et de Russie hivernent au Moyen-Orient, sur le Bassin Méditerranéen et en Afrique.

Corrèze - Palisse/étang de Charreneuve, ind., le 14/03/2012, photo (J. Barataud).

Le Butor étoilé semble régulier sur cet étang à la mi-mars (15/03/2006 et du 13/03/2010 au 14/03/2010). Etant en régression en Europe, les contacts sont devenus exceptionnels en Limousin où l'espèce ne se reproduit plus depuis de nombreuses décennies.



Butor étoilé *Botaurus stellaris*,
Palisse (19), mars 2012, J. Barataud.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (6/8 - 1/1).

Monotypique. Niche dans le Bassin Méditerranéen, sur le pourtour de la Mer Noire et de la Mer Caspienne, et en petit nombre en Afrique du Nord. Hivernent principalement en Afrique subsaharienne.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad. nupt., le 07/05/2012 (K. Guerbaa).

Cette observation confirme l'attractivité de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes pour le Crabier chevelu, elle maintient l'espoir de voir cet oiseau s'y reproduire un jour.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (3/3 - 2/2).

Polytypique. P. L leucorodia niche de façon ponctuelle dans le Paléarctique et en Inde au-dessous de 55° de latitude nord. Les populations d'Europe occidentale sont en expansion et elles hivernent principalement sur le pourtour méditerranéen et en Afrique du Nord.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A., du 10/10/2012 au 17/10/2012, portant une bague couleur, posée en mai 2012 sur le poussin au Pays-Bas (K. Guerbaa, J. Moulinat, J.C. Cartes, S. Bur),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad. internup., du 20/10/2012 au 07/11/2012, photo (S. Touze, K. Guerbaa *et al.*).

Comme chaque année, l'espèce est contactée à la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, seul site régional d'observation de cette espèce depuis la création du CHR en 2009.



Spatule blanche
Platalea
leucorodia,
Lussat (23),
octobre 2012, S.
Touze.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* (8/40 - 7/28).

Polytypique. G. f. fulvus niche en Europe entre 35° N. et 45° N., en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En France, en dehors des zones de réintroduction (Grands Causses, Alpes du sud) et des Pyrénées où l'espèce se reproduit, le Vautour fauve est erratique. Des mouvements vers le nord de l'Europe ont lieu régulièrement depuis quelques années au printemps et en début d'été.

Corrèze - Confolent Port-Dieu/pont d'Arpiat, 2 prob. immat., le 01/04/2012, photo (J. et Cl. Pappalardo),

- Soursac/viaduc des Rochers noirs, ind., le 09/05/2012, photo (B. Pellegrini, G. Caucal *et al.*),

- Peyrelevade/tourbière de Ribière-Ladre, ind, le 22/05/2012 (R. Petit),

- Peyrelevade/La Vergne-Roux, ind., le 23/05/2012 (O. Villa),

- Soursac/barrage de l'Aigle, 5 ind., le 29/05/2012 (M. André),

- Meymac/tourbière du Longéroux, 17 ind., le 05/06/2012 (R. Petit),

- Chavanac/puy-Peyrat, ind., le 07/07/2012 (R. Petit).

Ces mentions, effectuées aux dates classiques d'observation de l'espèce en Limousin, émanent toutes de la Corrèze, soit du plateau de Millevaches, soit des gorges de la Dordogne.



Vautour fauve, *Gyps fulvus*,
Soursac (19), mai 2012, B.
Pellegrini.

VAUTOUR MOINE *Aegypius monachus* (1/1 - 1/1).

Monotypique. Niche de l'Ukraine à la Chine, en Grèce, en Espagne. Il se reproduit en France où il a été réintroduit avec succès dans les Grands Causses et plus récemment dans le sud-est. Les populations augmentent lentement mais régulièrement. A l'instar du Vautour fauve, il est erratique dans le reste du pays.

Creuse - Gioux et Féniers/Chauderon et Les Pâturaux, ind., le 21/05/2012 (O. Villa).

Cette observation, troisième mention limousine pour cette espèce, est d'autant plus intéressante que le milieu pourrait s'avérer, dans les prochaines décennies, favorable à l'implantation de ce vautour.

FAUCON CRÉCERÉLLETTE *Falco naumanni* (1/1 - 1/1).

Monotypique. Reproduction dans la péninsule ibérique et çà et là entre l'Espagne et la Grèce, et depuis ce pays jusqu'au sud de la Russie à 100°E. En France, suite à l'effondrement des populations, l'espèce fait l'objet d'un plan national de restauration et de conservation sur ses sites de reproduction.

Corrèze - Aubazine/Rochesseux, mâle ad., le 26/03/2012 (P. Marthon).

Cette espèce est observée pour la seconde année consécutive, sensiblement à la même période et à environ 5 kilomètres de distance.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (4/5 - 2/2).

Monotypique. Niche de l'Europe à la Sibérie centrale ; hiverne surtout en Afrique tropicale, rarement dans le sud-ouest de l'Europe ; départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 04/04/2012 (K. Guerbaa, J. Moulinat, S. Bur, J. C. Cartes),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, mâle chanteur, ad., le 23/05/2012 et le 25/05/2012 (K. Guerbaa).

Si une nidification régulière sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes peut-être envisagée, elle reste difficile à prouver. Notons qu'en 1936, Mayaud la signalait nicheuse dans «à peu près sur toute la France» !

ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (3/7 - 2/4).

Polytypique. H. h. himantopus niche en Eurasie et en Afrique, migratrice assez commune sur le littoral atlantique et méditerranéen. Les oiseaux européens hivernent généralement en Afrique, très rarement en France.

Corrèze - Beynat/étang de Miel, 2 type fem. +1A, le 09/05/2012, photo (P et P Marthon).

Creuse - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind., le 14/06/2012 (K. Guerbaa).

Ces 2 observations sont conformes à la phénologie de la migration pré-nuptiale pour cette espèce régulière dans la région.



Échasses blanches *Himantopus himantopus*, Beynat (19), mai 2012, P. Marthon.

PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola* (0/0 - 2/2).

Monotypique. Niche dans l'Arctique russe, à partir de la péninsule de Kanin et plus à l'est, également de l'Alaska à la Terre de Baffin. Migrateur et hivernant, fréquente les baies, les estuaires, les prairies, également lors des migrations les grands plans d'eau envasés.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., le 02/10/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., le 29/10/2012 (A. Virondeau, P. et P. Marthon et al.).

Ces premières mentions régionales de cette espèce depuis la création du CHR, attestent du caractère exceptionnel de la présence de cet oiseau à l'intérieur des terres.

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (1/2 - 1/2).

Monotypique. Niche dans l'arctique : Sibérie (Taïmyr et plus à l'est), nord-est du Canada et du Groenland. Migrateur et hivernant assez commun sur le littoral.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 06/09/2012 (K. Guerbaa).

Cette espèce est très rare à l'intérieur des terres. Depuis la création du CHR, cette observation est la première en période de migration postnuptiale et la seconde après celle de mai 2011.

BÉCASSEAU MINUTE *Calidris minuta* (3/6 - 5/8).

Monotypique. Niche dans l'Arctique, de l'extrême nord de la Norvège jusqu'en Sibérie orientale. Hiverné sur les côtes méditerranéennes et surtout en Afrique. S'observe surtout d'août à octobre lors de la migration postnuptiale ; plus rare en migration pré-nuptiale d'avril à mai.

Creuse - Évaux les Bains/Chaux, 2 ad. internup., le 20/08/2012 (P. Duboc),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv, du 06/09/2012 au 08/09/2012, photo (S. Touze),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind., le 10/09/2012, photo (J.P. Toumazet),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 15/09/2012 (A. Labrousse et al.),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A., le 12/10/2012 (A. Virondeau, F. Desage).

Chaque année, des juvéniles en migration postnuptiale sont observés sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes. Bien qu'observés dans le même secteur, la présence de 2 individus adultes à Évaux-les-Bains est notable.



Bécasseau minute *Calidris alpina*, Lussat (23), septembre 2012, S. Touze.

BÉCASSEAU COCORLI *Calidris ferruginea* (3/9 - 8/15).

Monotypique. Niche à l'extrême nord de la Sibérie centrale. Hiverne principalement en Afrique, et parfois sur le pourtour méditerranéen. En France, il fréquente essentiellement le littoral au passage (notamment façade atlantique en migration postnuptiale).

- Creuse** - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ad., le 07/08/2012, photo (Q. Marquet),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 16/08/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 01/09/2012 (F. Desage),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., du 06/09/2012 au 08/09/2012, photo (S. Touze et Ch. Duponcheel, M. Uyttebrouck, F. Donckels),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 10/09/2012, photo (J.P. Toumazet),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 juv., le 19/09/12 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, juv., le 02/10/2012 (K. Guerbaa),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 juv., le 31/10/2012 (K. Guerbaa).

Bien qu'inscrites dans la logique migratoire de l'espèce à cette période et en ce lieu, ces observations d'individus juvéniles restent dignes d'intérêt pour notre région.



Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea*, Lussat (23), septembre 2012, S. Touze.



2 Bécasseaux cocorlis *Calidris ferruginea* avec des Bécasseaux variables *Calidris alpina*, Lussat (23), septembre 2012 J.P. Toumazet.

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (4/4 - 3/7).

Monotypique. Niche dans les zones boréales et subarctiques de la Fennoscandie à la Sibérie orientale. Hiverne en Europe de l'Ouest et du Sud, en Afrique du Nord, au nord des zones afro-tropicales, au Moyen-Orient, à l'est jusqu'au Vietnam.

Corrèze - Aubazine/étang du Coiroux, ind., du 21/02/2012 au 27/02/2012 (P. Marthon).

Haute-Vienne - Cussac/étang de la Monnerie, 5 ind., le 15/01/2012 (A. et Ch. Doucelin, F. Quillard),

- Saint-Pardoux/étang Reynier, ind., le 10/03/2012 (Ph. Goursaud, R. Serieys).

Les passages migratoires sont peu observés en Limousin et probablement sous-estimés car cette espèce est très discrète. L'observation d'un groupe de 5 individus est particulièrement remarquable.

BARGE À QUEUE NOIRE *Limosa limosa* (0/0 - 1/1).

Polytypique. L. limosa niche de l'Europe de l'Ouest à la Russie, jusqu'au fleuve Ienisséï. Islandica se reproduit en Islande, aux Féroé, aux Shetland et dans le nord de la Norvège. En migration, fréquente tout type de zone humide.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad. internup., le 03/08/2012, photo (R. Petit).

Encore une première pour le CHR avec cette observation réalisée à une date classique en Limousin, où les biotopes susceptibles d'accueillir cette espèce sont peu nombreux.



Barge à queue noire *Limosa*
Limosa, Lussat (23), août 2012,
R. Petit.

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (0/0 - 1/1).

Polytypique. N. p. phaeopus niche ponctuellement au nord des Iles Britanniques et de la Scandinavie à l'ouest de la Sibérie, jusqu'à la vallée de l'énisseï et au Taïmyr. Migrateur, fréquente essentiellement le littoral.

Corrèze - Neuvic/plage du lac, ind., du 07/04/2012 au 09/04/2012 (G. Caucal, D. Vigneron, Th. Urvois).

Si l'espèce est régulière en France, elle est rare en Limousin où elle n'avait pas été mentionnée depuis la création du CHR en 2009.

TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (2/2 - 1/1).

Polytypique. A. i. interpres niche ponctuellement au nord-est du Canada et sur le littoral arctique du Groenland à l'Eurasie, au sud jusqu'à la Baltique et en Alaska. Migrateur et hivernant, fréquente le littoral rocheux et parfois les vasières.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 26/08/2012 (K. Guerbaa, M. Carrat).

Après une observation d'un individu en 2010 et d'un autre en 2011, la présence de cet oiseau garde un caractère exceptionnel, l'espèce étant très rarement observée à l'intérieur des terres.

MOUETTE DE SABINE *Xema Sabini* (0/0 - 1/1).

Monotypique. Niche en Alaska, dans l'Arctique canadien, au Groenland, occasionnellement au Spitzberg et en Sibérie (Taïmyr et plus à l'est). Ses quartiers d'hivernage sont imparfaitement connus. Régulière en France sur les côtes de l'Atlantique, de juillet à novembre, surtout en août-septembre, elle est exceptionnelle à l'intérieur des terres.

Corrèze - Chasteaux, Lissac sur Couze/lac du Causse, ad., le 19/09/2012, photo (J. Coatmeur, J. Bachimont).

L'unique mention régionale datait du 28 décembre 1999 suite à la tempête MARTIN. Ce migrateur pélagique est observé occasionnellement à l'intérieur des terres lors des tempêtes automnales.



Mouette de Sabine *Xema sabini*, Lissac sur Couze (19), Septembre 2012, J. Coatmeur.

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (22/53 - 1/1).

Polytypique. Vit en haute mer, ne s'approche du littoral que pour la reproduction qui se déroule généralement au flanc de falaises verticales surplombant directement l'océan Atlantique, du Portugal aux archipels arctiques.

Haute-Vienne - Eymoutiers/usine hydroélectrique de Bussy, H1, mort, le 08/04/2012 (N. Gendre).

L'espèce n'avait pas été recontactée en Limousin depuis la tempête survenue sur les côtes landaises le 24 janvier 2009.

MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (8/10 - 5/5).

Monotypique. Migratrice ; niche de l'est de la Finlande à la Sibérie orientale, et ponctuellement en Europe centrale jusqu'aux Pays-Bas à l'ouest. Hiverné sur toutes les côtes d'Europe de l'Ouest, du Maghreb et de la mer Noire.

Creuse - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 2A, le 27/02/2012 (A. Virondeau),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 06/03/2012 (K. Guerbaa),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 08/03/2012 (K. Guerbaa),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 3A, le 15/03/2012 (A. Virondeau),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 19/03/2012 (K. Guerbaa).

Les contacts réguliers, sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes, découlent certainement de l'accroissement des effectifs transitant par notre pays lors de cette dernière décennie.

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (6/8 - 5/8).

Monotypique. Niche du nord de la mer Noire et de l'Anatolie à l'Europe centrale et occidentale, à l'ouest jusqu'en Irlande et au littoral méditerranéen de l'Espagne. Elle hiverne le long de toutes les côtes d'Europe de l'Ouest et du Maghreb.

Corrèze - Sérandon/La Chabanne, ad., nupt., 14/03/2012, (G. Cauca, M. André et al.).

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ad., le 25/04/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 13/08/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 22/08/2012 (F. Desage),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 1A, le 19/10/2012 (K. Guerbaa).

La Mouette mélanocéphale est en expansion spatiale et numérique en Europe occidentale. L'augmentation des données limousines s'inscrit dans ce contexte.

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus* (2/2 - 2/2).

Polytypique. Canus niche de l'Islande et de l'Europe de l'Ouest jusqu'à la mer Blanche. Heinei se reproduit de la péninsule de Kanin et de la région de Moscou jusqu'au fleuve Léna en Sibérie. Hiverne sur l'ensemble des côtes scandinaves et d'Europe de l'Ouest jusqu'à la hauteur de Bordeaux, sur celles de Grande-Bretagne et d'Islande, à l'intérieur des terres en Finlande du Sud, en Ecosse et en Irlande.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind. 2A, le 01/05/2012, photo (C. Lambert).

Haute-Vienne - Le Palais sur Vienne/la sablière sur la Vienne, ad. internupt., le 09/02/2012 (F. Desage).

L'espèce est observée régulièrement en hiver dans la région, mais les mentions de cet oiseau restent rares et ne concernent généralement que des individus isolés.



Goéland cendré, *Larus canus*,
Lussat (23), mai 2012, C.
Lambert.

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (3/3 - 3/6).

Polytypique. Migrateur partiel ; la sous-espèce "graellsii" niche de l'Espagne à la Grande-Bretagne et à la Scandinavie ; en hiver, va au large jusqu'en Islande et au Canada. La sous-espèce "fuscus" nordique est séparée de la précédente par une population intermédiaire "intermedius" nichant aux Pays-Bas.

Corrèze - Sarroux/Outre-Val, ad., du 08/02/2012 au 12/02/2012 (G. Cauca, D. Vigneron, A. Chaillou).

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., le 01/09/2012 (F. Desage),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ad. internupt., le 12/09/2012 (K. Guerbaa).

A l'instar de l'espèce précédente, ces 3 mentions sont notables. La présence d'un individu durant 5 jours dans les gorges de la Dordogne est à relier avec l'hivernage régulier du Goéland leucophée, ces 2 espèces s'observant régulièrement ensemble.

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (0/0 - 2/3).

Polytypique. Niche dans le nord-ouest de l'Europe, de l'Islande à la mer Blanche, au sud jusqu'à l'ouest de la France et au Pays Basque espagnol. Argentatus se reproduit dans la partie nord, en Scandinavie et au sud de la Baltique et argenteus de l'Europe occidentale à l'Islande.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind., le 25/04/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., du 21/05/2012 au 25/05/2012 (K. Guerbaa).

Cette espèce, réellement rare en Limousin, est homologuée pour la première fois depuis la création du CHR. Les deux observations émanent du site emblématique de l'étang des Landes.

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (3/11 - 5/10).

Polytypique. S. h. hirundo niche en Amérique du Nord, dans le nord de l'Amérique du Sud, les îles de l'Atlantique, l'Europe, le nord et l'ouest de l'Afrique, et le Moyen-Orient jusqu'à la mer Caspienne et le vallée de l'Eniseï. Hiverné sur l'ensemble des côtes d'Europe et d'Afrique, éventuellement au large. Arrive en mars et repart en octobre.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., le 15/05/2012 (K. Guerbaa, J. Moulinat),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ad., le 27/05/2012 (Ph. Hubert, P. Joffre),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ad., le 16/06/2012 (J. Barataud),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ind., le 09/07/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind., le 18/07/2012, photo (K. Guerbaa).

Bien que le nombre de données soit nettement supérieur à celui des années précédentes, elles concernent uniquement l'étang des Landes.



Sterne pierregarin, *Sterna hirundo*, Lussat (23), juillet 2012, K. Guerbaa.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (1/1 - 1/1).

Polytypique. O. s. scops se reproduit du bassin méditerranéen jusqu'à la Volga. Migrateur, il nous quitte en septembre-octobre pour revenir en février-avril.

Haute-Vienne - Lavignac/Les Barres, mâle, du 27/04/2012 au 04/05/2012, photo (G. Tricorne).

Pour la seconde année consécutive, l'espèce est mentionnée dans la région. Espérons que peu à peu, elle reconquiert les territoires d'où elle avait disparue, suite à une diminution de son aire de répartition dans les années 1970.



Petit-Duc scops, *Otus scops*,
Lavignac (87), avril et mai 2012,
G. Tricorne.

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (6/6 - 3/3).

Polytypique. A. f. flammeus, en Europe, niche dans les régions de moyennes et hautes latitudes des zones tempérées, boréales et arctiques. Migrateur à migrateur partiel, les populations du nord de l'Europe et de Russie hivernent en Europe occidentale et orientale, au sud jusqu'en Afrique du Nord et au Proche-Orient.

Haute-Vienne - Magnac-Laval, ind., recueilli le 13/02/2012, mort par la suite, choc avec véhicule, photo (A. Gontier, Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage),

- Flavignac/Cessaguet, ind., le 11/10/2012 (D. Naudon, J.L. Vareille, P. Précigout),

- Flavignac/Cessaguet, ind., le 22/10/2012 (F. Desage, P. Précigout, D. Naudon).

Le nombre d'observations est identique à celui des années précédentes. Le site d'observation de la migration de Flavignac demeure toujours aussi intéressant pour l'observation de cette espèce à l'automne.

MARTINET À VENTRE BLANC *Apus melba* (0/0 - 1/1).

Polytypique. A. m. melba se reproduit dans le sud de l'Europe, du Portugal à l'Asie Mineure, ainsi que dans l'extrême nord du Maroc. Hiverné en Afrique.

Corrèze - Lestards/Coissac, ind., le 04/09/2012 (Ch. Duponcheel, M. Uyttebrouck, F. Donckels).

Bien que nicheur dans le département voisin du Lot, le Martinet à ventre blanc est rarissime en Limousin.

ROLLIER D'EUROPE *Coracias garrulus* (2/2 - 1/1).

Polytypique. C. g. garrulus niche dans le sud et l'est de l'Europe (en France, confiné aux départements méditerranéens) et en Asie Mineure jusqu'au sud-ouest de la Sibérie. Hiverné dans la moitié sud de l'Afrique. Départs en août-octobre, retours en mars-mai.

Creuse - Jouillat/Village de Rocheraud, ind., le 21/08/2012, photo (J-P. Lécivain, R. Manghin).

Pour la seconde année consécutive, cette espèce méditerranéenne est citée dans la région lors de la dispersion postnuptiale, alors qu'avant 2011, le Rollier d'Europe n'avait pas été observé en Limousin depuis 1980 ! (DUPOUX 2012).



Rollier d'Europe *Coracias garrulus*,
Jouillet (23), août 2012, J. P. Lécivain.

ACCENTEUR ALPIN *Prunella collaris* (4/5 - 7/12).

Polytypique. P. c. collaris se reproduit des montagnes de l'Afrique du Nord aux Carpates et à l'Italie, en passant par l'Espagne et la France. Il est en grande partie sédentaire, mais d'octobre à avril, il a tendance à descendre hiverner dans les plaines proches de ces massifs ou plus au sud.

Corrèze - Turenne/le château, porte des Moriollles, jusqu'à 3 ind., du 06/02/2012 au 16/02/2012, photos (J.C Fournière et L. Ribérol),

- Soursac/barrage de l'Aigle, 2 ind., le 13/02/2012, photo (R. Petit),
- Lapleau/viaduc des Rochers Noirs, ind., le 19/02/2012 (G. Cauval, A. Letang),
- Aubazine/puy de Pauliac, ind., du 23/10/2012 au 24/10/2012, photo (P. et P. Marthon),
- Soursac/barrage de l'Aigle, ind., le 08/12/2012, photo (R. Jilet).

Haute-Vienne - Limoges/Jardins de l'évêché, ind., du 26/11/2011 au 09/02/2012, photo (F. Desage *et al.*),

- Limoges/Jardins de l'évêché, 3 ind., le 15/11/2012, 1 ind. jusqu'au 31/12/2012, photo (F. Desage, A. Virondeau).

Ces dernières années, l'hivernage semble se répéter en centre-ville de Limoges. La majorité des observations est corrézienne. Un afflux d'Accenteurs alpins avait été constaté en début d'année dans les régions voisines jusque sur la façade atlantique.



Accenteur alpin *Prunella collaris*, Limoges (87), novembre 2012, F. Desage.

GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica* (17/32 - 18/43).

Polytypique. L. s. *svecica* niche de la Scandinavie à l'est de la Sibérie. L. s. *cyanecula* niche du nord-ouest de la France au travers de l'Europe centrale jusqu'en Russie européenne occidentale. L. s. *namnetum* occupe les régions françaises proches de l'Atlantique et de la Manche, entre Gironde et Ille-et-Vilaine. Migrateur printanier et automnal.

- Creuse** - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 6 ind. (fem. +1A, 2 fem. 1A, mâle 1A, ind.), le 13/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind. 1A (2 mâles + fem.), le 14/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 5 ind. (fem. +1A, fem. 1A, 2 mâles 1A, ind.), le 15/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem. 1A, le 16/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 mâles 1A, le 17/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind., 1 fem. et 2 mâles, le 22/08/2012 (F. Desage),
 - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, internup., le 26/08/2012 (A. Labrousse et al.),
 - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 5 fem. (2 ind. +1A, 3 ind. 1A), le 29/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 6 mâles (2 ind. +1A, 4 ind. 1A), le 30/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 mâles 1A, le 31/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),
 - ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., porte une bague, le 07/09/2012, photo (J-P.

Toumazet),

- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., sans bague, le 08/09/2012 (J-P. Toumazet),
- ** Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem., le 15/09/2012 (A. Labrousse *et al.*),
- *Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 mâles 1A, le 05/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),*
- *Lussat/RNN de l'étang des Landes, mâle 1A, le 20/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier).*

Haute-Vienne - Limoges/marais station d'épuration, mâle +1A, le 23/03/2012 (A. Virondeau),

- Limoges/marais station d'épuration, ad., prob. ssp. *cyanecula*, le 09/04/2012 (F. Desage),
- Limoges/marais station d'épuration, mâle 1A, le 18/09/2012 (A. Virondeau).

La gorgebleue est régulière en halte migratoire sur ces 2 sites. Le nombre élevé de mentions peut s'expliquer par une pression d'observation plus importante qu'ailleurs.



Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica*,
Lussat (23), septembre 2012, (bagué)
J.P. Toumazet.

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (31/157 - 15/60).

Monotypique. Niche de l'Afrique du Nord à travers toute l'Europe jusqu'en Laponie et vers l'est jusqu'à la Sibérie occidentale, au sud atteint l'Iran et la Turquie. Hiverné en Afrique tropicale. Départ en août-septembre, retour en mars-avril.

Creuse - ** Lussat/RNN étang des Landes, ind., le 19/04/2012 (K. Guerbaa),

- ** Lussat/RNN étang des Landes, ind., le 25/04/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN étang des Landes, ind., le 07/05/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN étang des Landes, 2 ind., le 27/06/2012 (K. Guerbaa),
- ** Lussat/RNN étang des Landes, 2 ind., nicheur probable, le 10/07/2012 (K. Guerbaa),
- *Lussat/RNN de l'étang des Landes, 7 ind. 1A, le 13/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),*
- *Lussat/RNN de l'étang des Landes, 12 ind. (11 ind. 1A, ind. +1A), le 14/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),*
- *Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind. 1A, le 15/08/2012, bagué SPOL halte*

migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 8 ind. (6 ind. 1A, 2 ind. +1A), le 16/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 5 ind. 1A, le 17/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind. 1A, le 27/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 ind. 1A, le 29/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 9 ind. (ind. +1A, 7 ind. 1A, ind.), le 30/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ind. 1A, le 31/08/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier).

Haute-Vienne - Chaillac sur Vienne/Moulin de la Guérierie, ind. 1A, bagué ce jour, photo, le 22/07/2012 (R. Bussière, J. Tillet).

Si les contacts sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes sont récurrents, les 2 observations de juillet laissent envisager une éventuelle reproduction. Pour la deuxième année consécutive, un phragmite est bagué en Haute-Vienne, sur un second site où sa présence est inattendue.



Phragmite des joncs
Acrocephalus
schoenobaenus,
Chaillac-sur-Vienne (87),
juillet 2012, J. Tillet.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (0/0 - 1/1).

Polytypique. P. i. *inornatus* niche en Sibérie, de l'Oural septentrional jusqu'au bord de la mer d'Okhotsk et plus au sud vers les monts Saïan. Migrateur rare, hivernant occasionnel.

Corrèze - Noailiac/Orgnac, ind., le 19/10/2012 (D. Renson).

Cette observation, première mention régionale pour ce pouillot, était attendue depuis longtemps par les ornithologues régionaux. Généralement, l'espèce est notée sur le littoral atlantique, mais lors de l'automne 2012 un nombre inhabituel de Pouillots à grands sourcils a été relevé à l'intérieur des terres.

REMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (3/10 - 12/39).

Polytypique. R. p. *pendulinus* se reproduit à travers l'Europe de la péninsule ibérique à

la Russie. Migratrice partielle en expansion en Europe de l'Ouest ; très localisée en France ; commune sur la péninsule ibérique et à l'est d'une ligne Italie-Suisse-Hollande-Danemark.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind. minimum, (1 fem.+ 2 ind.), le 26/08/2012 (A. Virondeau et F. Desage).

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 11 ind (8 fem. +1A, mâle +1A, mâle 1A, ind. 1A), le 05/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

-Lussat/RNN de l'étang des Landes, 3 ind (fem., mâle +1A, ind. 1A), le 06/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 10/10/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 11/10/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem. +1A, le 13/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 18/10/2012 (K. Guerbaa),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 2 fem. (ind. 1A, ind.), le 19/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 9 ind. (6 ind. 1A, 1 mâle +1A, 2 mâles 1A), le 20/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, 4 ind. (fem.+1A, mâle +1A, 2 ind. 1A), le 21/10/2012, bagué SPOL halte migratoire (K. Guerbaa et G. Pallier),

- Lussat/RNN de l'étang des Landes, fem., le 22/10/2012, photo (V. Primault, C. Munoz).

Haute-Vienne - Limoges/marais station d'épuration, 2 ad., (mâle + fem.), le 09/04/2012 (F. Desage).

Excellente année pour cette espèce. On notera les 2 individus observés à Limoges lors de la migration prénuptiale. Les autres citations montrent l'attractivité de la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes pour cet oiseau en halte migratoire postnuptiale.



Rémiz penduline *Remiz pendulinus*, Lussat (23), octobre 2012, V. Primault.

SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea* (3/6 - 2/8).

Polytypique. C. f. *flammea* niche au-delà du 55°N, de la Norvège jusqu'au Kamtchatka.

C. f. *cabaret* se reproduit en Grande-Bretagne et depuis la France jusqu'au sud-ouest de la Norvège et la République tchèque, y compris dans les Alpes. C. f. *rostrata* niche en Islande, au Groenland et sur la terre de Baffin. Les oiseaux les plus septentrionaux sont

migrateurs. Hiverne plus au sud et dans l'ouest de la France sans atteindre les régions méditerranéennes. Mouvements migratoires en septembre-novembre, retours en mars-mai.

Corrèze - Saint-Etienne-aux-Clos/Froides Maisons, ind., fem. ou H1, le 30/10/2012 et le 31/10/2012, photos (J et Cl. Pappalardo),

- Saint-Etienne-aux-Clos/Froides Maisons, 6 ind. le 08/11/12, puis 7 ind., 6 type fem. et 1 mâle jusqu'au 09/12/12, photos (J et Cl. Pappalardo).

Notée quasiment chaque année, surtout sur l'est de la région et sur la Montagne limousine, cette espèce reste rare. Durant plus d'un mois, des individus ont stationné sur le même site. On notera que ces oiseaux présentaient les caractéristiques de la ssp. *cabaret*.



Sizerin flammé, *carduelis flammæ*, Saint-Etienne-aux-Clos (19), octobre à décembre 2012, Cl. et J. Pappalardo.

BOUVREUIL PIVOINE TROMPETTEUR *Pyrrhula pyrrhula pyrrhula* (7/19 - 1/1).

L'origine de ces oiseaux, envahissant périodiquement le nord et l'ouest de l'Europe, n'est pas connue avec certitude, elle pourrait se situer au nord-ouest de la Russie. Sur le terrain, seul leur cri décrit comme un coup de trompette d'enfant permet de les distinguer des populations autochtones *pyrrhula pyrrhula europaea*.

Creuse - Fontanières/Les Bregères, mâle ad., le 26/11/2012 (P. Duboc).

Malgré un hiver relativement froid, une seule mention a été relevée. Comme c'est souvent le cas elle est survenue au nord-est de la région.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (5/16 - 1/1).

Monotypique. Se reproduit en Europe et en Turquie au sud-est d'une ligne Lisbonne-Oslo et jusqu'à 100° de latitude est. Hiverne du Sahel au Soudan. Départ fin août-octobre, retour avril-mai.

Corrèze - Chanteix/Le Zignalet, mâle +1A, le 24/04/2012 (J. Barataud).

Apparition à une date classique en migration prénuptiale. L'effondrement des populations, notamment en Europe du Nord, aggravé par la poursuite du braconnage dans les Landes, rend cette espèce exceptionnelle en Limousin. En 1936, Mayaud donnait le Bruant ortolan nicheur régulier dans nos régions.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES OBSERVÉES À DES DATES EXTRÊMES (Catégorie A).

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra*

Corrèze - Aubazine/étang du Coiroux (Chastagnol), ad., le 09/11/2012 (P. Marthon).

En Limousin, la précédente date extrême de présence automnale était le 06/11/1988. Parallèlement deux observations de Cigognes noires sont survenues dans l'Indre les 18/11/2012 et 21/11/2012. En France, l'hivernage complet est régulier en Camargue, très rare ailleurs.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo*

Corrèze - Saint-Solve/La Chapelle Salamard, ad. , le 03/11/2012 (L. Ton),

- Aubazine/Mardil, ind. 1A prob., le 12/11/2012 (P. Marthon).

Au niveau national quelques rares données hivernales sont mentionnées. En Limousin, la précédente date extrême de présence automnale était le 27 octobre 2009.

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus*

Creuse - Saint-Amand-Jartoudeix/Le Colombeix, mâle H1, le 02/11/2012 (M. Barataud).

Dans la région, la précédente date extrême de présence automnale est mentionnée le 10/10/1993. Au niveau national elle se situe le 14/11/1996.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE C (Espèces introduites ayant fait souche).

BERNACHE DU CANADA *Branta canadensis* (0/0 - 3/30)

Polytypique. B. c. canadensis se reproduit dans l'est du Canada, introduite dans la plupart des pays du nord-ouest de l'Europe, avec des populations florissantes en Grande-Bretagne et en Suède.

Corrèze - Masseret/Enjagot, 2 cples, repro., 3 juv. survivants, mai et juin 2012, photos (P. Chatenet),

- Masseret/Enjagot, 22 à 24 ind., 23/12/2012, photos (P. Chatenet).

Creuse - Genouillac/Les Grands Champs, ind., le 15/03/2012 (A. Virondeau).

Cette espèce est rarement citée dans la région bien que les populations férales de Brenne et d'Auvergne ne soient guère éloignées. La mention corrézienne du printemps 2012 atteste la reproduction de la Bernache du Canada dans la région.



Bernache du Canada
Branta canadensis
Masseret (19), printemps
2012, P. Chatenet.

BERNACHE NONNETTE *Branta leucopsis* (2/11 - 2/3).

Monotypique. Niche à l'est du Groenland, au Spitzberg et en Nouvelle-Zemble. Des populations férales sont en forte augmentation sur quelques îles de la Baltique et aux Pays-Bas. L'aire d'hivernage s'étend de l'Irlande à l'Ecosse et de la Belgique au Danemark.

Creuse - Cressat/étang de Azat, 2 ad., le 04/02/2012, prob. échappés de captivité, photo (M. Rousseau).

Haute-Vienne - Limoges/l'Île aux oiseaux, ind., le 16/02/2012 (A. Virondeau).

L'origine domestique de ces oiseaux ne fait aucun doute, ils sont régulièrement observés en ces lieux.



Bernache nonnette, *Branta leucopsis*,
Cressat (23), avril 2012,
M. Rousseau.

QUETTE D'ÉGYPTE *Alopochen aegyptiaca* (0/0 - 3/6).

Monotypique. Niche en Afrique, au sud du Sahara. Introduite avec succès dans plusieurs pays de d'Europe de l'Ouest (Pays-Bas, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique). Les oiseaux observés dans notre région sont le plus souvent des échappés de captivité.

Corrèze - Lissac-sur-Couze/lac du Causse, 2 ad., du 30/09/2012 au 22/10/2012, photo (P. Eymard, D. Laval).

Haute-Vienne - Le Palais-sur-Vienne/La Sablière, 2 ad., le 14/01/2012 (Ph. Hubert, A. Virondeau),

- Solignac/Parc du Château de Bréjoux, 2 ind., le 01/06/2012, photo (F. Mournetas, N. Laforest).

L'espèce devient de plus en plus fréquente dans la région, mais les individus observés sont généralement des échappés de captivité. Il est parfois difficile d'en être certain, comme dans le cas des 2 oiseaux corréziens.



Ouette d'Egypte,
Alopochen aegyptiaca,
Lissac-sur-Couze (19),
octobre 2012,
P. Eymard.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* (2/4 - 3/5).

Monotypique. Niche en Afrique du Nord et ponctuellement de la Grèce à l'Asie centrale, en Mongolie, au nord de la Chine, en Sibérie au nord jusqu'au lac Baïkal. Rare à l'état sauvage, les individus observés en Europe occidentale sont souvent échappés de captivité.

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, ind., le 27/03/2012 (K. Guerbaa, S. Bur).

Haute-Vienne - Saint-Pardoux/étang Reynier, 2 ind., le 10/03/2012 (Ph. Goursaud, R. Serieys),

- Oradour-sur-Glane/lande de Mompac, 2 ind., cple, du 30/04/2012 au 25/05/2012 (N. Gendre).

L'origine domestique des deux oiseaux hauts-viennois ne fait aucun doute. Celle de l'individu observé à la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes est plus incertaine, même si l'hypothèse d'un individu sauvage est la moins probable.

CANARD MANDARIN *Aix galericulata* (4/6 - 7/8).

Monotypique. Niche dans l'est de la Chine, au Japon et au sud-est de la Sibérie. Introduit en Angleterre et en Ecosse. A l'état sauvage, fréquente les lacs et les rivières aux berges boisées.

Corrèze - Saint-Hilaire-les-Courbes/petit étang, mâle ad., le 14/01/2012 (D. Naudon, M. et M. Naudon),

- Larche/les gravières, type fem., le 14/01/2012 (B. Faurie),

- Treignac/lac des Barriouses, mâle ad., le 18/02/2012 (Ph. Hubert),

- Favars/Les Champs-Hauts, 2 fem., du 21/02/2012 au 28/02/2012 (F. Bouillaguet),

- Saint-Hilaire-les-Courbes/petit étang, mâle ad., le 02/06/2012 (Ph. Hubert).

Haute-Vienne - Limoges/barrage de La Mazelle, mâle ad., le 03/01/2012 (F. Desage),

- Saint-Priest-Taurion/le Moulin de la Ribière, mâle ad., le 14/01/2012 (Ph. Hubert, A. Virondeau).

Le nombre important d'observations de l'espèce, bien qu'aucun couple n'ait été

contacté, laisse envisager la possibilité de nouveaux cas de reproduction en Limousin. Certains individus pourraient être issus des populations migratrices des Iles Britanniques.

DONNÉES ACCEPTÉES POUR L'ANNÉE 2012 DES ESPÈCES DE CATÉGORIE E (espèces dont l'origine est probablement captive).

CANARD CAROLIN *Aix sponsa* (0/0 - 1/1).

Originaire d'Amérique du Nord, espèce détenue fréquemment en captivité, quelques cas de reproduction férale sont relevés en France.

Haute-Vienne - Chaptelat/La Carrière, 2 ind. ad., cple., le 27/05/2012 (N. Gendre, J.C. Lamoureux).

La présence d'un couple, apparemment cantonné, permet d'envisager une reproduction.

OBSERVATIONS NON HOMOLOGUÉES DE 2012

Le CHR rappelle que la non-homologation ne préjuge pas de l'identité de l'oiseau et encore moins de la compétence ou de la crédibilité de l'observateur. Elle est généralement induite par le manque d'éléments descriptifs, voire l'absence totale de description. Il est donc conseillé d'apporter le plus d'informations possibles même si l'identification semble aisée. Une photo peut parfois s'avérer insuffisante.

HYBRIDE DE FULIGULE MORILLON x FULIGULE MILOUINAN *Aythya fuligula* x *Aythya marila*

Haute-Vienne - Limoges/bords de Vienne, fem. , le 18/02/2012, photo. Cause du refus : cet oiseau a été identifié comme étant un Fuligule morillon *Aythya fuligula*, fem. H1.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo* (donnée tardive)

Corrèze - Saint-Solve/La Chapelle Salamard, ad, le 03/11/2012. Cause du refus : la description est insuffisante pour valider cette observation.

OBSERVATIONS HOMOLOGUÉES DES ANNÉES ANTÉRIEURES

Le CHR du Limousin prend toujours en compte les observations effectuées depuis la date de sa création le 01/01/2009.

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2009

CANARD MANDARIN *Aix galericulata*

Haute-Vienne - Saint-Priest-Taurion/le Moulin de la Ribièrre, 2 mâles ad., le 10/01/2009 (Ph. Hubert).

OBSERVATION HOMOLOGUÉE DE 2011

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo*

Creuse - Lussat/RNN de l'étang des Landes, 9 ad., le 19/05/2011, photo (S. Touze).



Sterne pierregarin *Sterna hirundo*, Lussat (23), mai 2011, S. Touze.

OBSERVATIONS DES OISEAUX OCCASIONNELS ACCEPTÉES PAR LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2012.

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus*

Corrèze - Aubazine, 2 ind. ad., le 23/03/2012 (P. Marthon). Source : base de données CHN.

BUSARD PÂLE *Circus macrourus*

Corrèze - Allasac, ind., mâle ad, le 01/04/2012, photo (P. Eymard). Source : base de données CHN.



Busard pâle, *Circus macrourus*, Allasac (19), avril 2012, P. Eymard.

REMERCIEMENTS :

Le CHR du Limousin remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à sa bonne marche :

- *Tous les observateurs de plus en plus nombreux qui sont à la base de son fonctionnement,*
- *Tous les photographes qui ont bien accepté de mettre à disposition leurs clichés,*
- *Karim Guerbaa pour la transmission des données de baguage sur la réserve naturelle nationale de l'étang des Landes,*
- *La SEPOL pour son soutien logistique et l'accès à sa base de données,*
- *Le centre de sauvegarde de la faune sauvage (Verneuil-sur-Vienne - 87), géré par*

BIBLIOGRAPHIE

COMMISSION AVIFAUNISTIQUE FRANÇAISE, 2011. Liste 2011 des Oiseaux de France du Paléarctique Occidental *Ornithos* 18-3, I-XXVIII.

DUBOIS Ph.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSSO G. et YÉSOU P., 2008. *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, 560 pages.

DUPOUX E., 2012. Observation d'un Rollier d'Europe en Creuse. *EPOPS* 84-2 : 12.

SEPOL, 1993. *Atlas des Oiseaux Nicheurs en Limousin*. Editions Lucien Souny.

SVENSSON L., MULLARNEY K. et ZETTERSTROM D., 2010. *Le Guide ornitho*. Delachaux et Niestlé.

Encyclopédie multimédia des oiseaux GEO. A la découverte de tous les oiseaux d'Europe. Editions 2004, Montparnasse multimédia.

Site Web : <http://www.oiseaux.net/>

Site Web du CHN : <http://www.chn-france.org/index.php>